






Math. P. 358  $\frac{1}{2}$  Milinowski











ELEMENTAR-SYNTHETISCHE  
GEOMETRIE DER KEGELSCHNITTE.

VON

A. MILINOWSKI,

OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU WEISSENBURG I. ELSASS.



MIT FIGUREN IM TEXT.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1882.

8/3

130 F

4/11 8.80



## Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

- Bruno, F. Faà di**, Einleitung in die Theorie der binären Formen. Mit Unterstützung von Professor M. NOETHER deutsch herausgegeben von Dr. THEODOR WALTER. [VIII, 379 S. und 4 tabellarische Beilagen.] gr. 8. 1881. n. *M* 10.80.
- Cantor, Moritz**, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Erster Band. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1200 n. Chr. Mit vielen Holzschnitten im Text. [VIII u. 804 S.] gr. 8. geh. n. *M* 20.—
- Escherich, Dr. Gustav von**, Professor an der Universität Czernowitz, Einleitung in die analytische Geometrie des Raumes. [VIII u. 282 S.] gr. 8. geh. n. *M* 5.20.
- Harnack, Dr. Axel**, o. Professor der Mathematik an dem Polytechnikum zu Dresden, die Elemente der Differential- und Integralrechnung. Zur Einführung in das Studium dargestellt. Mit Figuren im Text. [VIII u. 409 S.] gr. 8. geh. n. *M* 7.60.
- Helmert, Dr. F. R.**, Professor an der technischen Hochschule zu Aachen, die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren Geodäsie. Einleitung u. I. Theil: Die mathematischen Theorien. Mit vielen Figuren im Text. [XV u. 631 S.] gr. 8. geh. n. *M* 18.—
- Henrici, J.**, Professor am Gymnasium zu Heidelberg, und P. TREUTLEIN, Professor am Gymnasium zu Karlsruhe, Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Erster Teil: Gleichheit der planimetrischen Größen. Kongruente Abbildung in der Ebene. Pensum der Tertia. Mit 188 Figuren in Holzschnitt. [VIII u. 152 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2.—
- Herwig, Dr. Hermann**, Professor an der technischen Hochschule zu Darmstadt, physikalische Begriffe und absolute Maasse. [VIII und 89 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2.40.
- Hesse, Otto**, Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der geraden Linie, des Punktes und Kreises in der Ebene. Dritte Auflage revidiert von Dr. S. GUNDELFINGER, Professor am großherzoglichen Polytechnikum zu Darmstadt. [VIII u. 230 S.] gr. 8. geh. n. *M* 5.20.
- Joachimsthal, F.**, Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der Linien doppelter Krümmung. Zweite Auflage, bearbeitet von L. NATANI. Mit zahlreichen Figuren im Text. [VIII u. 242 S.] gr. 8. geh. n. *M* 6.—



ELEMENTAR-SYNTHETISCHE  
G E O M E T R I E  
DER  
KEGELSCHNITTE.







C  
ELEMENTAR-SYNTHETISCHE  
GEOMETRIE DER KEGELSCHNITTE.

VON

A. MILINOWSKI,

OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU WEISSENBURG I. ELSASS.



MIT FIGUREN IM TEXT.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1882.







## Vorwort.

---

Aufser den elementaren Vorlesungen Steiners, welche Geiser unter dem Titel „Die Theorie der Kegelschnitte in elementarer Darstellung“ herausgegeben hat, besitzt die deutsche Literatur kein Werk, welches die Eigenschaften der Kegelschnitte einheitlich und elementar darzustellen versucht. Und auch die Steiner'schen Vorlesungen erfüllen nur teilweise diesen Zweck, denn sie schliessen die Behandlung der Polareigenschaften und der Kegelschnittbüschel und Kegelschnittscharen fast gänzlich aus. Das vorliegende Buch unternimmt es, in elementarer Form einen grossen Teil der bekannteren Kegelschnitteigenschaften zu entwickeln. Der Begriff elementar steht hier im Gegensatz zu projektivisch. Gewöhnlich versteht man unter elementar-geometrischer Behandlung diejenige, die sich nur auf Kongruenz und Ähnlichkeit stützt; beide versagen aber oder lassen sich nur auf grossen Umwegen dann zur Geltung bringen, wenn es sich um harmonische oder involutorische Beziehungen handelt. Daher sind im vorliegenden Werke die einfachen Eigenschaften der harmonischen und involutorischen Gebilde dem Gebiete der elementaren Geometrie zugezählt, was um so unbedenklicher erscheint, da sie sich als leichte Folgerungen der Eigenschaften ähnlicher Figuren erweisen. Das harmonische Gebilde ist die Grundlage der neueren Geometrie. Wie es in der projektivischen Geometrie mittelbar zur Anwendung kommt, denn projektivische Gebilde sind solche, in denen harmonischen Elementen wieder solche Elemente entsprechen, so soll es in vorliegendem Buche unmittelbar benutzt werden. Als bequemste Form zu seiner Anwendung ergab sich die schon von Moebius aufgestellte harmonische Verwandtschaft, eine durchaus elementare, durch den Begriff des harmonischen Gebildes vermittelte Beziehung zwischen den Punkten und Geraden der Ebene. Dieselbe wird in ausgedehntem Masse zur Übertragung der Kreiseigenschaften auf Kegelschnitte angewendet. Deshalb erschien es notwendig diese Eigenschaften im Zusammenhange und ausführlich abzuleiten. Da dieselben



zum grofsen Teile harmonischer Natur sind, so wurde die Theorie des harmonischen Gebildes an die Spitze gestellt. Ihr reihen sich an die harmonischen und polaren Eigenschaften der Kreise und Kreisbüschel. Letztere führen zur Involution, die wegen ihrer grofsen Wichtigkeit eingehend behandelt wurde. Dann folgen die Theorie der Ähnlichkeitspunkte und die Kreisverwandtschaft. Diese hat ihren Grund in den Eigenschaften der harmonischen Pole eines Kreises und wurde zuerst von Plücker (1834) unter dem Namen „Prinzip der reciproken Radien“ und dann von Moebius (1853) als „Kreisverwandtschaft“ aufgestellt. In eingehender Weise ist letztere von Reye (1879) in seiner Kugelgeometrie benutzt worden, um das erweiterte Berührungsproblem des Apollonius zu lösen: „Einen Kreis zu konstruieren, welcher drei gegebene Kreise unter gegebenen Winkeln schneidet.“ Dieselbe Verwandtschaft ist von Taylor benutzt worden, um den Feuerbach'schen Satz zu beweisen, dafs der Mittelkreis eines Dreiecks von seinen Berührungskreisen berührt wird und von Petersen „Methoden und Theorien“ 1879, um die berühmte Aufgabe zu lösen: „In einen Kreis ein  $n$ -Eck zu zeichnen, dessen Seiten durch gegebene Punkte gehen.“

An die Spitze der Theorie der Kegelschnitte wurde der Satz gestellt: „In jeder harmonischen Verwandtschaft, die den Mittelpunkt eines Kreises zum Centrum hat, ist dem Kreise ein Kegelschnitt verwandt, welcher den Kreismittelpunkt zu einem Brennpunkte hat.“ Daraus ergeben sich gleichzeitig die Brennpunkteigenschaften und die Polarentheorie der Kegelschnitte. Aber auch in jeder beliebigen harmonischen Verwandtschaft ist dem Kreise ein Kegelschnitt verwandt. Da sich nun durch harmonische Verwandtschaft ein beliebiges Fünfeck in ein Kreisfünfeck verwandeln läfst, so fliefst daraus der fundamentale Satz, dafs ein Kegelschnitt durch fünf seiner Punkte bestimmt ist. Soviel Analogien in ihrer Wirkung die harmonische Verwandtschaft auch mit der räumlichen Centralprojektion besitzt, so hat die erstere den Vorzug, planimetrische Eigenschaften ohne räumliche Betrachtungen darzulegen und sich auf die Theorie der Oberflächen übertragen zu lassen.

Diejenigen Kreise, die bei der Erzeugung der Kegelschnitte benutzt werden, der Scheitelkreis, die Leitkreise oder irgend ein Kreis um einen Brennpunkt, erscheinen in verschiedenen Abbildungen als Bilder des Kegelschnittes. Dadurch aber erhält man neue Mittel die harmonischen Eigenschaften des Kreises auf den Kegelschnitt zu übertragen.

Nachdem der Kegelschnitt als harmonische Kurve des Kreises betrachtet ist, werden die einzelnen Arten der Kegelschnitte auf verschiedene Weise erzeugt und die hauptsäch-



lichsten Eigenschaften derselben, um ihre gegenseitige Abhängigkeit möglichst aufzudecken, aus jeder Erzeugungsart besonders abgeleitet.

Zunächst wurden die Eigenschaften der Parabel aus ihrer Erzeugung als Ort eines Punktes, der von einem festen Punkte und einer festen Geraden gleiche Abstände hat, entwickelt. Diese Erzeugungsart läßt sich in doppelter Weise verallgemeinern; entweder tritt für die feste Gerade ein fester Kreis oder für das Verhältniß 1 der Abstände ein beliebiges anderes Verhältniß ein. Die so erhaltenen Örter sind Ellipsen oder Hyperbeln. Die letztere Erzeugungsart, die sich auch unmittelbar aus der harmonischen Beziehung zwischen Kreis und Kegelschnitt ergibt, ist besonders fruchtbar. Sie führt leicht zu einer direkten Ableitung der Polareigenschaften, sowie zu den Beziehungen zwischen dem Kegelschnitte und den ihn doppelt berührenden Kreisen, welche Steiner im Crelle'schen Journal mitgeteilt hat. Diese Kreise hat man wegen der Analogie mancher ihrer Eigenschaften mit denen der Brennpunkte Brennkreise genannt. So führen sie besonders zu einer Verallgemeinerung der letzten Erzeugungsart, da der Kegelschnitt als Ort eines Punktes erscheint, dessen Abstand von einer festen Geraden zu seiner Tangente oder kürzesten Sehne an einen festen Kreis in einem bestimmten Verhältnisse steht. Von den Berührungskreisen des Kegelschnittes werden außer den doppelt berührenden Kreisen noch die Krümmungskreise näher untersucht und die Steinersche und Newtonsche Konstruktion ihrer Mittelpunkte sowie die bekannteren Ausdrücke ihrer Radien abgeleitet.

Unter den Kegelschnittkonstruktionen sind in größerer Zahl solche behandelt worden, für welche Hauptelemente, also Axen, Brennpunkte, Leitlinien, Durchmesser gegeben sind. Um jedoch die Bedeutung der Polareigenschaften recht hervortreten zu lassen, sind mit alleiniger Benutzung derselben die Konstruktionen der Kegelschnitte aus gegebenen Punkten und Tangenten durchgeführt.

Im dritten Abschnitte werden die wichtigsten Eigenschaften der Kegelschnittbüschel und Kegelschnittscharen mit reellen und imaginären Grundelementen untersucht. Hat ein Büschel zwei oder vier imaginäre Grundpunkte, so läßt es sich durch harmonische Verwandtschaft in ein Kreisbüschel verwandeln und die Eigenschaften des ersteren lassen sich aus denen des letzteren folgern. Aber auch in dem Falle von vier reellen Mittelpunkten führt die Anwendung der harmonischen Verwandtschaft sofort zu dem Hauptsatze, daß die Kegelschnitte des Büschels jede Gerade in einer Involution schneiden, aus welchem Satze



sich dann leicht die Polareigenschaften des Büschels ergeben. Durch Zurückführung auf besonders anschauliche Lagen der Kegelschnitte eines Büschels mittelst der harmonischen Verwandtschaft lassen sich unschwer die Arten der Kegelschnitte erkennen, die in einem Büschel enthalten sind. Besonders hervorgehoben sind solche Eigenschaften, denen analoge Eigenschaften von Kreisbüscheln entsprechen, so namentlich die Beziehungen zwischen konjugierten Kegelschnittbüscheln. Die Eigenschaften von Kegelschnitten, die sich doppelt berühren, sind ausführlich entwickelt und auch hier wieder ist auf diejenigen besonders Rücksicht genommen, die als Verallgemeinerungen von Kreisbeziehungen, namentlich Eigenschaften der Potenzlinie, erscheinen. So erkennt man das Berührungsproblem des Apollonius als einen speziellen Fall der Aufgabe: „Es sind drei Kegelschnitte  $C_1 C_2 C_3$  gegeben, welche einen vierten  $K$  doppelt berühren; man soll einen fünften  $\mathfrak{K}$  konstruieren, der  $K$  doppelt und  $C_1 C_2 C_3$  einfach berührt.“

Wie das cyklische Polarsystem (44) als Kernkurve einen reellen oder imaginären Kreis hat, so enthält ein beliebiges Polarsystem, dessen Konstruktion auf den involutorischen Eigenschaften der Axen beruht, als Kernkurve einen reellen oder imaginären Kegelschnitt, letzteren, wenn die Involutionen auf beiden Axen imaginäre Doppelpunkte haben. Das Polarsystem führt in einfachster Weise nochmals zu den Polareigenschaften der Kegelschnittbüschel, auch solcher, deren Individuen imaginär sind.

Nachdem bis dahin das harmonische Gebilde unmittelbar zur Erforschung der Kegelschnitteigenschaften angewendet ist, wird es im vierten Abschnitte nach Reyes Vorgang zur Herstellung projektivischer Gebilde benutzt, um dem Leser Gelegenheit zu geben, sich mit den fundamentalen Gesetzen derselben, die ja die Grundpfeiler unserer höheren Geometrie sind, vertraut zu machen und ihn die Bedeutung derselben für die Theorie der Kegelschnitte erkennen zu lassen.

Den Schluß bildet eine Anzahl von Sätzen und Aufgaben, welche teils die gegebenen Theorien erweitern, teils den Übungsstoff zu ihrer Anwendung bieten sollen. —

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Werkes war zunächst der Umstand maßgebend, daß wir keine ausführliche elementare Darstellung der Theorie der Kegelschnitte besitzen, dann aber auch der Wunsch des Verfassers, den mathematischen Fachgenossen, den Lehrern an den Gymnasien und Realschulen, bei etwaiger Durchnahme der Kegelschnitte die Bekanntschaft mit den elementaren Methoden derselben zu vermitteln. Wohl nur wenige von ihnen werden Gelegenheit gehabt haben, ein



Kolleg über elementare Geometrie zu hören; die Vorlesungen über projektivische Geometrie bieten aber keinen genügenden Ersatz. Sie liefern keine Methoden, die der zukünftige Lehrer an der Schule verwenden könnte, beanspruchen ein hoch entwickeltes Anschauungsvermögen, das der Studierende häufig von der Schule nicht mitbringt und werden deshalb vielleicht nicht mit demjenigen Eifer und Interesse gehört, den diese größte und durchaus deutsche Schöpfung der Mathematik zu verlangen ein Recht hat.

Es ist einer der schwersten Vorwürfe, den man dem geometrischen Unterrichte unserer Schulen zu machen berechtigt ist, daß ihm noch oft die notwendige konstruktive Grundlage fehlt; in Folge dessen wird die Bildung der räumlichen Anschauungskraft vernachlässigt und so keine Lust zu geometrischen Studien geweckt. Der Studierende wendet Kraft und Neigung der Analysis zu und, wenn er einst als Lehrer an die Schule kommt, wird auch er keine Geometer erziehen. Und doch kann gerade die Geometrie wegen ihrer anschauungsbildenden Kraft durch keine andere Wissenschaft ersetzt werden. — Die elementar-synthetische Behandlungsweise der Kegelschnitte hat bis jetzt im Ganzen wenig Sympathien; man ist sogar soweit gegangen, dieselbe als schwerfällig und deshalb ungeeignet für den Schulunterricht zu erklären. Vielleicht gelingt es der vorliegenden Bearbeitung, die mit elementaren Methoden auch tiefer liegende Eigenschaften der Kegelschnitte ohne Schwierigkeit zu entwickeln vermag, jene Ansichten zu widerlegen und dadurch mittelbar für eine allgemeinere Einführung der Kegelschnitte in den Unterrichtsstoff unserer Schulen zu wirken. Die neuere Geometrie, also namentlich die Eigenschaften des harmonischen Gebildes, der Potenzlinien und Ähnlichkeitspunkte, also ungefähr der Inhalt der von Steiner im Jahre 1833 herausgegebenen kleinen Schrift: „Die geometrischen Konstruktionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises, als Lehrgegenstand auf höheren Unterrichtsanstalten“ ist längst in den mathematischen Lehrplan unserer Schulen aufgenommen. Zu jedem Lehrstoffe gehört aber der notwendige Übungsstoff. Ohne denselben wird er trocken und dürftig. Ein Blick aber auf unsere Aufgabensammlungen, auf die Themata der Abiturientenprüfungen zeigt sofort, daß nur selten jene schönen Theorien entsprechende Anwendung finden. Und doch muß, wenn der geometrische Unterricht unserer Schulen die ihm gebührende Stellung einnehmen soll, das harmonische Gebilde nicht wie bisher als Zweck, sondern als Mittel für jeden weiteren Fortschritt betrachtet werden. Die zahlreichen und so einfachen Anwen-



dungen lassen es geradezu als den Mittelpunkt des geometrischen Pensums der oberen Klassen erkennen. Von diesem Gesichtspunkt aus hat der Verfasser der vorliegenden Schrift ein Schulbuch unter dem Titel: „Die Geometrie für Gymnasien und Realschulen. Ein Lehr- und Übungsbuch, bearbeitet von A. Milinowski. Leipzig bei Teubner“ erscheinen lassen, welches namentlich auch eine kurze Darstellung der Kegelschnitte enthält und zu den einzelnen Abschnitten der neueren Geometrie ausreichenden Übungsstoff bietet. In keinem derselben fließen aber die Aufgaben so zahlreich, leicht und einfach, wie in demjenigen, der die Kegelschnitte behandelt. Erst die Theorie der letzteren giebt für viele Kreiseigenschaften die ausreichende Erklärung und wird dadurch zum notwendigen Schlussstein der elementaren Geometrie. In diesem Sinne, stets Rücksicht nehmend auf die Bedürfnisse der Fachgenossen, ist das vorliegende Buch bearbeitet worden.

Unter den Schriften, die mir vielfache Anregung und Unterstützung geboten haben, nenne ich diejenigen von Kortum, Pfaff, Hankel, Weinmeister, Petersen, Taylor, namentlich aber die Werke von Schroeter, Reye und Salmon-Fiedler. Das Studium der letzteren, die zum Teil denselben Stoff, aber projektivisch oder analytisch behandeln, dürfte durch mein Buch vorbereitet und wesentlich erleichtert werden. Dasselbe wird, so hoffe ich, allen denen nicht unwillkommen sein, welche Neigung oder Veranlassung haben, sich mit der elementaren Theorie der Kegelschnitte zu beschäftigen. Und so übergebe ich dasselbe dem wohlwollenden Urtheile der Fachgenossen mit dem Wunsche, es möge der elementar-synthetischen Forschung Freunde und Anhänger erwerben.

Weissenburg i. Elsaß, November 1881.

Milinowski.



# Inhalt.

## Erster Abschnitt.

### Gerade und Kreis.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| § 1. Das harmonische Gebilde . . . . .                     | 1     |
| § 2. Harmonische Eigenschaften des Kreises . . . . .       | 8     |
| § 3. Kreisbüschel. . . . .                                 | 13    |
| § 4. Involution . . . . .                                  | 16    |
| § 5. Die Ähnlichkeitspunkte . . . . .                      | 31    |
| § 6. Die Kreisverwandtschaft . . . . .                     | 45    |
| § 7. Die harmonische Verwandtschaft . . . . .              | 54    |
| § 8. Anwendungen der harmonischen Verwandtschaft . . . . . | 64    |
| § 9. Die harmonische Abbildung . . . . .                   | 76    |
| § 10. Die Polarisation . . . . .                           | 78    |

## Zweiter Abschnitt.

### Die Kegelschnitte.

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 11. Der Kegelschnitt als harmonische Kurve des Kreises. . . . .                     | 81  |
| § 12. Pol und Polare beim Kegelschnitte . . . . .                                     | 86  |
| § 13. Konjugierte Punkte und Strahlen . . . . .                                       | 87  |
| § 14. Bestimmung der Kegelschnitte durch Punkte und Tangenten                         | 91  |
| § 15. Die Brennpunkte . . . . .                                                       | 49  |
| § 16. Konstruktion der Kegelschnitte aus gegebenen Punkten und<br>Tangenten . . . . . | 105 |
| § 17. Poldreiecke . . . . .                                                           | 109 |
| § 18. Die Parabel . . . . .                                                           | 119 |
| § 19. Ellipse und Hyperbel . . . . .                                                  | 133 |
| § 20. Die Berührungskreise eines Kegelschnittes . . . . .                             | 189 |
| § 21. Konstruktion von Kegelschnitten . . . . .                                       | 216 |

## Dritter Abschnitt.

### Kegelschnittbüschel und Kegelschnittschar.

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| § 22. Das Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten . . | 249 |
| § 23. Die Kegelschnittschar mit vier reellen Tangenten . . . .  | 255 |



|                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 24. Gemeinschaftliche Punkte und Tangenten . . . . .                               | 261   |
| § 25. Das Kegelschnittbüschel mit zwei und vier imaginären<br>Grundpunkten . . . . . | 268   |
| § 26. Die Kegelschnittschar mit zwei und vier imaginären Tangenten                   | 293   |
| § 27. Kegelschnitte in doppelter Berührung . . . . .                                 | 307   |
| § 28. Das Polarsystem . . . . .                                                      | 323   |

### Vierter Abschnitt.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| § 29. Die projektivischen Gebilde . . . . . | 353 |
| Sätze und Aufgaben . . . . .                | 379 |

---



## Erster Abschnitt.

### Gerade und Kreis.

#### § 1.

##### Das harmonische Gebilde.

1. Auf einer Geraden sei  $AB$  eine Strecke und  $C$  ein Punkt innerhalb oder außerhalb derselben. Seine Entfernungen  $AC$  und  $BC$  von den Endpunkten der Strecke heißen die *Abschnitte* derselben.

2. Eine feste Gerade  $a$  hat mit einer beweglichen  $x$ , die sich um einen festen Punkt  $A$  dreht, in jeder Lage der letzteren einen Schnittpunkt. Nur in der parallelen Lage giebt es keinen Schnittpunkt. Um jedoch diese Ausnahme zu beseitigen, giebt man auch parallelen Geraden einen Schnittpunkt im Unendlichen, so daß ganz allgemein der Satz gilt: „Irgend zwei Gerade einer Ebene haben einen Schnittpunkt.“ Da es durch  $A$  nur eine Parallele zu  $a$  giebt, so folgt noch:

a. *Jede Gerade hat nur einen unendlichen fernen Punkt.*

b. *Alle unendlich fernen Punkte einer Ebene liegen auf einer Geraden  $g_{\infty}$  (der unendlich fernen Geraden).*

Denn die Verbindungsgerade zweier unendlich fernen Punkte kann sich nicht ins Endliche erstrecken, weil eine Gerade nur einen unendlich fernen Punkt hat.

3. *Eine Strecke  $AB$  in zwei Abschnitte zu teilen, die in einem bestimmten Verhältnisse  $m : n$  stehen.*

Man ziehe durch  $A$  und  $B$  zwei parallele Gerade, schneide Fig. 1. auf ihnen  $AE : BF = m : n$  ab, mache  $BG = BF$ , ziehe  $EF$  und  $EG$ , so sind  $C$  und  $D$  die gesuchten Teilpunkte. Denn aus ähnlichen Dreiecken folgt







Setzt man in 3.  $m = n$  so fällt  $C$  in die Mitte von  $AB$  und  $D$  ins Unendliche.

c. Ist  $AB$  in  $C$  und  $D$  harmonisch geteilt und in  $M$  halbiert, so ist  $MA^2 = MC \cdot MD$ .

Aus der Proportion  $AC : BC = AD : BD$  folgt, (Fig. 1),

$$AM + MC : BM - MC = AM + MD : MD - MB$$

oder da  $AM = BM$  ist, durch Umformung

$$AM : CM = DM : AM$$

und

$$AM^2 = CM \cdot DM$$

d. Sind von den vier harmonischen Punkten  $ABCD$  drei, etwa  $ABC$ , gegeben, so folgt die Konstruktion von  $D$  aus Fig. 1. Rückt  $C$  nach  $B$  hin, so bewegt sich auch  $D$  nach  $B$  und wenn  $C$  mit  $B$  zusammenfällt, so fällt auch  $D$  mit  $B$  zusammen.

Durchläuft der Punkt  $C$  die Strecke  $AB$  in der Richtung von  $A$  nach  $B$ , so durchläuft  $D$  von  $A$  aus in der Richtung von  $B$  nach  $A$  durch's Unendliche die ganze Gerade, bis er gleichzeitig mit  $C$  in  $B$  anlangt.

5. Vier Strahlen, welche einen Punkt  $S$  mit vier harmonischen Punkten  $ABCD$  verbinden, heißen vier harmonische Strahlen und bilden ein harmonisches Strahlenbüschel  $S(ABCD)$ ,  $S$  heißt der Scheitel des Büschels. Die durch zugeordnete Punkte gehenden Strahlen heißen zugeordnete Strahlen.

6. Die vier harmonischen Punkte  $ABCD$  verbinde man (Fig. 1) mit dem beliebigen Punkte  $E$  und schneide sie durch eine Transversale in  $A_1 B_1 C_1 D_1$ . Durch  $B_1$  ziehe man  $F_1 G_1 \parallel FG$  so muß  $B_1 F_1 = B_1 G_1$  sein, weil  $BF = BG$  ist. Daraus aber folgt, wegen der Konstruktion in 3., daß  $A_1 B_1 C_1 D_1$  vier harmonische Punkte sind. Also:

a. Zieht man zu einem von vier harmonischen Strahlen eine Parallele, so halbiert der ihm zugeordnete Strahl das von den beiden anderen begrenzte Stück der Parallelen.

b. Vier harmonische Strahlen schneiden jede Transversale in vier harmonischen Punkten.

c. Stehen zwei zugeordnete Strahlen auf einander senkrecht, so halbieren sie die von den anderen gebildeten Winkel.

Denn ist  $EA \perp EB$ , so ist  $\triangle BEF \cong BEG$ , und daher  $\sphericalangle BEF = BEG$ .



d. Halbiert ein Strahl den Winkel zweier anderen, so steht er auf dem ihm zugeordneten harmonischen senkrecht. (cf. c.)

e. Wenn von vier Strahlen durch einen Punkt zwei aufeinander senkrecht stehen und die Winkel der anderen halbieren, so sind es harmonische Strahlen. (cf. c.)

f. Der Satz a. giebt eine einfache Konstruktion von vier harmonischen Strahlen.

g. Die Aufgabe: „Zu drei Strahlen den vierten harmonischen zu konstruieren“ löst man mit Benutzung von a. oder b.

7. Beschreibt man über dem Abstände zweier zugeordneten harmonischen Punkte als Durchmesser einen Kreis, so haben alle Punkte desselben von den beiden anderen zugeordneten Punkten ein konstantes Abstandsverhältnis.




Fig. 2.

Nach 6 c. ist  $\sphericalangle BEC = \sphericalangle BED$  und, daher  $EC : ED = BC : BD$ .

8. Zwei Strecken  $AB$  und  $CD$  auf einer Geraden durch ein Punktpaar harmonisch zu teilen.

a.  $AB$  liegt ganz außerhalb  $CD$ .

Über  $AC$  und  $BD$  zeichne man zwei Kreisbogen (Halbkreise), deren Periphe-




Fig. 3a.

riewinkel sich zu  $180^\circ$  ergänzen und sich schneiden; einer ihrer Schnittpunkte sei  $S$ . Halbiert man die Winkel  $ASB$  und  $CSD$  durch  $SE$  und  $SF$ , so teilen

$E$  und  $F$  die Strecken  $AB$  und  $CD$  harmonisch.

Da  $\alpha = \beta$ ,  $\gamma = \delta$ ,  $ASC + BSD = \alpha + \beta + \varepsilon + \gamma + \delta + \varepsilon$ ,



so ist  $\beta + \gamma + \varepsilon = 90^\circ$ , also sind nach 6e.  $S(ABEF)$  und  $S(CDEF)$  harmonisch.

Es erübrigt noch nachzuweisen, dass  $EF$  das einzige Punktpaar ist, welches gleichzeitig  $AB$  und  $CD$  harmonisch teilt. Aus dem Vorigen ergibt sich, daß  $S$  auf dem Kreise über  $EF$  als Durchmesser liegt. Wählt man auf diesem beliebig einen Punkt  $X$ , so ist  $\angle AXC + BXD = 180^\circ$ , also müssen alle Kreispaaire durch  $AC$  und  $BD$ , deren Peripheriewinkel zusammen  $180^\circ$  betragen, sich auf dem Kreise über  $EF$  treffen und es ist  $EF$  das einzige Punktpaar, welches der Aufgabe genügt.

b.  $CD$  liegt innerhalb  $AB$  (Fig. 3b.).

Über  $AC$  und  $BD$  oder  $AD$  und  $BC$  beschreibe man zwei




Fig. 3b.

sich schneidende Kreisbogen von gleichem Peripheriewinkel; ist  $S$  ein Schnittpunkt derselben, so haben die Winkel  $ASB$

und  $CSD$  dieselben Halbierungslinien und diese teilen daher  $AB$  und  $CD$  in  $M$  und  $N$  harmonisch.

Der Kreis über  $MN$  hat die Eigenschaft, daß jedem seiner Punkte die Strecken  $AC$  und  $BD$  unter gleichen Winkeln erscheinen.

Auf dieser Eigenschaft beruht die Auflösung der folgenden Aufgabe:

„Auf einer Geraden sind drei Strecken gegeben, man soll einen Punkt konstruieren, welchem dieselben unter gleichen Winkeln erscheinen.“

Sind  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$  drei Strecken einer Geraden, so konstruiere man die Kreise, von deren Punkten man  $AB$  und  $CD$  oder  $AB$  und  $EF$  unter gleichen Winkeln sieht. Von ihren Schnittpunkten erscheinen alle drei Strecken unter gleichen Winkeln.

c.  $CD$  liegt teils innerhalb, teils außerhalb  $AB$ .

In diesem Falle hat die Aufgabe keine Lösung; das gesuchte Punktpaar ist *imaginär*.



Zwei auf einer Geraden liegende Strecken besitzen demnach stets ein reelles oder imaginäres Punktpaar, welches beide harmonisch teilt.

d. Der Endpunkt  $D$  der einen Strecke liegt im Unendlichen.

Ist  $EF$  das teilende Punktpaar und  $D$  im Unendlichen, so ist  $CE = CF$  und nach 4c.  $CE^2 = CA \cdot CB$ .

9. Ein *vollständiges Vierseit* ist eine Gruppe von vier Geraden mit ihren sechs Schnittpunkten; es hat drei Diagonalen.

10. *Jede Diagonale eines vollständigen Vierseits wird durch die beiden anderen harmonisch geteilt.*

Das vollständige Vierseit sei  $ABCDEF$  mit den drei Diagonalen  $AC$ ,  $BD$ ,  $EF$ .

Man denke sich zu  $AE$ ,  $AF$ ,  $AH$  und  $CE$ ,  $CF$ ,  $CH$  die vierten harmonischen Strahlen  $x$  und  $y$  konstruiert, welche




Fig. 4.

$AH$  und  $CH$  zugeordnet sind, so werden die Strahlen beider Büschel  $EF$  in vier harmonischen Punkten treffen und da drei dieser Punkte, nämlich  $EFH$ , für beide Büschel dieselben sind, so müssen sich  $x$  und  $y$  in einem Punkte von  $EF$ , welcher dem Punkte

$H$  zugeordnet ist, treffen. Aus demselben Grunde müssen sich  $x$  und  $y$  auch auf  $BD$  schneiden, also fällt ihr Schnittpunkt mit demjenigen  $J$  von  $EF$  und  $BD$  zusammen. Es sind also  $BDGJ$  und  $EFHJ$  harmonisch.

Das harmonische Büschel  $F$  ( $BDGJ$ ) schneidet aber auch die Diagonale  $AC$  in der harmonischen Reihe  $ACGH$ .

11. Der letzte Satz gestattet eine Anzahl von Konstruktionen nur mit Hilfe des Lineals auszuführen.

a. Zu drei Strahlen den vierten harmonischen zu konstruieren.

Die drei Strahlen seien  $AE$ ,  $AF$ ,  $AH$ . Auf demjenigen  $AH$ , zu welchem der zugeordnete konstruiert werden soll, nehme man beliebig  $C$ , ziehe durch  $C$  zwei Gerade, welche



die anderen beiden Strahlen in  $B$  und  $E$ ,  $D$  und  $F$  treffen, endlich  $BD$  und  $EF$  bis zu ihrem Schnittpunkte  $J$ , so ist  $AJ$  der gesuchte Strahl.

b. Zu drei Punkten den vierten harmonischen zu konstruieren.

Durch 6b. zurückgeführt auf a.

c. Durch einen gegebenen Punkt zu einer halbierten Strecke eine Parallele zu ziehen.




Fig. 5.

Gegeben ist  $AB = BC$  und Punkt  $D$ . Auf  $AD$  wähle man  $E$  beliebig, ziehe  $BE$ ,  $CE$ ,  $CD$ ,  $AF$  und endlich  $DG$ .

In dem vollständigen Vierseit  $DEFGCA$  wird die Diagonale  $AC$  von den beiden anderen  $DG$  und  $EF$  harmo-

nisch geteilt. Da  $AB = BC$ , so muß der Schnittpunkt von  $AB$  und  $DG$  nach 4b. im Unendlichen liegen.

d. Eine Strecke auf einer von zwei Parallelen zu halbieren (Fig. 5).

e. Von einer Strecke  $AC$  auf einer von zwei Parallelen den dritten Teil abzuschneiden (Fig. 5).

Man schneidet  $AF$  mit  $BD$  in  $J$  und  $AB$  mit  $EJ$  in  $H$ , so ist  $AH = \frac{1}{3} AC$ .

Denn im vollständigen Vierseite  $EDFJAB$  wird  $AB$  durch  $EJ$  und  $DF$  in  $H$  und  $C$  harmonisch geteilt, also ist  $AH : BH = AC : BC = 2 : 1$ .

f. In ähnlicher Weise kann man nacheinander  $\frac{1}{4} AC$ ,  $\frac{1}{5} AC$ , ... abschneiden.

g. Gegeben sind drei Gerade  $abc$ , die nicht durch einen Punkt gehen, und ein Punkt  $D$ ; man soll durch  $D$  eine Transversale legen, welche  $abc$  in solchen Punkten  $ABC$  schneidet, dass  $ABCD$  harmonische Punkte sind.

$a$  und  $c$  scheiden sich in  $E$ ; man ziehe  $ED$  und konstruiere zu  $a$ ,  $c$ ,  $ED$  den vierten harmonischen,  $ED$  zugeordneten, Strahl. Er treffe  $b$  in  $B$ ; dann ist  $DB$  die verlangte Transversale.



h. Gegeben sind drei Punkte  $ABC$ , die nicht in gerader Linie liegen und eine Gerade  $d$ ; man soll auf  $d$  einen Punkt bestimmen, dessen Verbindungslinien mit  $ABC$  solche Gerade  $abc$  sind, dass  $abcd$  harmonische Strahlen sind.

## §. 2.

## Harmonische Eigenschaften des Kreises.

12. Zwei Punkte, welche den Durchmesser eines Kreises harmonisch teilen, heißen *harmonische Pole*; die Senkrechte in einem heißt die *Polare* des anderen und dieser ihr *Pol*.

13. Der Radius ist die mittlere Proportionale zwischen den Entfernungen zweier harmonischen Pole vom Mittelpunkt.

Folgt aus 4c.

14. Jede Sehne eines Kreises wird durch einen ihrer Punkte und seine Polare harmonisch geteilt.

Der Durchmesser  $AB$  sei in  $C$  und  $D$  harmonisch geteilt; in  $C$  sei auf  $AB$  die




Fig. 6.

Senkrechte errichtet, welche die Polare von  $D$  ist und durch  $D$  eine beliebige Sehne  $EF$  gelegt, welche die Polare von  $D$  in  $G$  schneidet, so sollen  $EFDG$  harmonische Punkte sein.

In dem harmonischen Büschel  $E(ABCD)$  steht  $EA \perp EB$ , also ist  $\sphericalangle \alpha = \beta$  (6c.), daher auch  $\widehat{BF} = \widehat{BH}$

und  $\gamma = \delta$ ; also ist (6e.)  $C(EFGD)$  harmonisch.

a. Die Polare eines außerhalb des Kreises gelegenen Punktes ist seine Berührungssehne. (4d.)

b. Die Polare eines Kreispunktes ist seine Tangente.

c. Die Polare des Mittelpunktes ist die unendlich ferne Gerade. (4b.)

15. Die Gerade, welche zwei Diagonalepunkte eines vollständigen Kreisvierecks verbindet, ist die Polare des dritten.



Da die Sehnen  $AB$  und  $CD$  durch  $F$  und  $EG$  harmonisch geteilt werden, so ist  $EG$  die Polare von  $F$ .




Fig. 7.

Drei Punkte von der Lage, dass die Verbindungslinie von zweien die Polare des dritten ist, sind die Ecken eines *Pol-dreiecks*.

16. Wenn ein Punkt eine Gerade durchläuft, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden. Fig. 7.

I.  $F$  und  $f$  seien Pol und Polare,  $E$  sei ein beliebiger Punkt von  $f$ . Man ziehe  $EA$ ,  $FA$ ,  $FD$  und erhält die Schnittpunkte  $B$  und  $C$ ; diese




Fig. 8.

müssen wegen 14. und 10. mit  $E$  in einer Geraden liegen, also ist  $FG$  die Polare von  $E$ .

II.  $F$  und  $f$  seien Pol und Polare und  $E$  ein beliebiger Punkt von  $f$ . Man ziehe  $OE$ ,  $FL \perp OE$ , so ist  $OK \cdot OF = OL \cdot OE = r^2$ , also sind (13)  $E$  und  $L$  harmonische

Pole und  $FL$  ist die Polare von  $E$ .







20. *Die Polaren von vier harmonischen Punkten sind harmonische Strahlen, und die Pole von vier harmonischen Strahlen sind harmonische Punkte.*

Auf einer Geraden  $g$  seien  $ABCD$  vier harmonische Punkte; ihre Polaren schneiden sich im Pole  $G$  von  $g$  und stehen auf den Strahlen des Büschels  $O(ABCD)$  senkrecht, wenn  $O$  der Mittelpunkt des Kreises ist. Deshalb muss das Büschel der Polaren dem harmonischen Büschel  $O(ABCD)$  kongruent sein.

21. *In jedem einem Kreise eingeschriebenen Vierecke schneiden sich die Gegenseiten und die Tangenten in den Gegenecken in vier harmonischen Punkten.*

Die Diagonalen des eingeschriebenen Vierecks  $KGHI$  Fig. 10. schneiden sich in  $PQR$ , deshalb ist  $QR$  die Polare von  $P$  und die Pole der Diagonalen  $KH$  und  $GI$ , d. h. die Schnittpunkte  $E$  und  $F$  der Tangenten in ihren Endpunkten müssen auf  $QR$  liegen. Da aber  $P(ABGH)$  nach 10. harmonisch ist, so müssen  $RQFE$  nach 20. auch harmonisch sein.

22. *In jedem einem Kreise umgeschriebenen Vierseite sind die Verbindungslinien der Gegenecken und der Berührungspunkte auf den Gegenseiten vier harmonische Strahlen.*

Beweis wie in 21. an Fig. 10.

23. Zwei Punkte, von denen jeder auf der Polare des anderen (16) liegt, heißen *konjugierte Punkte* in Bezug auf den Kreis; zwei Strahlen, von denen jeder (19) durch den Pol des anderen geht, heißen *konjugierte Strahlen*.




Fig. 11 a.

24. *Einem Punkte sind alle Punkte seiner Polare und einem Strahle alle Strahlen seines Poles konjugiert. (16, 19).*







Durchmessers  $A_1M$  sind konjugiert in Bezug auf  $O$ , weil  $ME^2 = MD_1^2 = MA_1 \cdot MB_1$  ist, also sind  $A_1$  und  $B_1$  harmonische Pole für den Kreis  $M$  und da  $B_1E_1 \perp A_1M$ , so ist  $B_1E_1$  die Polare von  $A_1$  in Bezug auf den Kreis  $M$ , folglich sind  $A_1$  und  $E_1$  konjugierte Punkte in Bezug auf diesen Kreis. Die imaginären Schnittpunkte der Geraden  $A_1E_1$  und des Kreises  $M$  teilen also  $A_1E_1$  harmonisch. Es folgt:

c. Wenn zwei Kreise sich rechtwinklig schneiden, so sind zwei diametrale Punkte des einen konjugiert in Bezug auf den anderen.

## § 3.

## Kreisbüschel.

28. Zieht man durch einen Punkt  $P$  beliebige Sehnen eines Kreises, so sind die Produkte aus ihren Abschnitten einander gleich und zwar gleich dem Quadrate der Tangente durch  $P$  oder gleich dem Quadrate seiner halben kürzesten Sehne, je nachdem er ausserhalb oder innerhalb des Kreises liegt. Dieses konstante Produkt heisst „die Potenz des Kreises im Punkte  $P$ .“




Fig. 13.

29. Schneiden sich zwei Kreise  $O$  und  $O_1$  in  $A$  und  $B$ , so haben sie in jedem Punkte  $P$  von  $AB$  gleiche Potenz. Ein



Punkt, in welchem zwei Kreise gleiche Potenz haben, heisst ein *Potenzpunkt* derselben. Sind  $p$  und  $p_1$  seine Entfernungen von den Mittelpunkten,  $r$  und  $r_1$  die Radien der Kreise, so ist  $p^2 - p_1^2 = r^2 - r_1^2$ , denn die Tangenten von  $P$  an die Kreise sind gleich. Haben  $O$  und  $O_1$  keinen gemeinschaftlichen Punkt und schneidet man sie mit einem Kreise  $K$  in  $CD$  und  $C_1D_1$ , so haben sie im Durchschnitte  $P$  von  $CD$  und  $C_1D_1$  gleiche Potenz, denn  $PC \cdot PD = PC_1 \cdot PD_1$  (28). Da mit veränderlichem  $K$  auch  $P$  sich ändert, so giebt es unendlich viele kontinuierlich aufeinander folgende Potenzpunkte von  $O$  und  $O_1$ . Alle diese Punkte liegen auf einer geraden Linie. Denn gäbe es auf  $CD$  ausser  $P$  noch einen Potenzpunkt  $P'$ , und schneidet man mit  $P'C_1$  den Kreis  $O_1$  noch in  $D'_1$ , so wäre  $P'C \cdot P'D = P'C_1 \cdot P'D'_1$  und es müssten die vier Punkte  $CDC_1D'_1$  auf einem Kreise liegen, dieser hätte mit  $K$  die drei Punkte  $CDC_1$  gemeinsam und muss daher mit ihm zusammenfallen; also fallen auch  $D_1$  und  $D'_1$  und daher auch  $P$  und  $P'$  zusammen. Also:

a. *Der Ort der Potenzpunkte zweier Kreise ist eine Gerade und heisst die „Potenzlinie“ oder der „Potenzort“ der Kreise.*

Diese muss aus Symmetriegründen senkrecht zur Centrale stehen.

b. *Wenn zwei Kreise sich schneiden, so ist die gemeinschaftliche Sehne ihre Potenzlinie.*

30. *Die drei Potenzlinien dreier Kreise  $OO_1O_2$  schneiden sich in einem Punkte, dem Mittelpunkte desjenigen Kreises der  $O_1O_2O_3$  rechtwinklig schneidet, — Orthogonalkreis — oder von  $O_1O_2O_3$  unter dem Durchmesser geschnitten wird.*

Denn der Schnittpunkt der Potenzlinien von  $OO_1$  und  $O_1O_2$  ist ein Potenzpunkt von  $OO_2$ .

Dieser Satz liefert ein bequemes Mittel zur Konstruktion der Potenzlinien zweier sich nicht schneidenden Kreise.

31. Die Centrale  $OO_1$  schneidet diese Kreise in  $EF$  und  $E_1F_1$  und die Potenzlinie  $p$  in  $Q$ , dann ist  $QE \cdot QF = QE_1 \cdot QF_1$ . Konstruiert man ein Punktpaar  $E_2F_2$ , so dass  $QE_2 \cdot QF_2 = QE \cdot QF$ , und über  $E_2F_2$  als Durchmesser einen Kreis  $O_2$  so hat dieser mit  $O$  und  $O_1$  die Gerade  $p$  zur Potenzlinie. Da es unzählig viele Punktpaare wie  $E_2F_2$  gibt, so gibt es auch unzählig viele Kreise, welche mit  $O$  und  $O_1$  dieselbe Potenzlinie  $p$  haben.



Alle Kreise, welche dieselbe Potenzlinie haben, bilden ein „Kreisbüschel.“ Ihre Schnittpunkte, falls sie vorhanden sind heißen *Grundpunkte*.

Der Punkt  $Q$ , in dem die Potenzlinie von der Centrale geschnitten wird, heisst der „*Centralpunkt*“ des Büschels.

32. Da zwei Kreise eines Büschels mit Grundpunkten ausser diesen keinen gemeinschaftlichen Punkt haben können, so kann durch irgend einen Punkt der Ebene nur ein Kreis des Büschels gehen.

Sind  $O$  und  $O_1$  die beiden das Büschel bestimmenden Kreise und schneiden sich dieselben nicht, so lege man durch einen Punkt  $C_2$  einen Kreis  $K$ , der  $O$  in  $C$  und  $D$  trifft, schneide die Potenzlinie von  $OO_1$  mit  $CD$  in  $P$  und  $K$  mit  $C_2P$  in  $D_2$ , lege durch  $C_2D_2$  einen Kreis, dessen Mittelpunkt  $O_2$  auf der Centrale  $OO_1$  liegt, so ist er derjenige Kreis des Büschels, welcher durch  $C_2$  geht.

33. Auf der Potenzlinie  $p$  des Büschels ( $OO_1$ ) sei  $M$  irgend ein Punkt; da er ein Potenzpunkt des Büschels ist, so sind die von ihm an die Kreise des letzteren gezogenen Tangenten einander gleich und es läßt sich um ihn ein Kreis legen, der alle Kreise des Büschels rechtwinklig schneidet. Er treffe  $p$  in  $G$  und  $H$ , so sind diese Punkte (27c) konjugierte Punkte in Bezug auf alle Kreise des Büschels. Ist  $Q$  der Centralpunkt des Büschels, so ist auch  $QG \cdot QH$  constant (25), also:

a. *Zwei Punkte der Potenzlinie, welche konjugiert sind für einen Kreis des Büschels, sind es für alle.*

Diese Eigenschaft hat auſser der Potenzlinie noch die unendlich ferne Gerade. Sind  $G'$  und  $H'$  auf  $g_\infty$  konjugierte Punkte für den Kreis  $O$ , also  $OG' \perp OH'$ , so ist auch  $O_1G' \perp O_1H'$  also sind  $G'$  und  $H'$  auch konjugiert für  $O_1$ .

Wenn der Punkt  $M$  die Potenzlinie  $p$  durchläuft, so durchläuft der Kreis  $M$  eine Reihe von Kreisen, die von allen Kreisen des Büschels ( $OO_1$ ) rechtwinklig geschnitten werden, also in jedem der Punkte  $OO_1O_2 \dots$  gleiche Potenz, deshalb die Centrale  $OO_1$  zur Potenzlinie haben und folglich ein Büschel ( $M$ ) bilden. Die beiden Kreisbüschel ( $O$ ) und ( $M$ ) heißen „*konjugierte Büschel*“ und stehen in einer solchen Beziehung, daß jeder Kreis des einen Büschels jeden des anderen rechtwinklig schneidet.

Schneiden sich die Kreise  $O$  und  $O_1$ , so liegen die End-



punkte  $EF$  und  $E_1F_1$  ihrer Durchmesser auf der Centrale zu beiden Seiten des Centralpunktes und da sie in Bezug auf den Kreis  $M$  konjugierte Punkte sind, so kann  $OO_1$  diesen Kreis nicht schneiden. Haben aber  $O$  und  $O_1$  keine gemeinschaftlichen Punkte, so liegen die Endpunkte  $EF$  und  $E_1F_1$  auf derselben Seite von  $Q$ , also schneidet  $OO_1$  den Kreis  $M$  in denjenigen Punkten, welche jene Durchmesser harmonisch teilen. Hieraus folgt:

b. *Wenn die Kreise eines Büschels zwei gemeinschaftliche Punkte haben, so haben die Kreise des konjugierten Büschels keine gemeinschaftlichen Punkte und umgekehrt.*

In anderer Fassung: *Wenn zwei Kreise sich schneiden, so trifft kein Orthogonalkreis derselben ihre Centrale, wenn die Kreise sich nicht schneiden, so trifft jeder Orthogonalkreis ihre Centrale in denjenigen beiden Punkten, welche die auf ihr liegenden Durchmesser harmonisch teilen.*

Aus diesem Satze folgt eine andere Konstruktion der Aufgabe 8.

34. Durch einen beliebigen Punkt  $C_2$  läßt sich nach 32. ein Kreis des Büschels legen; in diesem sei  $C'_2$  der diametrale Punkt von  $C_2$ . Dann sind  $C_2$  und  $C'_2$  konjugierte Punkte in Bezug auf alle Kreise  $OO_1O_2\dots$ , also schneiden sich die Polaren von  $C_2$  in Bezug auf diese Kreise in  $C'_2$ .

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle Kreise eines Büschels schneiden sich in einem Punkte.*

#### § 4.

##### Die Involution.

35. Haben die Punktpaare  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  zu einem Punkte  $Q$  eine solche Lage, dass  $QA \cdot QA_1 = QB \cdot QB_1 = QC \cdot CC_1 = \dots$  ist und liegen je zwei Punkte eines Paares entweder immer auf derselben Seite oder immer auf verschiedenen Seiten von  $Q$ , so bilden die Punktpaare eine „*Punktinvolution*“.  $Q$  heißt der „*Centralpunkt*“ und das konstante Produkt  $QA \cdot QA_1$  die „*Potenz der Involution*“.

Die Verbindungslinien eines Punktes mit den Punktpaaren einer Punktinvolution bilden die Strahlenpaare einer *Strahleninvolution*.



36. a. *Alle Paare von konjugierten Punkten einer Geraden in Bezug auf einen Kreis bilden eine Involution. (25).*

b. *Alle Paare von konjugierten Strahlen eines Punktes in Bezug auf einen Kreis bilden eine Involution. (23).*

c. *Die Kreise eines Büschels schneiden jede Gerade in den Punktpaaren einer Involution.*

Denn alle Kreise haben im Schnittpunkte der Geraden mit der Potenzlinie gleiche Potenz.

d. *Durch die Punktpaare einer Involution lassen sich die Kreise eines Büschels legen.*

Sind  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  Punktpaare einer Involution mit dem Centralpunkte  $Q$  und legt man durch  $AA_1$  und  $BB_1$  zwei Kreise  $\alpha$  und  $\beta$ , die sich in  $S$  und  $T$  schneiden, so muß die Potenzlinie  $ST$  durch  $Q$  gehen, weil  $Q$  ein Potenzpunkt der Kreise ist und ein durch  $STC$  gelegter Kreis muß auch durch  $C_1$  gehen.

e. *Zwei Punktpaare einer Involution bestimmen dieselbe. Zwei Involutionen auf einer Geraden haben daher höchstens ein gemeinschaftliches Punktpaar.*

Denn legt man durch sie zwei Kreise, so bestimmt deren Potenzlinie den Centralpunkt der Involution.

f. *Die Punktpaare einer Involution bilden für alle Kreise eines bestimmten Büschels Paare konjugierter Punkte. Zwei Punkte eines Paares heißen konjugierte Punkte der Involution.*

Ueber den Entfernungen  $AA_1$  und  $BB_1$  als Durchmesser beschreibe man Kreise  $\alpha$  und  $\beta$  so sind  $AA_1, BB_1$  und alle Punktpaare der durch sie bestimmten Involution Paare konjugierter Punkte in Bezug auf jeden Kreis des dem Büschel ( $\alpha\beta$ ) konjugierten Kreisbüschels. (33, 27c.)

g. Sind die Punktpaare  $AA_1, BB_1, \dots$  Paare konjugierter Punkte in Bezug auf einen Kreis  $O$  (Fig. 11a und 11b), so giebt es in dem Falle, daß alle Punktpaare stets auf einer Seite von  $Q$  liegen, Fig. 11a, ein Punktpaar  $MN$ , welches die Punkte eines jeden Paares harmonisch trennt. Da  $QM^2 = QN^2 = QA \cdot QA_1$  (4c), so fallen in  $M$  sowohl wie in  $N$  zwei Punkte eines Paares zusammen; daher heißen  $M$  und  $N$  Doppelpunkte der Involution.

*Die Doppelpunkte einer Involution trennen irgend zwei konjugierte Punkte derselben harmonisch.*



Eine Involution, bei welcher je zwei konjugierte Punkte auf entgegengesetzten Seiten des Centralpunktes liegen, hat keine Doppelpunkte.

37. Zieht man durch einen Punkt  $P$  Sehnen eines Kreises,  $AA_1, BB_1, \dots$  und verbindet deren Endpunkte mit einem Punkte  $R$  der Peripherie, so bilden die Verbindungslinien die Strahlenpaare einer Involution.




Fig. 14.

Man schneide den Kreis mit  $PR$  in  $R_1$ , so sind die Schnittpunkte  $\alpha$  und  $\alpha_1$  von  $RA$  mit  $R_1A_1$  und  $RA_1$  mit  $R_1A$  konjugierte Punkte in Bezug auf den Kreis (15). Es treffen also die Strahlenpaare  $R(AA_1, \dots)$  die Gerade  $p$  in Punktpaaren einer Involution. (36a).


38. Jede Strahleninvolution kann auf die in 37. angegebene Art hervorgerufen werden. Sind nämlich (Fig. 14)  $\alpha\alpha_1, \beta\beta_1, \dots$  Punktpaare einer Involution auf einer Geraden  $p$  und ist  $R$  ein beliebiger Punkt, so sind  $R(\alpha\alpha_1, \beta\beta_1, \dots)$  Strahlenpaare einer Involution. Die Kreise über  $\alpha\alpha_1, \beta\beta_1, \dots$  bilden ein Büschel (36c); unter den Kreisen des konjugierten Büschels giebt es einen  $O$ , der durch  $R$  geht; er schneide die Strahlenpaare in  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$ . Da  $\alpha$  und  $\alpha_1$  konjugierte Punkte in Bezug auf  $O$  sind, so müssen  $A\alpha_1$  und  $A_1\alpha$  sich in einem Punkte  $R_1$  von  $O$  schneiden. Der Schnittpunkt  $P$  von  $AA_1$  und  $RR_1$  ist aber der Pol von  $p$ , durch den also alle Sehnen  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  gehen müssen.

39. Zwei Strahleninvolutionen in demselben Punkte haben höchstens ein gemeinschaftliches Strahlenpaar.

Die Kreise  $M$  und  $\mathfrak{M}$  schneiden sich in  $R$ ; durch  $R$  lege man zwei Strahlenpaare  $aa_1$  und  $bb_1$ , welche die Kreise in  $AA_1, BB_1$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  schneiden. Man bestimme die Schnittpunkte  $P$  und  $\mathfrak{P}$  der Sehnen  $AA_1, BB_1$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ . Zieht



man durch  $P$  und  $\mathfrak{P}$  in den Kreisen  $M$  und  $\mathfrak{M}$  Sehnen, so bestimmen die Verbindungslinien ihrer Endpunkte mit  $R$  zwei Strahleninvolutionen, welche nach 38. ganz allgemeiner Natur





40a. Jeder Kreis durch den Scheitel einer Strahleninvolution schneidet die Strahlenpaare in solchen Punktpaaren, daß ihre Verbindungslinien sich in einem Punkte treffen. Dieser Punkt heißt das „*Involutioncentrum*.“

Es seien  $aa_1, bb_1, cc_1, \dots$  die Strahlenpaare einer Involution mit dem Scheitel  $R$ ; ein Kreis durch  $R$  schneide sie in  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$ . Die Geraden  $AA_1$  und  $BB_1$  mögen sich in  $P$  treffen. Dann läßt sich durch  $P$  und den Kreis in  $R$  eine Involution hervorrufen, welche mit der ersten zwei Strahlenpaare gemeinsam hat und daher mit ihr identisch ist. Also geht auch  $CC_1$  durch  $P$ .

b. Die Schenkel aller rechten Winkel mit demselben Scheitel bilden eine Involution.

c. In jeder Involution giebt es ein Paar zu einander senkrechter konjugierter Strahlen. Diese heißen die „*Axen der Involution*.“

41. Jede Gerade wird von einer Strahleninvolution in einer Punktinvolution geschnitten.

I. Beweis. Die Strahlenpaare  $R(aa_1, bb_1, cc_1, \dots)$  werden von einer Geraden  $g$  in  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  geschnitten. Wären nun nicht

$$AA_1, BB_1, CC_1, \dots$$

sondern

$$AA_1, BB_1, CC'_1, \dots$$

in Involution, so wären auch die Strahlen  $R(AA_1, BB_1, CC'_1, \dots)$  in Involution. Da aber auch  $R(AA_1, BB_1, CC_1, \dots)$  in Involution sind, so fallen  $RC_1$  und  $RC'_1$ , also auch  $C_1$  und  $C'_1$  zusammen.

II. Beweis. Auf  $g$  seien  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  Punktpaare

einer Involution mit dem Centralpunkte  $Q$ . Ihre Verbindungslinien mit  $R$  bilden eine Strahleninvolution. Eine Parallele durch  $A_1$  zu  $AR$  werde von den Strahlenpaaren in  $BB_1, CC_1, \dots$




Fig. 16.

getroffen;  $RQ_1 \parallel g$ . Dann ist aus ähnlichen Dreiecken



$$A_1 \mathfrak{B} = \frac{A_1 B}{AB} \cdot AR, \quad A_1 \mathfrak{B}_1 = \frac{A_1 B_1}{AB_1} \cdot AR,$$

also

$$A_1 \mathfrak{B} \cdot A_1 \mathfrak{B}_1 = \frac{A_1 B \cdot A_1 B_1}{AB \cdot AB_1} AR^2$$

Aus

$$AQ : BQ = B_1 Q : A_1 Q$$

folgt

$$AQ - BQ : B_1 Q - A_1 Q = AQ : B_1 Q$$

und

$$AQ + B_1 Q : BQ + A_1 Q = AQ : BQ$$

oder

$$AB : A_1 B_1 = AQ : B_1 Q$$

und

$$AB_1 : A_1 B = AQ : BQ,$$

also

$$\frac{AB \cdot AB_1}{A_1 B \cdot A_1 B_1} = \frac{AQ^2}{BQ \cdot B_1 Q}$$

und daher:

$$A_1 \mathfrak{B} \cdot A_1 \mathfrak{B}_1 = \frac{BQ \cdot B_1 Q}{AQ^2} \cdot AR^2$$

Da die rechte Seite konstant ist, so ist auch das Produkt  $A_1 \mathfrak{B} \cdot A_1 \mathfrak{B}_1$  konstant, d. h. die Punktpaare  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1, \dots$  bilden eine Involution mit dem Centralpunkte  $A_1$ .

Zieht man auch zu  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  eine beliebige Parallele, welche die Involutionssstrahlen in  $\mathfrak{B}'\mathfrak{B}'_1, \mathfrak{C}'\mathfrak{C}'_1, \dots$  schneidet, so ist

$$A_1 \mathfrak{B} : A_1' \mathfrak{B}' = A_1 R : A_1' R$$

$$A_1 \mathfrak{B}_1 : A_1' \mathfrak{B}'_1 = A_1 R : A_1' R,$$

also

$$A_1' \mathfrak{B}' \cdot A_1' \mathfrak{B}'_1 = \frac{A_1 \mathfrak{B} \cdot A_1 \mathfrak{B}_1 \cdot A_1' R^2}{A_1 R^2},$$

d. h. die Punktpaare  $\mathfrak{B}'\mathfrak{B}'_1, \mathfrak{C}'\mathfrak{C}'_1, \dots$  bilden eine Involution mit dem Centralpunkte  $A_1'$ . Da also die Strahleninvolution jede zu einem ihrer Strahlen parallele Gerade in einer Punktinvolution trifft, so ist der Satz bewiesen.

Dieser zweite Beweis hat dem ersten gegenüber den Vorteil, daß er ohne Benutzung der Eigenschaften der Kreisbüschel und konjugierten Punkte geführt ist.

42. Von den Aufgaben über Involutionen seien einige, die häufig vorkommen, aufgeführt:

a. *Von einer Punktinvolution kennt man zwei Punktpaare; man soll den Centralpunkt und die Doppelpunkte konstruieren.*

Sind  $AA_1 BB_1$  zwei Punktpaare auf der Geraden  $g$ , so lege man durch jedes derselben einen Kreis; die Potenzlinie beider Kreise schneide  $g$  in  $Q$ . Ist dann  $q^2 = QA \cdot QA_1$  so mache man  $QM = QN = q$ .



b. *Von einer Strahleninvolution kennt man zwei Strahlenpaare; man soll die Doppelstrahlen finden.*

Durch den Scheitel  $S$  der Strahlenpaare  $aa_1$  und  $bb_1$  lege man einen Kreis, welcher diese in  $AA_1$  und  $BB_1$  trifft, ziehe  $AA_1$  und  $BB_1$  bis zu ihrem Schnittpunkte  $J$  und von  $J$  die Tangenten  $JM$  und  $JN$  an den Kreis, so sind  $SM$  und  $SN$  die gesuchten Doppelstrahlen.

c. *Auf einer Geraden  $g$  liegen zwei Involutionen; man soll das beiden gemeinschaftliche Punktpaar konstruieren.*

Durch jede Involution und einen Punkt  $S$  ist ein Kreisbüschel bestimmt; außer  $S$  seien  $S_1$  und  $S_2$  die Grundpunkte dieser Kreisbüschel. Beiden gemeinsam ist der durch  $SS_1S_2$  bestimmte Kreis und dieser schneidet  $g$  in demjenigen Punktpaare, welches beiden Involutionen angehört.

d. *In einem Punkte  $S$  liegen zwei Strahleninvolutionen; man soll das gemeinsame Strahlenpaar ermitteln.*

Die Strahlenpaare jeder Involution schneiden einen Kreis, der durch den Scheitel gelegt ist, in solchen Punktpaaren, daß die Verbindungslinien sich in einem Punkte schneiden. Man erhält also zwei solche Punkte  $J_1$  und  $J_2$ , die Involutionen centra; die Verbindungslinie schneidet den Kreis in einem Punktpaare und die Verbindungslinien seiner Punkte mit dem Scheitel bilden das gemeinsame Strahlenpaar.

e. *Auf einer Geraden liegen eine Involution und ein Punktpaar; man soll dasjenige Punktpaar der Involution konstruieren, welches das gegebene harmonisch trennt.*

Alle Punktpaare, welche das gegebene harmonisch trennen, bilden eine Involution. 3c.

f. *Dasjenige Strahlenpaar einer Involution zu ermitteln, welches zwei gegebene Punkte harmonisch trennt. e.*

g. *Das rechtwinklige Strahlenpaar einer Involution zu ermitteln.*

Durch den Scheitel  $S$  der Involution lege man einen Kreis mit dem Mittelpunkte  $M$ , konstruiere das Involutioncentrum  $J$ , so schneidet die Gerade  $JM$  den Kreis in zwei Punkten, deren Verbindungslinien mit  $S$  das gesuchte Strahlenpaar bilden.

h. *In einer involutorischen Punktreihe diejenigen konjugierten Punkte zu bestimmen, welche von einem gegebenen Punkte  $P$  gleichweit entfernt sind.*



Von  $P$  schneide man  $PA = PA_1$ ,  $PB = PB_1$ , ... ab, so bilden die Punktpaare  $AA_1$ ,  $BB_1$ , ... eine Involution. Das Punktpaar, welches beiden Involutionen gemeinsam ist, liefert die gesuchten Punkte.

43. Ist  $p$  die Potenzlinie des Kreisbüschels  $(OO_1)$ , so liegt der zu einem Punkte  $A$  derselben konjugierte Punkt  $A_1$  bezüglich aller Kreise des Büschels wieder auf  $p$ . (34, 33a). Wenn  $A$  die Potenzlinie durchläuft, so durchläuft auch  $A_1$  dieselbe; alle Punktpaare  $AA_1$  bilden eine Involution. Hat das Büschel  $(OO_1)$  Grundpunkte, so sind dieselben die Doppelpunkte der Involution. Bei einem Büschel ohne Grundpunkte hat die Involution konjugierter Punkte auf der Potenzlinie auch keine Doppelpunkte. Um jedoch eine allgemeine Fassung der Sätze zu ermöglichen, teilt man einer solchen Involution „*imaginäre Doppelpunkte*“ zu, welche daher auch als die imaginären Schnittpunkte der Kreise mit ihrer Potenzlinie anzusehen sind, denn jeder Punkt, dessen konjugierter bezüglich eines Kreises mit ihm zusammenfällt, liegt auf der Peripherie. Da aber zwei konjugierte Punkte die durch sie gelegte Kreissehne harmonisch trennen, so hat man auch den imaginären Doppelpunkten die Eigenschaft beizulegen, daß sie jedes Punktpaar der Involution harmonisch trennen, in Übereinstimmung mit der in 8c. gegebenen Definition.

Mit  $P$  bezeichne man den Pol von  $p$  in Bezug auf den Kreis  $O$ . Wenn  $P$  außerhalb des Kreises liegt, so sind die Schnittpunkte  $SS'$  von  $p$  mit  $O$  reell und  $PS$ ,  $PS'$  sind die reellen Tangenten. Für den Fall, daß  $P$  innerhalb und also  $p$  außerhalb liegt, sollen die imaginären Verbindungslinien von  $P$  mit den imaginären Schnittpunkten von  $p$  und  $O$  „*die imaginären Kreistangenten*“ durch  $P$  heißen. Wenn  $P$  mit dem Mittelpunkte  $O$  zusammenfällt, so heißen seine Tangenten die „*Kreisasymptoten*“. Diese sind also (36a) die imaginären Doppelstrahlen der dem Punkte zugehörigen Involution solcher Strahlen, die in Bezug auf den Kreis konjugiert sind.

Die dem Mittelpunkt zugehörige Involution konjugierter Strahlen ist rechtwinklig d. h. je zwei konjugierte Strahlen stehen aufeinander senkrecht. Sie schneidet die unendlich ferne Gerade in der ihr zugehörigen Involution konjugierter Punkte,



durch deren imaginären Doppelpunkte also der Kreis gehen muß. Und weil für jeden Kreis diese Involution dieselbe ist, so folgt:

a. *Alle Kreise der Ebene gehen durch feste imaginäre Punkte auf der unendlich fernen Geraden. Diese Punkte heißen die „Kreispunkte“ der Ebene.*

b. *Zwei konjugiert imaginäre Punkte liegen stets auf einer reellen Geraden; zwei konjugiert imaginäre Strahlen schneiden sich in einem reellen Punkte.*

Sind  $O$  und  $O_1$  zwei sich nicht schneidende Kreise, so giebt es auf ihrer Centrale zwei Punkte  $Q$  und  $R$ , welche beide Kreisdurchmesser harmonisch teilen. In ihnen schneiden sich alle Kreise  $MM_1M_2\dots$ , welche  $O$  und  $O_1$  rechtwinklig schneiden; sie treffen die Potenzlinie  $p$  von  $OO_1$  in einer Involution, welche aus den in Bezug auf  $O$  und  $O_1$  konjugierten Punkten besteht. Die imaginären Doppelpunkte dieser Involution sind die imaginären Schnittpunkte von  $p$  mit  $O$  und  $O_1$ . Verbindet man  $Q$  und  $R$  mit den Punktpaaren dieser Involution, so erhält man zwei Strahleninvolutionen von der Eigenschaft, daß je zwei konjugierte Strahlen auf einander senkrecht stehen. Die imaginären Doppelstrahlen  $qq_1$  und  $rr_1$  beider Involutionen schneiden demnach die Potenzlinie  $p$ , sowie  $g_\infty$  in den beiden imaginären Punktpaaren, in welchen diese Geraden von  $O$  und  $O_1$  getroffen werden. Man hat demnach diese Doppelstrahlen  $qq_1$   $rr_1$  als vier gemeinschaftliche imaginäre Sekanten der Kreise  $O$  und  $O_1$  anzusehen. Es folgt:

c. *Zwei Kreise, die sich nicht in reellen Punkten schneiden, haben sechs gemeinschaftliche Sekanten, von denen zwei, die Potenzlinie und die unendlich ferne Gerade, reell und vier imaginär sind. Die letzteren sind paarweise konjugiert imaginär und schneiden sich in zwei reellen Punkten, nämlich in zwei Ecken des beiden Kreisen gemeinschaftlichen Poldreiecks.*

Die aus  $Q$  und  $R$  nach den imaginären Kreispunkten gezogenen imaginären Strahlen schneiden sich in zwei imaginären Punkten der Potenzlinie von  $O$  und  $O_1$ .

Es seien nun  $M$  und  $M_1$  zwei Kreise mit den reellen Schnittpunkten  $Q$  und  $R$ ,  $O$  und  $O_1$  zwei diese rechtwinklig schneidende Kreise, so treffen sich die von  $Q$  und  $R$  nach den imaginären Kreispunkten gezogenen Geraden in den imagi-



nären Doppelpunkten derjenigen Involution, welche die Kreise des Büschels  $(MM_1)$  auf der Centrale bestimmen.

d. *Zwei Kreise  $M$  und  $M_1$  die sich in reellen Punkten schneiden, haben demnach sechs gemeinschaftliche Sekanten, von denen zwei, die Potenzlinie und die unendlich ferne Gerade, reell und vier imaginär sind. Von diesen sind je zwei paarweise konjugiert imaginär; sie treffen sich in zwei imaginären Punkten der Centrale. Von dem Poldreiecke der Kreise  $MM_1$  ist also nur eine Ecke reell, die beiden anderen sind imaginär.*

Zur Begründung des Ausdrucks imaginär dient Folgendes. Es ist, Fig. 11a und b, das Produkt  $QA \cdot QA_1$  konstant gleich  $QO \cdot QP$ . Dieses Produkt  $QO \cdot QP$  heißt die *Potenz* der Involution  $AA_1 \dots$  mit dem Centralpunkte  $Q$ . Sie sei gleich  $q^2$ . Wenn  $A$  und  $A_1$  auf einer Seite von  $Q$  liegen, so haben die Strecken  $QA$  und  $QA_1$  gleiches Zeichen und die Potenz  $q^2$  ist positiv; wenn aber (Fig. 11b)  $A$  und  $A_1$  auf entgegengesetzten Seiten von  $Q$  liegen, so haben die Strecken  $QA$  und  $QA_1$  entgegengesetzte Zeichen und die Potenz  $q^2$  ist negativ. Man hat also entweder

$$q^2 = + QO \cdot QP \text{ und } q = \sqrt{+ QO \cdot QP}$$

oder 
$$q^2 = - QO \cdot QP \text{ und } q = \sqrt{- QO \cdot QP}$$

und es ist  $q$  reell oder imaginär. Da im ersten Falle  $QM^2 = q^2$ , so kann man auch im zweiten Falle sagen, daß die imaginären Schnittpunkte des Kreises und der Geraden  $p$  erhalten werden, wenn man die imaginäre Strecke  $q$  von  $Q$  aus nach beiden Seiten auf  $p$  abträgt.

#### 44. Der imaginäre Kreis.

Auf einer Geraden  $g$  durch den festen Punkt  $O$  denke man sich eine Involution mit dem Centralpunkte  $O$ , die imaginäre Doppelpunkte hat. Sind  $A$  und  $A_1$  zwei zugeordnete Punkte, so haben die Strecken  $OA$  und  $OA_1$  entgegengesetzte Richtung und das Produkt  $OA \cdot OA_1$  ist negativ. Man setze  $OA \cdot OA_1 = -r^2$ . Beschreibt man mit  $\sqrt{-r^2}$  um  $O$  einen Kreis, so erhält man einen *imaginären Kreis mit reellem Mittelpunkt und rein imaginärem Radius*. In Bezug auf diesen Kreis nennt man auch  $A$  und  $A_1$  harmonische Pole und die Senkrechte in einem die Polare des anderen. Dem Punkte  $A$  sind



alle Punkte seiner Polare  $a$  und der Geraden  $a$  alle Geraden durch ihren Pol  $A$  konjugiert.

Ist  $B_1$  ein beliebiger Punkt der Polare  $a$  von  $A$ , die also durch  $A_1$  geht und auf  $OA_1$  senkrecht steht und fällt man  $AB \perp OB_1$ , so ist

$$\triangle OAB \sim OA_1B_1, \text{ also } OB \cdot OB_1 = OA \cdot OA_1 = -r^2.$$

Mithin sind  $BB_1$  harmonische Pole und  $AB$  ist die Polare von  $B_1$ . Da aber  $\angle ABO = 90^\circ$  ist, so folgt:

*Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so durchläuft sein harmonischer Pol in Bezug auf einen reellen oder imaginären Kreis einen Kreis und seine Polare dreht sich um den Pol der Geraden.*

Die Gesamtheit aller Paare von harmonischen Polen und von Pol und Polare heißt auch in diesem Falle ein *cyklisches Polarsystem*. Man unterscheidet zwei Arten solcher cyklischen Polarsysteme, wie zwei Arten der Involution, je nachdem die auf irgend einem Durchmesser liegende Involution der harmonischen Pole reelle oder imaginäre Doppelpunkte hat. Der Ort dieser Doppelpunkte heißt der *Kernkreis* des Polarsystem und ist im ersten Falle reell, im zweiten imaginär.

Unter der Potenz des imaginären Kreises  $O$  mit dem




Fig. 17.

Radius  $\sqrt{-r^2}$  in einem Punkte  $P$  versteht man die Größe  $p^2 = OP^2 - (\sqrt{-r^2})^2 = OP^2 + r^2$ ; der imaginäre Kreis hat also in jedem Punkte der Ebene positive Potenz. „Der Kreis, der mit  $p$  um  $P$  beschrieben wird, schneidet den imaginären Kreis rechtwinklig.“ Scheidet dieser den Durchmesser  $OP$  in  $CC_1$ , so ist

$OC \cdot OC_1 = (OP + CP) \cdot (OP - CP) = OP^2 - CP^2 = -r^2$ , also sind  $C$  und  $C_1$  harmonische Pole. Umgekehrt schneidet jeder über dem Abstände zweier harmonischen Pole als Durchmesser gezeichnete Kreis den Kreis  $O$  rechtwinklig. — Auch wenn man durch zwei harmonische Pole  $AA_1$  einen beliebigen Kreis  $P$  legt, so muß er  $O$  rechtwinklig schneiden. Denn trifft



$P$   
 $PO$  den Kreis  $M$  in  $CC_1$ , so ist  $OA \cdot OA_1 = OC \cdot OC_1 = -r^2$ , also sind  $CC_1$  harmonische Pole.

45.  $AB$  sei ein beliebiger Durchmesser des Kreises  $P$ ; man schneide diesen Kreis mit  $AO$  in  $A_1$  dann ist  $AO \cdot A_1O = CO \cdot C_1O = -r^2$ , also sind  $AA_1$  harmonische Pole bezüglich des Kreises  $O$  und da  $A_1B \perp AA_1$  ist, so ist  $A_1B$  die Polare von  $A$  und  $AB$  sind konjugierte Punkte. — Also:

a. *Wenn ein reeller Kreis einen imaginären rechtwinklig schneidet, so sind die Endpunkte eines Durchmessers des ersteren konjugierte Punkte bezüglich des anderen. — Jeder Kreis, welcher durch zwei harmonische Pole eines imaginären Kreises oder über der Entfernung zweier konjugierten Punkte als Durchmesser konstruiert wird, schneidet diesen rechtwinklig.*

Zwei imaginäre Kreise mit den Mittelpunkten  $O$  und  $O_1$  haben die Radien  $\sqrt{-r^2}$  und  $\sqrt{-r_1^2}$ . Soll ein Punkt  $P$  ein Potenzpunkt beider sein, so muß  $OP^2 + r^2 = O_1P^2 + r_1^2$ , also  $OP^2 - O_1P^2 = -(r^2 - r_1^2)$  sein. Fällt man  $PR' \perp OO_1$ , so ist  $OP^2 - O_1P^2 = OR'^2 - O_1R'^2$  und wenn  $S$  ein beliebiger Punkt dieser Senkrechten  $p'$  ist, so ist auch  $OS^2 - O_1S^2 = OR'^2 - O_1R'^2 = -(r^2 - r_1^2)$  und jeder Punkt von  $p'$  ist ein Potenzpunkt,  $p'$  selbst die Potenzlinie beider Kreise. Hieraus folgt:

b. *Der Ort aller Potenzpunkte zweier imaginären Kreise ist eine Gerade, die Potenzlinie der Kreise; sie steht auf der Centrale senkrecht.*

46. Zwei reelle Kreise  $M$  und  $M_1$  schneiden sich in den reellen Punkten  $A$  und  $B$ ; die gemeinschaftliche Sekante ist die Potenzlinie. Um die außerhalb der Kreise liegenden Punkte  $O$  derselben, welche die positive Potenz  $OA \cdot OB$  haben, lassen sich reelle Kreise zeichnen, welche  $M$  und  $M_1$  rechtwinklig schneiden; die innerhalb der Kreise  $M$  und  $M_1$  liegenden Potenzpunkte  $O$  haben die negative Potenz  $-OA \cdot OB$ . Daher lassen sich um letztere keine reellen rechtwinklig schneidenden Kreise konstruieren. Ist  $r$  die halbe kleinste Sehne durch  $O$  in einem der beiden Kreise, so ist  $OA \cdot OB = -r^2$  und der mit  $\sqrt{-r^2}$  um  $O$  konstruierte imaginäre Kreis schneidet  $M$  und  $M_1$  rechtwinklig. Beschreibt man aber mit  $r$  um



$O$  einen Kreis, so sind seine gemeinschaftlichen Sehnen mit den Kreisen  $M$  und  $M_1$  Durchmesser von ihm; er wird von  $M$  und  $M_1$  unter dem Durchmesser geschnitten. Also:

Soll man die Potenzlinie der imaginären Kreise  $O$  und  $O_1$  mit den Radien  $\sqrt{-r^2}$  und  $\sqrt{-r_1^2}$ , konstruieren, so beschreibe man um  $O$  und  $O_1$  Kreise mit  $r$  und  $r_1$  und konstruiere den Ort der Mittelpunkte derjenigen Kreise, welche die letzteren unter dem Durchmesser schneiden.

47. Man konstruiere die Potenzlinie  $p$  der reellen mit  $r$  und  $r_1$  beschriebenen Kreise  $O$  und  $O_1$ , ziehe durch einen beliebigen Punkt  $B$  von  $p$  die Durchmesser  $CD$  und  $C_1D_1$ , so




Fig. 18.

müssen  $CDC_1D_1$  auf einem Kreise liegen, da  $BC \cdot BD = BC_1 \cdot BD_1$  ist. Sein Mittelpunkt  $M$  liegt in dem Schnittpunkt der Mittelsenkrechten von  $CD$  und  $C_1D_1$ , also ist  $BOMO_1$  ein Kreisviereck und durch seine Ecken läßt sich ein Kreis legen, dessen Mittelpunkt  $N$  auf  $BM$  liegen muß. Fällt man  $NQ \perp OO_1$ , so ist  $OQ = O_1Q$  folglich liegt  $N$  auf der Mittelsenkrechten  $n$  von  $OO_1$ . Fällt man von  $M$  die Gerade  $p'$  senkrecht auf  $OO_1$ , so ist  $n$  die Mittellinie von  $pp'$ . Der Kreis  $N$  schneidet aber  $O$  und  $O_1$  unter dem Durchmesser. Also:



a. *Die Mittelpunkte aller Kreise, welche zwei andere unter dem Durchmesser oder zwei imaginäre Kreise rechtwinklig schneiden, liegen auf einer Geraden  $p'$ .*

Sind  $M$  und  $M_1$  zwei dieser Kreise, so sind  $O$  und  $O_1$  Potenzpunkte für beide, also müssen sie sich in zwei festen Punkten der Centrale schneiden; die Mittelsenkrechte dieser Punkte ist  $p'$ . Es folgt:

b. *Alle Kreise, welche zwei imaginäre Kreise rechtwinklig oder zwei reelle Kreise unter dem Durchmesser schneiden, treffen sich in zwei festen Punkten der Centrale.*

48. Die Gerade  $p'$  nennt man den *zweiten Potenzort* der Kreise  $O$  und  $O_1$ . Seinen Schnittpunkt  $R'$  mit der Centrale findet man, indem man diese in  $Q$  halbiert, ihren Schnittpunkt  $R$  mit der Potenzlinie bestimmt und  $QR' = QR$  macht.

*Die drei zweiten Potenzörter dreier Kreise schneiden sich in einem Punkte — oder — die drei Potenzlinien dreier imaginären Kreise schneiden sich in einem Punkte.*

Denn der Schnittpunkt von zwei Potenzlinien ist ein Potenzpunkt aller drei Kreise.

49. Es seien jetzt  $O$  ein reeller,  $O_1$  ein imaginärer Kreis mit den Radien  $r$  und  $\sqrt{-r_1^2}$ . Ein Punkt  $P$  ist ein Potenzpunkt beider, wenn  $OP^2 - r^2 = O_1P^2 + r_1^2$ , also  $OP^2 - O_1P^2 = r^2 + r_1^2$  ist. Man fälle  $PR'' \perp OO_1$ , dann ist  $OP^2 - O_1P^2 = OR''^2 - O_1R''^2$  und wenn  $S$  ein beliebiger Punkt dieser Senkrechten  $p''$  ist, so ist auch  $OS^2 - O_1S^2 = OR''^2 - O_1R''^2 = r^2 + r_1^2$ . Also ist jeder Punkt von  $p''$  ein Potenzpunkt der Kreise  $OO_1$ .

Man gelangt zur Geraden  $p''$  auf folgendem Wege. Um  $O_1$  denke man sich wieder einen reellen Kreis mit dem Radius  $r_1$  und zwei Kreise  $MM_1$  konstruiert, welche  $O$  rechtwinklig und diesen reellen Kreis  $O_1$  unter dem Durchmesser schneiden. Die Kreise  $M$  und  $M_1$  müssen die Centrale  $OO_1$  schneiden, die Punkte  $O$  und  $O_1$  sind aber Potenzpunkte der Kreise  $MM_1$ , also ist  $OO_1$  die Potenzlinie von  $MM_1$ . Daher müssen alle Kreise  $M$  sich in zwei festen Punkten  $EF$  der Centrale  $OO_1$  schneiden und ihre Mittelpunkte liegen auf der Mittelsenkrechten  $p''$  von  $EF$ .



Um sie zu konstruieren, errichte man den zu  $OO_1$  senkrechten Durchmesser  $A_1B_1$  des Kreises  $O_1$ , ziehe von  $A_1$  die Tangente  $A_1A$  an den Kreis  $O$ , halbiere  $AA_1$  in  $C$  und fälle von  $C$  die Senkrechte auf  $A_1O_1$ , so trifft sie die Centrale  $O_1O_2$  in ihrem Schnittpunkte mit der Geraden  $p''$ , denn sie ist die Potenzlinie des Kreises  $O_1$  und des Punktes  $A_1$ . Die Gerade  $p''$  erhält auch den Namen *dritter Potenzort* der Kreise  $OO_1$ . Also:

a. *Alle Kreise, welche einen reellen und einen imaginären Kreis rechtwinklig oder einen von zwei reellen Kreisen rechtwinklig und den anderen unter dem Durchmesser schneiden, treffen sich in zwei festen Punkten der Centrale.*

b. *Für drei gegebene Kreise  $O_1O_2O_3$  schneiden sich immer je zwei dritte und ein erster oder zweiter Potenzort in einem Punkte — oder die Potenzlinien dreier Kreise, von denen zwei reell und einer imaginär oder einer reell und zwei imaginär sind, schneiden sich in einem Punkte.*

50. Der Begriff des cyklischen Polarsystems umfaßt sowohl den reellen wie den imaginären Kreis. Der Kürze wegen soll mit dem Worte Kreis fortan sowohl der reelle wie der imaginäre Kreis bezeichnet werden, dadurch erlangt man den Vorteil, den Wortlaut gewisser Definitionen und Sätze die für den Fall reeller Kreise aufgestellt sind, sofort auf imaginäre Kreise übertragen zu können.

Man nennt die Gesamtheit aller Kreise, welche dieselbe Potenzlinie haben, ein Kreisbüschel. In jedem Kreisbüschel giebt es gleichviel reelle und imaginäre Kreise, da jeder Punkt der Centrale sowohl Mittelpunkt eines reellen als Mittelpunkt eines imaginären Kreises des Büschels ist. Denselben Punkt bezeichne man mit  $M$  oder  $\mathfrak{M}$ , je nachdem er Mittelpunkt eines reellen oder imaginären Kreises ist. Alle Kreise, welche zwei Kreise eines Büschels und demnach sämtliche Kreise desselben rechtwinklig schneiden, bilden wieder ein Büschel, dessen Potenzlinie die Centrale des ersten ist, da jeder Punkt der Centrale ein Potenzpunkt aller rechtwinklig schneidenden Kreise ist. Das zweite Büschel heißt dem ersten konjugiert.

51. *Die Polaren eines Punktes  $G$  in Bezug auf alle Kreise eines Büschels schneiden sich in einem Punkte.*

Durch den Punkt  $G$  geht ein einziger Kreis  $O$  des kon-



jugierten Büschels; durch den zweiten Endpunkt seines Durchmessers  $GG'$  gehen die Polaren von  $G$  bezüglich aller Kreise des Büschels, da  $G$  und  $G'$  nach einem obigen Satze (45a.) konjugierte Punkte in Bezug auf jeden Kreis dieses Büschels sind.

## § 5.

## Die Ähnlichkeitspunkte.

52. *Ähnlichkeitspunkte* zweier Kreise sind diejenigen Punkte, welche die Centrale im Verhältnisse der Radien harmonisch teilen. Derjenige von ihnen, welcher auf der Centrale selbst liegt, heißt der *innere*, der andere der *äußere* Ähnlichkeitspunkt.

Die Ähnlichkeitspunkte sind daher die Schnittpunkte der gemeinschaftlichen äußeren oder inneren Tangenten (3), denn die Radien nach den Berührungspunkten sind parallel.

Jede Gerade durch einen der Ähnlichkeitspunkte, welche die Kreise trifft, muß sie in solchen Punktpaaren schneiden, daß ihre Radien paarweise parallel sind (3), denn es giebt außer den Ähnlichkeitspunkten keine Punkte, welche die Centrale im Verhältnisse der Radien teilen. (3.)

## 53. Die Inversion.

Durch den Ähnlichkeitspunkt  $A$  zweier Kreise  $O_1$  und  $O_2$  Fig. 19. ziehe man eine Gerade, welche den Kreisen in  $C_1D_1$  und  $C_2D_2$  begegnet. Da  $O_1C_1 \parallel O_2C_2$ ,  $O_1D_1 \parallel O_2D_2$ , so ist auch  $A_1C_1 \parallel A_2C_2$  und  $B_1D_1 \parallel B_2D_2$  und weil  $A_1B_1D_1C_1$  ein Kreisviereck ist, so müssen auch  $A_1B_2D_2C_1$  und  $B_1A_2C_2D_1$  Kreisvierecke sein, denn sie haben parallele Seiten, also gleiche Winkel. Zieht man noch eine gemeinschaftliche Tangente durch  $A$ , welche in  $E_1$  und  $E_2$  berührt, so müssen auch  $A_1E_1E_2B_2$  und  $B_1E_1E_2A_2$  Kreisvierecke sein, also ist  $AA_1 \cdot AB_2 = AB_1 \cdot AA_2 = AC_1 \cdot AD_2 = AE_1 \cdot AE_2$  konstant. Dieses konstante Produkt heißt die *Potenz* des Ähnlichkeitspunkts.

Eine Gerade durch einen Ähnlichkeitspunkt heißt ein „*Ähnlichkeitsstrahl*“; zwei Punkte eines solchen, wie  $A_1$  und  $B_2$ ,  $D_1$  und  $C_2$ , deren Abstände vom Ähnlichkeitspunkte ein konstantes Produkt liefern, heißen „*inverse Punkte*“.

Verwandelt man die Potenz des Ähnlichkeitspunktes  $A$



in das Quadrat  $a^2$  und beschreibt mit  $a$  um  $A$  einen Kreis, so heißt dieser der „äußere Potenzkreis“. In gleicher Weise findet man einen „inneren Potenzkreis“.




Fig. 19.

Wie man aus den beiden Kreisen  $O_1$  und  $O_2$  den Potenzkreis  $A$  konstruieren kann, so läßt sich auch aus dem Kreise  $A$  und einem der Kreise  $O_1, O_2$  der andere finden. — Nennt man nämlich den Radius des Potenzkreises  $a$ , und nimmt auf dem Kreise  $O_1$  drei beliebige Punkte  $A_1, B_1, C_1$ , so lassen sich auf den Geraden  $AA_1, AB_1, AC_1$  drei Punkte  $A_2, B_2, D_2$  mittelst der Gleichungen

$$a^2 = AA_1 \cdot AB_2 = AB_1 \cdot AA_2 = AC_1 \cdot AD_2$$

konstruieren. Diese bestimmen einen Kreis  $O_2'$ . Der äußere Potenzkreis beider ist aber  $A$ , also muß  $O_2'$  mit  $O_2$  zusammenfallen.

In gleicher Weise existiert zu jedem beliebigen Kreise  $M_1$  ein anderer  $M_2$  von der Lage, daß ihr äußerer Potenzkreis der Kreis  $A$  ist. Solche zwei Kreise haben also  $A$  als äußeren Ähnlichkeitspunkt; sie heißen *inverse Kreise* für den



Kreis  $A$  und je zwei Punkte auf einer Geraden durch  $A$ , deren Abstände von  $A$  das konstante Produkt  $r^2$  haben, heißen *inverse Punkte* für den Kreis  $A$ .

Die Beziehung, in welche dadurch irgend zwei Punkte der Ebene gebracht sind, heißt *Inversion*; der Punkt  $A$  heißt das *Inversionscentrum*; das Radiusquadrat  $r^2$  heißt die *Inversionspotenz*.

Aus dem Vorigen folgt sofort:

a. *Durchläuft ein Punkt einen Kreis, so durchläuft der inverse Punkt auch einen Kreis oder*

*Die inverse Figur eines Kreises ist wieder ein Kreis; das Inversionscentrum ist ein Ähnlichkeitspunkt beider Kreise.*

b. *Die Schnittpunkte inverser Kreise liegen auf dem Potenzkreise.*

Denn im Schnittpunkte zweier Kreise fallen zwei inverse Punkte zusammen.

c. *Die inverse Figur eines Kreises, welcher durch das Inversionscentrum geht, ist eine Gerade und umgekehrt.*

Denn der inverse Punkt zum Inversionscentrum muß im Unendlichen liegen, weil  $r^2 = o \cdot \infty$  sein muß; der inverse Kreis hat also einen unendlich fernen Punkt und degeneriert in eine Gerade.

Auch in folgender Weise ergibt sich der Beweis. In




Fig. 19a.

den Schnittpunkten  $A_{12}$  und  $B_{12}$  der beiden Kreise  $A$  und  $O_1$  fallen je zwei inverse Punkte zusammen. Die auf  $A_{12}B_{12}$  senkrechte Centrale  $AO_1$  schneidet diese Gerade in  $C_2$  und den Kreis  $O_1$  in  $C_1$ ; ferner treffe eine beliebige Gerade diesen Kreis in  $D_1$  und die gemeinschaftliche Sehne in  $D_2$ , dann ist  $\angle AA_{12}C_1 = 90^\circ$  und  $C_1D_1D_2C_2$  ein Kreisviereck, also

$$AA_{12}^2 = AC_1 \cdot AC_2 = AD_1 \cdot AD_2.$$

Der Kreis  $O_1$  und die Gerade  $A_{12}B_{12}$  sind also inverse Figuren. Da  $A$  als Ähnlichkeitspunkt beider anzusehen ist, so ergibt sich:

d. *Die Ähnlichkeitspunkte einer Geraden und eines Kreises sind die Schnittpunkte des letzteren mit der Geraden, welche aus seinem Mittelpunkte auf die erste senkrecht gefällt ist. (Cf. 44.)*



Die Eigenschaften der Inversion werden sich später in anderer Form nochmals ergeben. Cf. §. 6. — Man hat die Inversion auch „*Princip der reciproken Radien*“ genannt.

Fig. 19. 54. Aus  $\beta = \alpha = \gamma$ ,  $\beta = \eta$ ,  $\gamma = \delta$  folgt  $\eta = \delta$  und  $MD_1 = MC_2$ , d. h.

a. *In zwei inversen Punkten zweier Kreise werden diese von einem dritten berührt und umgekehrt.*

Durch zwei Paar inverser Punkte z. B.  $D_1 C_2 B_1 A_2$  läßt sich ein Kreis  $N$  legen. Weil  $\beta = \gamma = \eta = \delta$ , so ist auch  $\sphericalangle O_1 D_1 C_2 = \sphericalangle O_2 C_2 D_1$  und weil  $\sphericalangle N D_1 C_2 = \sphericalangle N C_2 D_1$  ist, so muß auch  $\sphericalangle O_1 D_1 N = \sphericalangle O_2 C_2 N$  sein. Daraus folgt:

b. *Jeder Kreis, welcher durch zwei Paar inverser Punkte zweier anderen gelegt wird, schneidet diese unter gleichen Winkeln.*

c. *Jeder Kreis, welcher zwei andere unter gleichen Winkeln schneidet, trifft diese in zwei Paaren inverser Punkte.*

Denn ist  $N$  ein Kreis, der  $O_1$  und  $O_2$  unter gleichen Winkeln schneidet, ist also  $\sphericalangle O_1 D_1 N = \sphericalangle O_2 C_2 N$ , so muß auch  $\sphericalangle O_1 D_1 C_2 = \sphericalangle O_2 C_2 D_1$  sein, weil  $\sphericalangle N D_1 C_2 = \sphericalangle N C_2 D_1$  ist. Daher ist auch  $\eta = \delta$ , woraus sich leicht  $O_1 C_1 \parallel O_2 C_2$  ergibt.

55. a. *Jeder Kreis, welcher zwei andere unter gleichen Winkeln schneidet, schneidet ihren äußeren Potenzkreis rechtwinklig.*

Denn  $AB_1 : AA_2 = AD_1 \cdot AC_2 = a^2$ .

b. *Der äußere Potenzkreis zweier Kreise gehört dem durch diese bestimmten Büschel an.*

Denn er schneidet alle Kreise des konjugierten Büschels wegen a. rechtwinklig.

c. *Jeder Kreis, welcher durch zwei inverse Punkte gelegt wird, geht noch durch zwei inverse Punkte.*

Denn ist ein Kreis durch  $C_1 D_2$  gelegt, welcher  $O_1$  noch in  $B_1$  schneidet, so muß er durch  $A_2$  gehen, da  $AC_1 \cdot AD_2 = AB_1 \cdot AA_2$  ist.

d. *Jeder Kreis, welcher den äußeren Potenzkreis zweier Kreise  $O_1 O_2$  rechtwinklig schneidet, geht durch zwei Paar in-*

\*) Für die Lage der Kreise wird hier und im Folgenden die Voraussetzung gemacht, daß dieselben mindestens zwei reelle gemeinschaftliche Tangenten haben; anderen Falles vertauscht der äußere Potenzkreis seine Bedeutung mit dem inneren.



verser Punkte' und schneidet daher  $O_1$  und  $O_2$  unter gleichen Winkeln.

Der Kreis  $N$  schneide den Potenzkreis  $A$  rechtwinklig; er treffe  $O_1$  und  $O_2$  in  $B_1 D_1 A_2 C_2$ . Ginge  $AC_2$  nicht durch  $D_1$ , sondern schneite es die Kreise  $N$  und  $O_1$  in  $X$  und  $Y$ , so müsste  $a^2 = AC_2 \cdot AX$ , weil  $N$  und  $A$  sich rechtwinklig schneiden und auch  $a^2 = AC_2 \cdot AY$  sein, wegen 53. Also müssen  $X$  und  $Y$  mit  $D_1$  zusammenfallen.

e. Die Verbindungslinien von zwei Paaren inverser Punkte schneiden sich auf der Potenzlinie.

$$\text{Denn } FB_1 \cdot FD_1 = FA_2 \cdot FC_2.$$

56. Beschreibt man über der Entfernung der Ähnlichkeitspunkte zweier Kreise als Durchmesser einen Kreis, so gehört er dem durch jene bestimmten Büschel an.

Da  $O_1 O_2 J A$  (Fig. 19) harmonisch sind, so müssen auch  $E_1 E_2 H A$  harmonisch sein, denn  $O_1 E_1 \parallel O_2 E_2 \parallel JH$ . Alle Kreise des Büschels ( $O_1 O_2$ ) teilen aber die Strecke  $E_1 E_2$  harmonisch, denn  $E_1$  und  $E_2$  sind die Doppelpunkte der durch das Büschel auf der gemeinsamen Tangente hervorgerufenen Involution. Also gehört der Kreis über  $AJ$  zu den Kreisen des Büschels.

57. Man findet den Radius des inneren Potenzkreises  $J$  der Kreise  $O_1$  und  $O_2$ , wenn man durch zwei Paar von Punkten, die bezüglich des inneren Ähnlichkeitspunktes invers sind, einen Kreis  $N$  legt, und in diesem die halbe kürzeste Sehne konstruiert. Hieraus folgt, daß der Kreis  $J$  von dem Kreise  $N$  unter dem Durchmesser geschnitten wird, d. h. die gemeinschaftliche Sehne beider Kreise geht durch den Mittelpunkt  $J$  des einen. Der Kreis  $N$  schneidet die Kreise  $O_1$  und  $O_2$  unter Winkeln, die sich zu  $180^\circ$  ergänzen. Ebenso läßt sich zeigen, daß jeder Kreis, welcher  $O_1$  und  $O_2$  unter Winkeln schneidet, die sich zu  $180^\circ$  ergänzen, durch zwei Paar bezüglich  $J$  inverser Punkte geht und daher den inneren Potenzkreis unter dem Durchmesser schneidet. Auch umgekehrt folgt, daß jeder Kreis, welcher den inneren Potenzkreis unter dem Durchmesser schneidet, die Kreise  $O_1$  und  $O_2$  unter Supplementwinkeln schneidet.

Beweise wie in 54 und 55.



58. Von den sechs Ähnlichkeitspunkten dreier Kreise liegen viermal drei in einer Geraden. Diese Geraden heißen die vier Ähnlichkeitsachsen der drei Kreise.

$O_1 O_2 O_3$  seien drei Kreise,  $A_{12} J_{12} A_{13} J_{13} A_{23} J_{23}$  ihre Ähnlichkeitspunkte. Man verbinde  $A_{12}$  mit  $A_{23}$ , ziehe  $O_2 B_2 \parallel O_1 O_3$




Fig. 20.

und  $O_1 O_3$  bis zum Durchschnitte  $B_1$  mit  $A_{12} A_{23}$ . Bezeichnet man die Radien mit  $r_1 r_2 r_3$ , so ist

$$O_2 B_2 : O_3 B_1 = O_2 A_{23} : O_3 A_{23} = r_2 : r_3$$

$$O_1 B_1 : O_2 B_2 = O_1 A_{12} : O_2 A_{12} = r_1 : r_2,$$

also  $O_1 B_1 : O_3 B_3 = r_1 : r_3,$

d. h.  $B_1$  ist der äußere Ähnlichkeitspunkt von  $O_1$  und  $O_3$ . Demnach liegen in einer Geraden



und ebenso

$$A_{12} A_{23} A_{31}$$

$$J_{12} J_{23} A_{31}$$

$$A_{12} J_{23} J_{31}$$

$$J_{12} A_{23} J_{31}$$

58 a. Die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits kann man auf unendlich viele Arten als die sechs Ähnlichkeitspunkte von drei Kreisen ansehen. Sind nämlich  $ABCDEF$  die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits und man beschreibt um die drei Diagonalepunkte  $G H J$  desselben Kreises mit ihren Abständen von einer Seite z. B.  $AD$ , so sind

$A$  und  $C$  die Ähnlichkeitspunkte von  $G$  und  $H$ ,

$B$  „  $D$  „ „ „  $G$  „  $J$ ,

$E$  „  $F$  „ „ „  $J$  „  $H$

Die Kreise über  $AC$ ,  $BD$ ,  $EF$  als Durchmesser gehören (56) bezüglich den Büscheln  $(GH)$ ,  $(GJ)$ ,  $(JH)$  an und schneiden daher den Orthogonalkreis von  $G H J$  rechtwinklig. Sie müssen aber auch (27b) den durch  $G H F$  gelegten Kreis rechtwinklig schneiden und gehören daher zu einem Büschel (33). Ihre Mittelpunkte, die Halbierungspunkte der Diagonalen  $AC$ ,  $BD$ ,  $EF$  liegen also auf einer Geraden: es folgt:

*Der Gauß-Bodenmiller'sche Satz:*

*Die Kreise über den drei Diagonalen eines vollständigen Vierseits gehören einem Büschel an; die Halbierungspunkte der drei Diagonalen liegen auf einer Geraden.*

*Wenn diese drei Kreise sich schneiden, so erscheinen jedem Schnittpunkte die drei Diagonalen unter rechten Winkeln.*

Demnach sind auch die drei Kreise über  $A_{12} J_{12}$ ,  $A_{13} J_{13}$ ,  $A_{23} J_{23}$  Kreise eines Büschels.

59. Der Potenzkreis  $A_{12}$  gehört (55b) dem Büschel  $(O_1 O_2)$  an und schneidet daher den Orthogonalkreis von  $O_1 O_2 O_3$  rechtwinklig; da dasselbe von den Potenzkreisen  $A_{23} A_{13}$  gilt und die Mittelpunkte auf einer Geraden liegen (59), so gehören die drei äußeren Potenzkreise einem Büschel an. Die Kreise des konjugierten Büschels müssen (55d) die Kreise  $O_1 O_2 O_3$  unter gleichen Winkeln schneiden. Also:

a. *Alle Kreise, welche drei andere unter gleichen Winkeln*



*schneiden, bilden ein Büschel, dessen Centrale die Potenzlinie des Büschels der äußeren Potenzkreise ist.*

Aus diesem Satze folgt:

b. *Jeder Kreis eines Büschels schneidet alle Kreise, welche zwei Kreise des Büschels gleichartig berühren, unter gleichen Winkeln.*

Doch läßt sich derselbe auch in folgender Art direkt beweisen.

$O_1$  und  $O_2$  seien die Mittelpunkte zweier Kreise, welche von einem Kreise  $M$  in  $B_1$  und  $B_2$ , und um einen bestimmten Fall anzunehmen, gleichartig berührt werden, so daß  $B_1B_2$  durch den äußeren Ähnlichkeitspunkt  $A_{12}$  geht. Eine gemeinschaftliche Tangente  $t$  durch  $A_{12}$  berühre  $O_1$  und  $O_2$  in  $C_1$  und  $C_2$ . Da  $B_1B_2$  sowie  $C_1C_2$  inverse Punktpaare sind, so liegen  $B_1B_2C_1C_2$  auf einem Kreise. Ist  $P$  der Schnittpunkt der Geraden  $B_1C_1$  und  $B_2C_2$ , so ist  $PB_1 \cdot PC_1 = PB_2 \cdot PC_2$ , also ist  $P$  ein Potenzpunkt von  $O_1$  und  $O_2$ .

Ist  $Q$  der Schnittpunkt von  $B_1C_1$  mit  $M$ , so folgt aus ähnlichen Dreiecken, daß  $O_1C_1 \parallel MQ$ , also auch die gemeinschaftliche Tangente  $t$  parallel der Tangente in  $Q$  ist. Daher liegt  $Q$  auch im Durchschnitte von  $B_2C_2$  mit  $M$  und fällt mit  $P$  zusammen.

Ein beliebiger Kreis  $O$  des Büschels ( $O_1O_2$ ) schneide  $M$  in  $D$  und  $t$  in  $E$ . Denkt man sich durch  $B_1C_1D$  und  $B_2C_2D$  die Kreise  $M_1$  und  $M_2$  gelegt und  $PD$  gezogen, so müssen die Kreise  $OM_1M_2$  sich noch in einem zweiten Punkte  $D_1$  von  $PD$  schneiden, weil  $P$  ein Potenzpunkt der Kreise  $OO_1O_2$  ist und deshalb  $PB_1 \cdot PC_1 = PB_2 \cdot PC_2 = PD \cdot PD_1$  ist.

$B_1$  und  $C_1$  sowie  $B_2$  und  $C_2$  sind aber inverse Punkte des Kreises  $M$  und der Tangente  $t$ , wenn man letztere als Kreis betrachtet, also müssen  $M_1$  und  $M_2$  den Kreis  $M$  und die gemeinschaftliche Tangente  $t$  unter gleichen Winkeln schneiden, also auch letztere und die Tangente  $d$  an  $M$  in  $D$ , mithin liegen  $M_1$  und  $M_2$  auf der Halbierungslinie des Winkels  $(dt)$ . Weil aber die Kreise  $OM_1M_2$  durch dieselben beiden Punkte  $DD_1$  gehen, so liegen ihre Mittelpunkte auf einer Geraden; also liegt  $O$  auf der Halbierungslinie des Winkels  $(dt)$  und der Kreis  $O$  schneidet die Geraden  $d$  und  $t$ ,



also auch den Kreis  $M$  und die Gerade  $t$  unter gleichen Winkeln.

Einen anderen Beweis erhält man mittelst der Kreisverwandtschaft. Cf. 73.

60. Zu den drei Kreisen  $O_1 O_2 O_3$  komme noch ein vierter  $O_4$ ; man erhält noch drei äußere Ähnlichkeitspunkte  $A_{14} A_{24} A_{34}$ , welche mit  $A_{12} A_{23} A_{13}$  die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits bilden (58). Es sei  $O$  der Schnittpunkt der Potenzlinien der beiden Büschel  $(A_{12} A_{13} A_{23})$  und  $(A_{12} A_{14} A_{24})$  äußerer Potenzkreise, so läßt sich um  $O$  ein Kreis beschreiben, der die fünf Kreise  $A_{12} A_{13} A_{23} A_{14} A_{24}$  rechtwinklig und daher  $O_1 O_2 O_3 O_4$  unter gleichen Winkeln schneidet. (55d.) Deshalb liegt  $O$  aber auch auf der Potenzlinie der Büschel der äußeren Potenzkreise  $(A_{13} A_{14} A_{34})$  und  $(A_{23} A_{24} A_{34})$ . Es folgt:

*Der Orthogonalkreis der sechs äußeren Potenzkreise von vier Kreisen schneidet diese unter gleichen Winkeln.*

61. *Die Berührungskreise an drei gegebene Kreise.* (Problem des Apollonius.) Die Kreise des Büschels, welche drei andere  $O_1 O_2 O_3$  unter gleichen Winkeln schneiden, treffen den einen  $O_1$  in solchen Punkten, daß ihre Verbindungslinien durch einen Punkt  $P$  gehen. (30.) Sind nämlich  $K_1 K_2 K_3$  irgend drei Kreise jenes Büschels und ist  $p$  ihre Potenzlinie, so ist  $P$  das Potenzcentrum sowohl von  $O_1 K_1 K_2$ , als  $O_1 K_1 K_3$ , denn  $P$  liegt im Durchschnitt von  $p$  mit der Potenzlinie von  $O_1 K_1$ . Von  $P$  lege man an  $O_1$  die beiden Tangenten  $O_1 B$  und  $O_1 C$ , so müssen diejenigen Kreise des Büschels  $(K_1 K_2)$ , welche durch  $B$  und  $C$  gehen, den Kreis  $O_1$  in diesen Punkten berühren. Wegen 59. müssen dieselben auch die Kreise  $O_2$  und  $O_3$  unter gleichen Winkeln schneiden, d. h. gleichartig berühren. *Hieraus folgt eine Konstruktion derjenigen beiden Kreise, welche drei andere gleichartig berühren.*

62. Die Ähnlichkeitspunkte  $A_{12} J_{23} J_{13}$  der drei Kreise  $O_1 O_2 O_3$  liegen (58) auf einer Geraden. Der Orthogonalkreis  $K$  von  $O_1 O_2 O_3$  schneidet den äußeren Potenzkreis  $A_{12}$  rechtwinklig und die inneren Potenzkreise  $J_{23}$  und  $J_{13}$  unter dem Durchmesser. (57.) Alle Kreise, welche die beiden letzten unter dem Durchmesser schneiden, treffen die Centrale  $J_{23} J_{13}$  in zwei festen Punkten  $P$  und  $Q$  (47). Durch diese geht



somit auch der Kreis  $K$  und da er den Kreis  $A_{12}$  rechtwinklig schneidet, so sind dieselben harmonische Pole in Bezug auf den letzteren und jeder durch sie gelegte Kreis schneidet  $A_{12}$  rechtwinklig (27 a). Daher läßt sich schließen, daß alle durch  $P$  und  $Q$  gelegten Kreise den Kreis  $A_{12}$  rechtwinklig und die Kreise  $I_{23}I_{13}$  unter dem Durchmesser, also auch  $O_1$  und  $O_2$  unter gleichen,  $O_1$  und  $O_3$  aber und  $O_2$  und  $O_3$  unter Supplementwinkeln schneiden.

Die beiden Kreise dieses Büschels, welche  $O_1$  berühren, berühren auch  $O_2$  und  $O_3$  (59), aber  $O_1$  und  $O_2$  gleichartig,  $O_1$  und  $O_3$  sowie  $O_2$  und  $O_3$  ungleichartig.

Durch die beiden anderen inneren Ähnlichkeitsachsen  $A_{13}J_{23}J_{12}$  und  $A_{23}J_{13}J_{12}$  gelangt man zu zwei anderen Kreisbüscheln, von denen die Kreise des ersten  $O_1O_3$  unter gleichen,  $O_1O_2$  und  $O_2O_3$  unter Supplementwinkeln, die des andern  $O_2O_3$  unter gleichen,  $O_1O_2$  und  $O_1O_3$  unter Supplementwinkeln schneiden. In jedem dieser Büschel giebt es wieder zwei Kreise, welche  $O_1O_2O_3$  berühren und zwar

entweder  $O_1O_3$  gleichartig,  $O_1O_2$  und  $O_3O_2$  ungleichartig  
 oder  $O_2O_3$  „  $O_1O_2$  „  $O_{13}$  „

Im Ganzen ergeben sich 8 Berührungskreise von drei Kreisen  $O_1O_2O_3$ .

63. Zu den drei Kreisen komme ein vierter  $O_4$ ; man erhält dann noch die Ähnlichkeitspunkte  $A_{14}A_{24}A_{34}J_{14}J_{24}J_{34}$ . Die vier Ähnlichkeitsachsen  $A_{12}A_{13}A_{23}$ ,  $A_{12}J_{14}J_{24}$ ,  $J_{34}A_{13}J_{14}$ ,  $J_{34}A_{23}J_{24}$  führen zu vier Kreisbüscheln, von denen die Kreise des ersten  $O_1O_2O_3$  unter gleichen Winkeln, die des zweiten  $O_1O_2$  unter gleichen,  $O_1O_4$  und  $O_2O_4$  unter Supplementwinkeln, die des dritten  $O_1O_3$  unter gleichen,  $O_1O_4$  und  $O_3O_4$  unter Supplementwinkeln, die des vierten endlich  $O_2O_3$  unter gleichen,  $O_2O_4$  und  $O_3O_4$  unter Supplementwinkeln schneiden. Diese vier Büschel haben einen gemeinsamen Kreis, welcher  $O_1O_2O_3$  unter gleichen Winkeln und  $O_4$  unter einem Winkel schneidet, der zu jenen der Supplementwinkel ist. In gleicher Weise finden sich noch drei andere Kreise, welche drei von den vier Kreisen  $O_1O_2O_3O_4$  unter gleichen und den vierten unter dem Supplementwinkel schneiden. Ferner giebt es noch drei Kreise,



welche je zwei von den vier Kreisen unter gleichen, zu einander supplementären Winkeln schneiden. Daher folgt:

*Es giebt acht Kreise, welche vier andere unter solchen Winkeln schneiden, daß jeder dem anderen gleich oder supplementär ist.*

64. Die Eigenschaften der Ähnlichkeitspunkte und Potenzlinien führen zu einer anderen Konstruktion der Berührungskreise von drei gegebenen Kreisen  $O_1 O_2 O_3$ . Bezeichnet man mit  $a$  die äußere, mit  $i$  die innere Berührung des gesuchten Berührungskreises, so lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

|    | $O_1$ | $O_2$ | $O_3$ |
|----|-------|-------|-------|
| 1. | $a$   | $a$   | $a$   |
| 2. | $i$   | $i$   | $i$   |
| 3. | $a$   | $a$   | $i$   |
| 4. | $i$   | $i$   | $a$   |
| 5. | $a$   | $i$   | $a$   |
| 6. | $i$   | $a$   | $i$   |
| 7. | $i$   | $a$   | $a$   |
| 8. | $a$   | $i$   | $i$   |

Sind  $M_1$  und  $M_2$  diejenigen Kreise, welche  $O_1 O_2 O_3$  gleich-Fig. 21.  
artig, ( $aaa$  und  $iii$ ), berühren, so sind  $B_1 D_1$  und  $B_2 D_2$  inverse Punkte für den äußeren Ähnlichkeitspunkt  $A_{12}$  von  $O_1 O_2$ . (54a.)

Die Punkte  $B_1 B_2$ ,  $C_1 C_2$ ,  $D_1 D_2$  sind invers für den inneren Ähnlichkeitspunkt  $P$  von  $M_1 M_2$ , also schneiden sich die Geraden  $B_1 B_2$ ,  $C_1 C_2$ ,  $D_1 D_2$  in  $P$  (54a.). Hieraus folgt (53), daß  $A_{12} B_1 \cdot A_{12} D_1 = A_{12} B_2 \cdot A_{12} D_2$  ist, oder daß  $A_{12}$  ein Potenzpunkt von  $M_1$  und  $M_2$  ist. Sind  $A_{13}$  und  $A_{23}$  die Ähnlichkeitspunkte von  $O_1 O_3$  und  $O_2 O_3$ , so muß die Ähnlichkeitsaxe  $A_{12} A_{13} A_{23}$  zugleich die Potenzlinie von  $M_1 M_2$  sein.

Da ferner  $P B_1 \cdot P B_2 = P C_1 \cdot P C_2 = P D_1 \cdot P D_2$  ist, so ist  $P$  das Potenzcentrum von  $O_1 O_2 O_3$ .

Die gemeinschaftlichen Tangenten in  $B_1$  und  $B_2$  schneiden sich in  $B$  und da  $B B_1 = B B_2$ , so liegt  $B$  auf der Potenzlinie  $A_{12} A_{13} A_{23}$ . Die Pole der letzteren bezüglich der Kreise  $O_1 O_2 O_3$  liegen daher auf  $B_1 B_2$ ,  $C_1 C_2$ ,  $D_1 D_2$ . Da aber



$A_{12} A_{13} A_{23}$  und ihre Pole bekannt sind, da man ferner  $P$  kennt, so findet man durch Verbindung von  $P$  mit diesen Polen die Berührungspunkte  $B_1 B_2 C_1 C_2 D_1 D_2$ .




Fig. 21.

Zur Auflösung der übrigen Fälle gelangt man, wenn man die Fälle 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 kombiniert und dieselben Betrachtungen wie in den Fällen 1 und 2 anstellt.

65. *Andere Begründung der Lösung des Berührungsproblems.\*)*

Die Potenzlinie  $p_{12}$  der Kreise  $O_1 O_2$  kann als Kreis des Büschels  $(O_1 O_2)$  angesehen werden; sie schneidet daher den

---

\*) Diese Begründung der vorigen Konstruktion giebt Petersen: Methoden und Theorien. Seite 101. Aufgabe 403.



Berührungskreis  $M_1$  und die gemeinschaftlichen Tangenten von  $O_1$  und  $O_2$  unter gleichen Winkeln. Daher ist die




Fig. 22.

Tangente  $t_1$  in  $E_1$  parallel der gemeinschaftlichen Tangente  $A_{12}G_1$ , folglich

$$M_1E_1 \parallel O_1G_1 \text{ und } B_1G_1E_1 \text{ in einer Geraden;}$$

ebenso folgt, dafs auch

$$B_1H_1J_1, B_1G_1'E_1', B_1H_1'J_1'$$

je in einer Geraden liegen, wenn  $E_1J_1E_1'J_1'$  Durchschnitte der Potenzlinien  $p_{12}$  und  $p_{13}$  mit  $M_1$ ,  $G_1H_1G_1'H_1'$  Berührungspunkte der gemeinschaftlichen Tangenten der Kreispaaire  $O_1O_2$  und  $O_1O_3$  sind. Da nun

$$p_{12} \parallel G_1H_1, p_{13} \parallel G_1'H_1'$$

ist, so müssen sich  $G_1H_1$  und  $G_1'H_1'$  in einem Punkte  $P'$ , der mit den Punkten  $B_1$  und  $P$  in einer Geraden liegt, treffen.

Demnach findet man den Berührungspunkt auf folgende Art:

Man konstruiert die Potenzlinien  $p_{12}$  und  $p_{13}$  der Kreispaaire  $O_1O_2$  und  $O_1O_3$  und das Potenzcentrum  $P$  von  $O_1O_2O_3$ ; darauf die äußeren Ähnlichkeitspunkte  $A_{12}$  und  $A_{13}$  derselben Kreispaaire und deren Polaren bezüglich  $O_1$ , die sich im Pole



$P'$  der äusseren Ähnlichkeitsaxe  $A_{12}A_{13}A_{23}$  der Kreise  $O_1O_2O_3$  in Bezug auf  $O_1$  schneiden. Die Gerade  $PP'$  trifft den Kreis  $O$  in den Berührungspunkten  $B_1$  und  $B_2$  mit  $M_1$  und  $M_2$ .

66. Wenn man die gegebenen Auflösungen des Berührungsproblems der Kreise auch für die Fälle anwenden will, daß die Kreise in Punkte und Gerade degenerieren, so muß man auch für diese Fälle Potenzlinie und Ähnlichkeitspunkte konstruieren.

*Man findet die Potenzlinie eines Punktes  $P$  und eines Kreises, wenn man zu  $P$  den harmonischen Pol  $Q$  und die Mittelsenkrechte von  $PQ$  konstruiert (33).*

*Die Potenzlinie zweier Punkte ist ihre Mittelsenkrechte.*

*Die Potenzlinie eines Kreises (Punktes) und einer Geraden ist diese selbst; denn schneidet man den Kreis und die Gerade durch einen anderen Kreis, so treffen sich die drei Potenzlinien auf der Geraden.*

*Die Potenzlinie zweier Geraden ist die eine oder die andere von ihnen.*

*Die Ähnlichkeitspunkte eines Kreises und eines Punktes fallen mit diesem zusammen.*

*Die Ähnlichkeitspunkte zweier Punkte fallen mit dem einen oder anderen zusammen.*

*Die Ähnlichkeitspunkte eines Kreises und einer Geraden sind die Durchschnitte der Senkrechten, welche vom Mittelpunkte auf die Gerade gefällt werden kann, mit dem Kreise. Denn man hat die unendlich große Centrale im Verhältnisse  $r : \infty$  zu teilen, wenn  $r$  den Radius des Kreises bedeutet. Cf. 53d.*

*Die Ähnlichkeitspunkte zweier Geraden hat man sich im Unendlichen zu denken.*

## § 6.

### Die Kreisverwandtschaft.

67. Zwei Punkte, die in Bezug auf einen festen Kreis  $O$  harmonische Pole sind, heißen *kreisverwandte Punkte* und die Beziehung, in welche dadurch je zwei Punkte der Ebene treten, heißt *Kreisverwandtschaft*.  $O$  heißt die *Basis* der Verwandtschaft (53).



68. *Bewegt sich ein Punkt auf einer Geraden, so bewegt sich der verwandte Punkt auf einem Kreise, dem verwandten Kreise, welcher durch den Mittelpunkt  $O$  der Basis geht und umgekehrt.*

Denn ist  $p$  die Gerade,  $P$  ihr Pol, so erhält man zu irgend einem Punkte  $Q$  von  $p$  den harmonischen Pol  $Q_1$ , wenn




Fig. 23.

man  $PQ_1 \perp OQ$  fällt. Also liegen alle Punkte  $Q_1$  auf dem Kreise über  $OP$ .

69. *Bewegt sich ein Punkt auf einem Kreise, so bewegt sich der verwandte Punkt auch auf einem Kreise, dem verwandten Kreise.*




Fig. 24.

Es sei  $O$  die Kreisbasis,  $M$  ein beliebiger Kreis, welcher die Centrale  $OM$  in  $C$  und  $D$  trifft; es seien  $CC_1$ ,  $DD_1$ ,  $EE_1$  verwandte Punkte. Daher ist (13)  $OE \cdot OE_1 = OC \cdot OC_1$ , also liegen  $CC_1$   $EE_1$  auf

einem Kreise und es ist  $\sphericalangle OEC = \sphericalangle OC_1E_1$ . Aus gleichem Grunde liegen aber auch  $DD_1$   $EE_1$  auf einem Kreise und es ist  $\sphericalangle OED = \sphericalangle OD_1E_1$ , also auch

$$\sphericalangle OED - \sphericalangle OEC = \sphericalangle OD_1E_1 - \sphericalangle OC_1E_1$$

oder

$$\sphericalangle CED = \sphericalangle C_1E_1D_1 = 90^\circ,$$



d. h. die den Punkten des Kreises  $M$  verwandten Punkte liegen auf dem Kreise über  $C_1 D_1$ .

70. *Zwei Gerade und die ihnen verwandten Kreise schneiden sich unter gleichen Winkeln.*

Den Geraden  $p$  und  $p'$  sind zwei Kreise durch  $O$  verwandt, deren Tangenten in  $O$  parallel zu  $p$  und  $p'$  sind. Da die Radien auf den Tangenten senkrecht stehen, so bilden die Radien in  $O$  einen Winkel gleich dem Winkel  $(pp')$ .

71. *Zwei Kreise und die ihnen verwandten Kreise schneiden sich unter gleichen Winkeln.*

Die Kreise  $M$  und  $M'$  schneiden sich in  $A$  und  $B$ , die verwandten Kreise  $M_1$  und  $M'_1$  in  $A_1$  und  $B_1$ . Den Tangenten  $a$  und  $a'$  in  $A$  an  $M$  und  $M'$  sind zwei Kreise  $\alpha$  und  $\alpha'$  verwandt, die sich in  $O$  unter dem  $\sphericalangle (aa')$  (70), und außerdem in  $A_1$  schneiden und in diesem Punkte die Kreise  $M_1$  und  $M'_1$  berühren. Da  $\alpha$  und  $\alpha'$  in  $A_1$  denselben Winkel wie in  $O$  bilden müssen und mit  $M_1$  und  $M'_1$  gemeinsame Tangenten in  $A_1$  haben, so schneiden sich auch diese Kreise unter dem Winkel  $(aa')$ .

72. *Den Kreisen eines Büschels sind entweder Gerade durch einen Punkt oder die Kreise eines konzentrischen Büschels verwandt.*

Wenn die Kreise eines Büschels sich in  $O$  und  $O'$  schneiden, so sind ihnen in Bezug auf irgend einen Kreis um  $O$  die Geraden verwandt, welche sich in dem zu  $O'$  verwandten Punkte  $O'_1$  schneiden.

Haben die Kreise eines Büschels keinen gemeinsamen Punkt und wird ihre Centrale von den Kreisen des conjugierten Büschels in  $O$  und  $O'$  geschnitten, so beschreibe man um  $O$  irgend einen Kreis als Basis. Es sei  $O'_1$  der verwandte Punkt zu  $O'$ ; den Kreisen des conjugierten Büschels sind die Geraden durch  $O'_1$  verwandt: daher müssen den Kreisen des ursprünglichen Büschels solche Kreise verwandt sein, welche alle Geraden durch  $O'_1$  rechtwinklig schneiden, d. h. Kreise mit dem Mittelpunkte  $O'_1$ .

73. *Alle Kreise, welche zwei andere  $O$  und  $O'$  unter den Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha'$  schneiden, berühren zwei Kreise des Büschels  $(OO')$  und schneiden einen dritten Kreis desselben Büschels rechtwinklig oder unter dem Durchmesser. Cf. 59.*



Der Beweis dieses Satzes darf wegen 72. nur für die Fälle geführt werden, daß das Büschel  $(OO')$  aus einem Büschel von Strahlen oder konzentrischen Kreisen besteht.

I. Fall.  $O$  und  $O'$  seien zwei Gerade mit dem Schnittpunkte  $S$ ; dann liegen die Mittelpunkte  $MM_1 \dots$  aller Kreise, welche jene unter den Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha'$  auf zwei Geraden  $g$  und  $g'$  durch  $S$ , welche  $O$  und  $O'$  harmonisch trennen und leicht zu construieren sind. Bezeichnet man die Mittelpunkte auf  $g$  mit  $MM_1 \dots$ , auf  $g'$  mit  $M'M'_1 \dots$ , die Radien der Kreise  $M \dots$  mit  $r \dots$ , so verhält sich

$$r : r_1 : \dots = MS : M_1S : \dots$$

$$r' : r'_1 : \dots = M'S : M'_1S : \dots$$

d. h. die Kreise  $MM_1 \dots$  sowohl wie  $M'M'_1 \dots$  berühren je zwei durch  $S$  gehende Gerade. Da sie überdies die Strahlen  $g$  und  $g'$  rechtwinklig schneiden, so ist der Satz für den ersten Fall bewiesen.

II. Fall.  $S$  sei der gemeinschaftliche Mittelpunkt der Kreise  $OO'$  und  $P$  ein beliebiger Punkt, so läßt sich zuerst nachweisen, daß es vier Kreise durch  $P$  giebt, welche  $O$  und  $O'$  unter den Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha'$  schneiden. Man beschreibe nämlich um  $P$  einen beliebigen Kreis, nehme diesen als Basis einer Kreisverwandtschaft, so sind den Kreisen  $O$  und  $O'$  zwei andere  $O_1$  und  $O'_1$  verwandt. Alle Geraden, welche  $O_1$  unter  $\alpha$  und  $O'_1$  unter  $\alpha'$  schneiden, sind Tangenten zweier mit  $O_1$  und  $O'_1$  konzentrischen Kreise. Den vier gemeinschaftlichen Tangenten derselben sind diejenigen vier Kreise durch  $P$  verwandt, welche  $O$  und  $O'$  unter den Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha'$  schneiden. Sie teilen sich in zwei Paare gleicher Kreise, welche zu  $SP$  symmetrisch liegen. Jedes Paar wird von einem Kreispaaire um  $S$  berührt und zwar das eine gleichartig, das andere ungleichartig, und jeder Kreis, welcher eines dieser Kreispaaire berührt, schneidet  $O$  und  $O'$  unter den Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha'$  und schneidet, jenachdem die Berührung gleichartig oder ungleichartig ist, einen Kreis um  $S$  rechtwinklig oder unter dem Durchmesser. (73).

74. In jedem Kreisbüschel giebt es zwei Kreise, welche irgend einen Kreis unter dem Winkel  $\alpha$  schneiden.



I. Fall. Das Büschel bestehe aus Strahlen durch einen Punkt  $S$ . Alle Geraden, welche einen Kreis  $O$  unter  $\alpha$  schneiden, sind Tangenten eines anderen Kreises, an den sich von  $S$  zwei Tangenten ziehen lassen.

II. Fall. Das Büschel bestehe aus konzentrischen Kreisen mit dem gemeinsamen Mittelpunkte  $S$ . Man verbinde  $S$  mit dem Mittelpunkte  $O$  eines Kreises, beschreibe über  $SO$  nach beiden Seiten Kreisbogen mit dem Peripheriewinkel  $\alpha$ ; sie mögen den Kreis  $O$  in  $A$  und  $B$  schneiden, dann schneiden die mit  $SA$  und  $SB$  beschriebenen Kreise  $O$  unter  $\alpha$ .

Wegen 72. lassen sich auf diese beiden Fälle alle übrigen zurückführen.

74. *Drei Kreise werden von acht anderen unter bestimmten Winkeln geschnitten.*

Die drei Kreise  $OO'O''$  sollen von anderen Kreisen unter den Winkeln  $\alpha\alpha'\alpha''$  geschnitten werden. Nach 73. berühren alle Kreise, welche  $O$  und  $O'$  unter  $\alpha$  und  $\alpha'$  schneiden, eines von zwei Kreispaares  $O_1O_2$  oder  $O_3O_4$  und schneiden bei gleichartiger Berührung den äußeren Potenzkreis rechtwinklig, bei ungleichartiger den inneren unter dem Durchmesser. Es sei bei  $O_1O_2$  gleichartige Berührung, der äußere Potenzkreis  $A_{12}$ , bei  $O_3O_4$  ungleichartige Berührung, der innere Potenzkreis  $J_{34}$ . Umgekehrt folgt, daß jeder Kreis, welcher  $A_{12}$  rechtwinklig schneidet und  $O_1$  berührt, auch  $O_2$  berühren und  $O$  unter  $\alpha$ ,  $O'$  unter  $\alpha'$  schneiden muß. — In gleicher Weise findet man, daß alle Kreise, welche  $O'O''$  unter  $\alpha'\alpha''$  schneiden, entweder einen Kreis  $A'_{12}$  rechtwinklig oder einen anderen  $J'_{34}$  unter dem Durchmesser schneiden. Jeder Kreis, welcher  $A_{12}$  und  $A'_{12}$  rechtwinklig und  $O'$  unter  $\alpha'$  schneidet, muß  $O$  und  $O''$  unter  $\alpha$  und  $\alpha''$  schneiden. Alle Kreise endlich, welche  $OO''$  unter  $\alpha\alpha''$  schneiden, schneiden einen Kreis  $A''_{12}$  rechtwinklig oder  $J''_{34}$  unter dem Durchmesser.

Alle diejenigen Kreise, welche  
entweder  $A_{12}$  rechtwinklig und  $A'_{12}$  rechtwinklig  
oder  $A_{12}$  rechtwinklig und  $J'_{34}$  unter dem Durchmesser  
oder  $J_{34}$  unter dem Durchmesser und  $A'_{12}$  rechtwinklig  
oder  $J_{34}$  unter dem Durchmesser u.  $J'_{34}$  unter d. Durchmesser  
schneiden, bilden je ein Büschel. In jedem dieser vier Büschel



giebt es zwei Kreise, welche  $O'$  unter  $\alpha'$  und daher  $OO''$  unter  $\alpha\alpha''$  und also auch entweder  $A_{12}'$  rechtwinklig oder  $J_{34}'$  unter dem Durchmesser schneiden. Die acht Kreise, welche  $OO'O''$  unter den Winkeln  $\alpha\alpha'\alpha''$  schneiden, findet man also, wenn man für jede der folgen acht Kreisgruppen

$$\begin{aligned} &A_{12}A_{12}'A_{12}'', A_{12}A_{12}'J_{34}'', A_{12}J_{34}'A_{12}'', A_{12}J_{34}'J_{34}'', \\ &J_{34}A_{12}'A_{12}'', J_{34}A_{12}'J_{34}'', J_{34}J_{34}'A_{12}'', J_{34}J_{34}'J_{34}'' \end{aligned}$$

denjenigen Kreis konstruiert, welcher die Kreise  $A$  rechtwinklig, die Kreise  $J$  unter dem Durchmesser schneidet. (30, 47, 48).

75. *Die vier Berührungskreise eines Dreiecks berühren den Mittelkreis (Feuerbachschen Kreis) desselben.\*)*




Fig. 25.

$J$  und  $J_1$  seien die Mittelpunkte des inneren und des im Winkel  $A$  liegenden äußeren Berührungskreises des Dreiecks  $ABC$ ,  $E$  und  $E_1$  die Berührungspunkte mit  $BC$ ,  $A_1$  und  $B_1$  die Mitten von  $BC$  und  $AC$ ; man ziehe  $AD \perp BC$  und lege durch  $A_1B_1D$  einen Kreis  $M$ , welcher  $AD$  in  $D_1$  schneiden mag. Dieser Kreis heißt der Mittelkreis (Neunpunktkreis, Feuerbachscher Kreis), des Dreiecks  $ABC$ . Er schneidet die Seiten desselben in ihren Mitten und den Fußpunkten der Höhen und trifft die letzteren in den Mitten der nach den

\*) Siehe Taylor: Ancient and moderne Geometry of conics. Seite 355.



Ecken hin liegenden Abschnitte, in welche sie durch den Höhenpunkt zerlegt werden. \*) Es liegt dann  $M$  auf  $A_1 D_1$ . Um  $A_1$  denke man sich mit  $A_1 E$  einen Kreis beschrieben und wähle ihn als Basis einer Kreisverwandtschaft. Da er die Kreise  $J$  und  $J_1$  rechtwinklig schneidet, so sind diese sich selbst verwandt; dem Kreise  $M$  ist eine Gerade  $m$  verwandt, welche  $BC$  in einem solchen Punkte  $F$  trifft, daß  $A_1 E^2 = A_1 F \cdot A_1 D$ . — Die Gerade  $JJ_1$  wird durch  $A$  und  $BC$  in  $G$  harmonisch geteilt, also sind die im Punkte  $EE_1GD$  auch harmonisch und da  $EA_1 = E_1 A_1$  ist,  $A_1 E^2 = A_1 G \cdot A_1 D$  (4c), daher fallen  $F$  und  $G$  zusammen. —  $m$  steht auf  $A_1 D_1$  senkrecht, bildet also mit  $BC$  einen Winkel, welcher gleich  $\sphericalangle A_1 D_1 D$  ist, dieser ist als Peripheriewinkel gleich  $A_1 B_1 D$ . Im rechtwinkligen Dreiecke  $ACD$  ist  $B_1$  die Mitte der Hypotenuse, also  $B_1 C = B_1 D$  und  $\sphericalangle B_1 DC = C$ ; weil  $A_1 B_1 \parallel AB$  ist, so ist  $\sphericalangle B_1 A_1 C = B$ . Daher ist  $\sphericalangle B_1 A_1 C = B = A_1 B_1 D + C$  oder  $A_1 B_1 D = HFC = B - C$ .

Zieht man durch  $F$  die zweite gemeinschaftliche Tangente der Kreise  $J$  und  $J_1$ , so bildet sie mit der ersten einen Winkel  $B - C$ , fällt also mit  $m$  zusammen. Es berührt also  $m$  die Kreise  $J$  und  $J_1$ , mithin berührt der  $m$  verwandte Kreis  $M$  auch  $J$  und  $J_1$ , da diese sich selbst verwandt sind.

Die Tangente  $m$  berühren  $J$  in  $K$  und  $J_1$  in  $K_1$ , dann schneiden die Geraden  $A_1 K$  und  $A_1 K_1$  den Kreis  $M$  in den verwandten Punkten  $L$  und  $L_1$ , also den Berührungspunkten desselben mit  $J$  und  $J_1$ .

76. Gegeben ist ein Kreis  $M$  und vier Punkte  $\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D}$ ; man soll in den Kreis ein Viereck zeichnen, dessen Seiten der Reihe nach durch die gegebenen Punkte gehen. \*\*)

Sei  $ABCD$  das verlangte Viereck, dessen Seiten  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  der Reihe nach durch  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{D}$  gehen. Man konstruiere durch diese Punkte die Tangenten oder halben kürzesten Sehnen und beschreibe mit ihnen um jene Kreise. Betrachtet man dieselben als Basen von Kreisverwandtschaften

\*) Steiner: Die geometrischen Konstruktionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises. Seite 49.

\*\*) Petersen: Methoden und Theorien zur Auflösung geometrischer Konstruktionsaufgaben.



$(\mathfrak{A})$ ,  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{D})$  so verwandelt sich der Punkt  $A$ , indem man diese Verwandtschaften der Reihe nach anwendet, in sich selbst. Ein Punkt  $P$  wird durch successive Anwendung der Verwandtschaften  $(\mathfrak{A})$ ,  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{D})$  in  $\mathfrak{D}$  verwandelt; man erhält ihn, indem man rückwärts durch successive Anwendung der Verwandtschaften  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{A})$  den Punkt  $\mathfrak{D}$  in  $P$  verwandelt. Die Gerade  $AP$  wird durch die Verwandtschaft  $(\mathfrak{A})$  in einen Kreis durch  $\mathfrak{A}BP_a$  verwandelt, dieser durch die Verwandtschaft  $(\mathfrak{B})$  in einen anderen durch  $\mathfrak{A}_bCP_{ab}$ , dieser durch die Verwandtschaft  $(\mathfrak{C})$  in einen Kreis durch  $\mathfrak{A}_{bc}DP_{abc}$  oder  $\mathfrak{A}_{bc}D\mathfrak{D}$  und dieser durch die Verwandtschaft  $(\mathfrak{D})$  in eine Gerade, welche durch  $A$  und einen Punkt  $Q$  oder  $\mathfrak{A}_{bcd}$  geht. Es ist also  $Q$  derjenige Punkt, in welchen sich  $\mathfrak{A}$  durch successive Anwendung der Kreisverwandtschaften  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{D})$  verwandelt.

Der Winkel, den  $PA$  mit dem Kreise  $M$  bildet, bleibt bei den Verwandlungen ungeändert; mithin schneiden  $PA$  und  $QA$  den Kreis  $M$  unter demselben Winkel. Wie die Betrachtung der Verwandlungen erkennen läßt, bilden bei einer geraden Anzahl derselben,  $PA$  und  $QA$  eine Gerade.

Demnach lautet die Auflösung:

Man verwandle  $\mathfrak{D}$  durch successive Anwendung der Verwandtschaften  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{A})$  in  $P$ ; darauf  $\mathfrak{A}$  durch successive Anwendung von  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{C})$ ,  $(\mathfrak{D})$  in  $Q$ , so schneidet  $PQ$  den Kreis in  $A$ .

Diese Auflösung bleibt bei einem beliebigen Polygon von gerader Seitenzahl im Wesentlichen ungeändert.

77. *In einen Kreis ein Dreieck  $ABC$  zu beschreiben, dessen Seiten bezüglich durch die Punkte  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  gehen.*

Wenn man wie in der vorigen Aufgabe verfährt, so erhält man wieder zwei Gerade  $PA$  und  $QA$ , die mit dem Kreise zwar gleiche Winkel, aber in entgegengesetztem Sinne bilden.

Deshalb verwandle man einen der Schnittpunkte von  $P\mathfrak{A}$  mit dem Kreise  $M$  durch die Verwandtschaften  $(\mathfrak{A})$ ,  $(\mathfrak{B})$ ,  $(\mathfrak{C})$  in einen Punkt  $R$ . Die Geraden  $\mathfrak{A}P$  und  $AP$  sind dadurch verwandelt in  $RQ$  und  $AQ$ , so daß also  $\sphericalangle \mathfrak{A}PA = RQA$  wird; diese vier Geraden bilden ein Kreisviereck. Der um dasselbe beschriebene Kreis geht durch die Punkte  $PQ$  und den Schnittpunkt der Geraden  $\mathfrak{A}P$  und  $QR$  und ist dadurch



bekannt; er geht auch durch  $A$  und bestimmt in seinem Durchschnitte mit dem Kreise  $M$  diesen Punkt.

Bei der Ausdehnung dieser Auflösung auf ein Polygon von beliebiger aber ungerader Seitenzahl ändert sich nur die Zahl der Verwandtschaften.

### 78. Das Malfattische Problem.

*In ein Dreieck drei Kreise zu zeichnen, von denen jeder die beiden anderen und zwei Seiten berührt.\*)*




Fig. 26.

Die Mittelpunkte der gesuchten Kreise seien  $O_a O_b O_c$ , ihre Berührungspunkte  $\mathfrak{C}\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ , die Berührungspunkte auf den Seiten  $C_a C_b A_b A_c B_c B_a$ . — Durch  $C_b$  lege man einen Kreis  $O$ , welcher die Kreise  $O_a$  und  $O_c$  in  $\mathfrak{B}$  berührt; er schneidet  $AC$  in  $D$  und bildet (59b.) gleiche Winkel mit der Seite  $AC$  und dem Kreise  $O_b$ , also auch mit den Seiten  $AC$  und  $AB$ . Zieht man daher in  $C_b$  und  $D$  an den Kreis  $O$  die Tangenten  $C_b F$  und  $DF$ , so ist  $\sphericalangle AC_b F = CDF$ , also  $AC_b F + ADF = 2R$

\*) Die mitgeteilte Auflösung ist von Steiner ohne Beweis gegeben, von Petersen: Methoden und Theorien, bewiesen. Einen anderen Beweis gab Schroeter, Crelle-Borchardts Journal. 1874.



und  $DFC_b + A = 2R$ , also wird der Bogen  $DC_b$  durch den Winkel  $A$  gemessen.

Die Punkte  $C_a C_b$  sowie  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  sind inverse Punkte der Kreise  $O_a$  und  $O_b$  und liegen daher auf einem Kreise  $M$ . Er schneide den durch  $B_a D\mathfrak{B}$  bestimmten Kreis in  $E$ , dann ist

$$B_a E\mathfrak{B} + B_a D\mathfrak{B} = 180^\circ \text{ und } C_a E\mathfrak{B} + C_a C_b \mathfrak{B} = 180^\circ,$$

also  $\sphericalangle B_a E C_a = 180^\circ - \frac{1}{2}A$  und folglich muß der durch  $B_a E C_a$  bestimmte Kreis seinen Mittelpunkt in  $A$  haben.

In den Punkten  $C_a$  und  $\mathfrak{B}$  werden  $AB$  und  $O_c$  von  $O_a$  berührt, also sind  $C_a$  und  $\mathfrak{B}$  inverse Punkte von  $AB$  und  $O_c$  und der durch sie gelegte Kreis  $M$  schneidet  $AB$  und  $O_c$ , also auch  $AB$  und die in  $\mathfrak{B}$  an  $O_c$  und  $O$  oder die in  $C_b$  an  $O$  gelegte Tangente  $C_b F$  unter gleichen Winkeln und daher auch unter gleichen Sehnen und weil  $AC_a = AE$ , so ist  $C_a C_b = EG = C_b H$ . — Auf gleiche Art folgt, daß der durch  $B_a D\mathfrak{B}E$  bestimmte Kreis die Gerade  $AE$  und die Tangente  $DF$  unter gleichen Winkeln schneidet.

Es mögen die Tangenten  $C_b F$  und  $DF$  die Gerade  $AE$  in  $K$  und  $J$  schneiden, dann ist zunächst  $C_b F = DF$ ,  $C_b K = EK$  und  $DJ = EJ$ , weil der Kreis  $M$  auf  $C_b F$  und  $AE$  und der Kreis durch  $B_a D\mathfrak{B}E$  auf  $DF$  und  $AE$  gleiche Sehnen abschneiden. Daraus folgt

$$\begin{aligned} C_b F - C_b K &= DF - EK \\ KF &= DJ - FJ - (EJ - KJ) \\ &= -FJ + KJ \end{aligned}$$

oder  $KF + FJ = KJ$ .

Es wäre also im Dreieck  $FKJ$  die Summe zweier Seiten gleich der dritten Seite, also müssen die Punkte  $FKJ$  zusammenfallen und  $AEF$  ist die Halbierungslinie des Winkels  $A$ .

Der Kreis  $M$  schneidet also die Geraden  $AB$ ,  $AE$  und die Tangenten in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  unter gleichen Sehnen oder gleichen Winkeln; es läßt sich daher ein konzentrischer Kreis zeichnen, welcher diese vier Geraden berührt. In gleicher Weise ergibt sich, daß dieser Kreis auch die Halbierungslinie des Winkels  $B$  berührt. Dadurch aber ist dieser Kreis bestimmt.

Sind demnach  $M'M''M'''$  die Kreise, welche den Dreiecken



eingeschrieben sind, in welche  $ABC$  durch die Halbierungslinien der Winkel zerlegt wird, so haben sie die Tangenten in  $\mathfrak{ABC}$  an die gesuchten Kreise zu gemeinschaftlichen Tangenten und die letzteren sind dadurch bestimmt.

## § 7.

## Die harmonische Verwandtschaft.

79. Man wähle einen festen Punkt  $O$  und eine feste Gerade  $o$  als *Centrum* und *Axe*. Zwei Punkte, wie  $AA_1$  oder  $BB_1$ ,




Fig. 27.

welche durch Centrum und Axe harmonisch getrennt sind, heißen *verwandte Punkte*; zwei Gerade, wie  $aa_1$  oder  $bb_1$ , welche durch Centrum und Axe harmonisch getrennt sind, heißen *verwandte Gerade*. Die Beziehung, in welche dadurch die Punkte und Geraden der Ebene gesetzt sind, heißt „*harmonische Verwandtschaft*“. Die Mittellinie von Centrum und Axe

heißt die *Mittellinie* der Verwandtschaft.

Es sind dann  $AA_1O\mathfrak{A}$ ,  $BB_1O\mathfrak{B}$ ,  $aa_1o\mathfrak{a}$ ,  $bb_1ob$  harmonisch.

Durchläuft der Punkt  $A$  die Gerade  $a$ , so muß der verwandte Punkt  $A_1$  die verwandte Gerade  $a_1$  durchlaufen, denn  $A'A_1O\mathfrak{A}$  sind harmonisch; wenn  $b$  sich um  $B$  dreht, muß die verwandte Gerade  $b_1$  sich um den verwandten Punkt  $B_1$  drehen, denn jede durch  $O$  gelegte Transversale wird durch  $Oobb_1$  harmonisch geteilt.

Sind  $ABCD$  harmonische Punkte einer Geraden  $g$ , so liegen die verwandten Punkte  $A_1B_1C_1D_1$  auf der verwandten Geraden  $g_1$  und gleichzeitig auf den harmonischen Strahlen  $O(ABCD)$ , sind also selbst harmonisch.

Wenn  $P(abcd)$  harmonische Strahlen sind, so schneiden sich die verwandten Strahlen  $a_1b_1c_1d_1$  in dem zu  $P$  verwandten



Punkte  $P_1$  und schneiden die Axe  $o$  in ihren Schnittpunkten mit  $abcd$ , sind also auch harmonisch.

Aus der Definition der Verwandtschaft haben sich also unmittelbar folgende Sätze ergeben:

a. *Zwei verwandte Punkte liegen mit dem Centrum in einer Geraden. Dieses, sowie jeder Punkt der Axe, ist sich selbst verwandt.*

b. *Zwei verwandte Gerade schneiden sich auf der Axe. Diese, sowie jede Gerade durchs Centrum, ist sich selbst verwandt.*

c. *Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so durchläuft der verwandte Punkt die verwandte Gerade.*

d. *Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so dreht sich die verwandte Gerade um den verwandten Punkt.*

e. *Vier harmonischen Punkten oder Strahlen sind wieder harmonische Punkte oder Strahlen verwandt.*

f. *Einer Punkt- oder Strahleninvolution ist wieder eine Punkt- oder Strahleninvolution verwandt.*

Sind nämlich  $AA'BB'CC' \dots$  Punktpaare einer Involution auf der Geraden  $g$ , so schneiden die Strahlenpaare  $O(AA'BB'CC' \dots)$  die verwandte Gerade  $g_1$  in der verwandten Involution  $A_1A'_1B_1B'_1C_1C'_1 \dots$ .

Sind andererseits  $aa'bb'cc' \dots$  Strahlenpaare einer Involution im Punkte  $P$ , so treffen sich die verwandten Strahlenpaare  $a_1a'_1b_1b'_1c_1c'_1 \dots$  im verwandten Punkte  $P_1$  und da je zwei verwandte Strahlen sich auf der Axe schneiden, so bilden  $a_1a'_1b_1b'_1c_1c'_1 \dots$  eine Involution.

g. *Der Mittellinie von Centrum und Axe ist  $g_\infty$  verwandt (4b).*

h. *Wählt man Pol und Polare eines Kreises als Centrum und Axe, so ist der Kreis sich selbst verwandt (14).*

80. Soll man eine solche Verwandtschaft herstellen, daß der Kreis sich selbst und der Geraden  $p$  die Gerade  $p_1$  verwandt ist, so ziehe man vom Schnittpunkte  $Q$  die Tangenten  $QA$  und  $QA_1$ , schneide  $AA_1$  mit  $p$  und  $p_1$  in  $P$  und  $P_1$  und konstruiere dasjenige Punktpaar  $OO'$ , welches  $AA_1$  und  $PP_1$  harmonisch teilt, so sind  $O$  und  $QO'$  oder  $O'$  und  $QO$  Centrum und Axe der Verwandtschaft.



Wenn  $Q$  innerhalb des Kreises liegt, so schneide man den Kreis mit  $p$  und  $p_1$  in  $BC$  und  $B_1C_1$  und konstruiere die Schnittpunkte  $O$  von  $BC_1$  und  $B_1C$  und  $O'$  von  $BB_1$  und  $CC_1$ , so sind wieder  $O$  und  $QO'$  oder  $O'$  und  $QO$  Centrum und Axe.

Fällt  $p_1$  mit  $g_\infty$  zusammen, so liegt  $Q$  im Unendlichen;  $AA_1$  wird der auf  $p$  senkrechte Durchmesser. Man ziehe die Tangente  $PD$  an den Kreis und schneide sie auf  $AA_1$  nach beiden Seiten bis  $O$  und  $O'$  ab, so sind  $O$  und  $QO'$  oder  $O'$  und  $QO$  Centrum und Axe. Die Axe ist in diesem Falle parallel mit  $p$ . (4c. 4b).

81. Auf gleiche Art läßt sich eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher ein Kreis sich selbst verwandt ist und zwei Punkte  $P$  und  $P_1$  verwandte Punkte sind.

Wenn  $PP_1$  den Kreis in  $AA_1$  schneidet, und  $OO'$  dasjenige Punktpaar ist, welches die Strecken  $AA_1$  und  $PP_1$  harmonisch teilt, so sind  $O$  und seine Polare oder  $O'$  und seine Polare Centrum und Axe.

Schneidet  $PP_1$  den Kreis nicht, so ziehe man von  $P$  die Tangenten  $b$  und  $c$ , von  $P_1$  die Tangenten  $b_1$  und  $c_1$ , und verbinde die Schnittpunkte  $bc_1$  und  $b_1c$ , sowie  $bb_1$  und  $cc_1$  durch die Geraden  $o$  und  $o'$ , dann sind  $o$  und der Schnittpunkt von  $PP_1$  mit  $o'$  oder  $o'$  und der Schnittpunkt von  $PP_1$  mit  $o$  Axe und Centrum.

82. Welches ist der Ort der Centra aller harmonischen Verwandtschaften, in denen ein Kreis  $M$  sich selbst und einem Punkte  $P$  ein Punkt auf  $g_\infty$  verwandt ist?

Der Punkt  $P$  muß außerhalb des Kreises  $M$  liegen. Um  $P$  beschreibe man denjenigen Kreis, welcher  $M$  rechtwinklig schneidet, so ist er der gesuchte Ort.

Denn ist  $OO'$  ein Durchmesser des Kreises  $P$ , so wird er durch  $M$  harmonisch geteilt (27c); die Polare  $o$  von  $O$  für  $M$  geht durch  $O'$ . Nimmt man also  $O$  und  $o$  als Centrum und Axe, so ist dem Punkte  $P$  ein solcher auf  $g_\infty$  (4b) und der Kreis sich selbst verwandt.

83. Welches ist der Ort der Centra aller harmonischen Verwandtschaften, in denen der Kreis  $M$  sich selbst und seinem Mittelpunkt ein Punkt einer bestimmten Geraden  $g$  verwandt ist?

Die Gerade muß den Kreis  $M$  schneiden; der durch die



Schnittpunkte gelegte Kreis  $K$ , welcher  $M$  rechtwinklig schneidet, ist der gesuchte Ort.

Ein Durchmesser von  $M$  wird durch die Schnittpunkte  $O$  und  $O'$  mit  $K$  harmonisch geteilt (27c);  $g$  ist die Polare von  $M$  für  $K$ , also wird  $OO'$  durch  $M$  und  $g$  harmonisch geteilt. Nimmt man also  $O$  als Centrum und seine durch  $O'$  gehende Polare als Axe, so ist der Kreis sich selbst und dem Punkte  $M$  der Schnittpunkt von  $g$  mit  $OO'$  verwandt.

Aus 82. und 83. folgt: Es giebt im allgemeinen zwei harmonische Verwandtschaften, in denen ein Kreis sich selbst verwandt ist, so daß der einem gegebenen Punkte verwandte Punkt auf  $g_\infty$  und der dem Mittelpunkte verwandte Punkt auf einer gegebenen Geraden liegt.

84. *Eine harmonische Verwandtschaft herzustellen, in welcher einem Vierecke ein Parallelogramm verwandt ist.*

Man verlängere die Gegenseiten, bis sie sich schneiden, ziehe die Verbindungslinie und wähle Centrum und Axe so, daß jene die Mittellinie beider wird.

85. *Gegeben sei ein Viereck  $ABP_1P_2$ ; die verwandte Figur  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2$  soll ein Kreisviereck sein.*




Fig. 28.

Man schneide die Seiten  $P_1A$ ,  $P_2A$ ,  $P_1B$ ,  $P_2B$  in  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B_1$ ,  $B_2$  durch eine Gerade  $g$  und konstruiere (8b) denjenigen Kreis  $K$ , von dessen Punkten  $A_1A_2$  und  $B_1B_2$  unter gleichen Winkel erscheinen, so ist jeder Punkt  $O$  desselben Centrum einer harmonischen Verwandtschaft, in welcher dem Viereck  $ABP_1P_2$  ein Kreisviereck verwandt ist. Um die Axe  $o$  zu erhalten, fälle man von  $O$  eine Senkrechte auf  $g$ , schneide mit ihr den Kreis noch in  $O'$  und ziehe  $o \parallel g$  durch  $O'$ .

Der Geraden  $g$  ist  $g_\infty$  verwandt, also liegen die den Punkten  $A_1A_2B_1B_2$  verwandten Punkte  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2\mathfrak{B}_1\mathfrak{B}_2$  auf  $g_\infty$ . Von jedem Punkte des Kreises  $K$  sieht man  $A_1A_2$  und  $B_1B_2$  unter gleichen Winkeln, also ist



$$\sphericalangle A_1 O A_2 = \sphericalangle B_1 O B_2$$

und daher auch  $\sphericalangle \mathfrak{A}_1 O \mathfrak{A}_2 = \sphericalangle \mathfrak{B}_1 O \mathfrak{B}_2$  (79 a).

Da  $\mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \mathfrak{B}_1 \mathfrak{B}_2$  im Unendlichen liegen, so ist

$$\mathfrak{A} \mathfrak{A}_1 \parallel O \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A} \mathfrak{A}_2 \parallel O \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B} \mathfrak{B}_1 \parallel O \mathfrak{B}_1, \mathfrak{B} \mathfrak{B}_2 \parallel O \mathfrak{B}_2$$

also

$$\sphericalangle \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A} \mathfrak{A}_2 = \sphericalangle \mathfrak{B}_1 \mathfrak{B} \mathfrak{B}_2$$

oder

$$\sphericalangle \mathfrak{B}_1 \mathfrak{A} \mathfrak{B}_2 = \sphericalangle \mathfrak{B}_1 \mathfrak{B} \mathfrak{B}_2,$$

d. h.  $\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{B}_1 \mathfrak{B}_2$  liegen auf einem Kreise.

86. Gegeben ist ein Viereck  $ABCD$ ; die verwandte Figur  $\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D}$  soll ein Rechteck sein.




Fig. 29.

Die Gegenseiten  $AB$  und  $CD$  schneiden sich in  $G$ ,  $BC$  und  $AD$  in  $F$ . Über  $GF$  beschreibe man einen Kreis, nehme auf ihm einen Punkt  $O$  als Centrum und die Axe  $o$  so, daß  $GF$  von  $C$  und  $o$  die Mittelsenkrechte ist.

Zunächst folgt aus 84, daß die verwandte Figur  $\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D}$  ein Parallelogramm

ist, dessen Seiten den Geraden  $OG$  und  $OF$  parallel sind. Da diese auf einander senkrecht stehen, so ist das Parallelogramm ein Rechteck.

87. Gegeben sei ein Fünfeck  $ABCP_1P_2$ ; die verwandte Figur soll ein Kreisfünfeck sein.

I. Man schneide  $P_1A$  und  $P_2A$ ,  $P_1B$  und  $P_2B$ ,  $P_1C$  und  $P_2C$  mit einer Geraden  $g$  in  $A_1A_2$ ,  $B_1B_2$ ,  $C_1C_2$  und konstruiere die beiden Punkte  $O$  und  $O'$ , von denen die Strecken  $A_1A_2$ ,  $B_1B_2$ ,  $C_1C_2$  unter gleichen Winkeln gesehen werden. Durch  $O'$  lege man  $o \parallel g$ , so sind  $O$  und  $o$  Centrum und Axe der gesuchten Verwandtschaft.

Beweis wie in 85.



II. Man teile durch die sechs Verbindungslinien der vier Punkte  $ABCD$  die Ebene in die Gebiete  $\alpha, \beta, \gamma$ ;  $E$  liege




Fig. 29 a.

in einem der Gebiete  $\alpha$ . Die drei Diagonalepunkte des Vierecks  $ABCD$  seien  $FGH$ . Man schneide  $FG$  mit  $EA$  und  $EC$  in  $J$  und  $K$ , beschreibe über  $FG$  und  $JK$  Kreise; diese müssen sich in zwei Punkten  $O$  und  $O'$  schneiden. Man wähle  $O$  oder  $O'$  als Centrum und  $FG$  als Mittellinie der Verwandtschaft.

Aus 86. folgt zunächst, daß das ver-

wandte Viereck  $ABCD$  ein Rechteck ist.  $K$  ist der Schnittpunkt von  $AE$  und  $OK$ ; der ihm verwandte Punkt  $R$  liegt deshalb auf der verwandten Geraden  $AC$  und auch auf  $OK$ , aber im Unendlichen, also ist  $AC \parallel OK$  und ebenso  $AC \parallel OJ$ , d. h.  $\angle ACJ = 90^\circ$  und  $C$  liegt auf dem um das Rechteck  $ABCD$  beschriebenen Kreise.

Liegt  $E$  in einem der Räume  $\beta$ , so schneide man  $GH$  mit  $EA$  und  $ED$  in  $K_1$  und  $J_1$ , dann schneiden sich die Kreise über  $GH$  und  $K_1J_1$  in zwei Punkten  $O_1$  und  $O_1'$ . Legt man  $o_1 \parallel GH$  durch  $O_1'$ , so sind  $O_1$  und  $o_1$  Centrum und Basis.

Liegt endlich  $E$  in einem der Räume  $\gamma$ , so schneide man  $HF$  mit  $EA$  und  $EB$  in  $K_2$  und  $J_2$ ; dann schneiden sich die Kreise über  $HF$  und  $K_2J_2$  in  $O_2$  und  $O_2'$ . Legt man  $o_2 \parallel HF$  durch  $O_2'$ , so sind  $O_2$  und  $o_2$  Centrum und Basis.

Die genannte Konstruktion liefert, wie die Anschauung ergibt, die Punkte  $OO'$  bez.  $O_1O_1'$  oder  $O_2O_2'$  stets reell.

88. Gegeben ist ein Viereck; die verwandte Figur soll ein Rhombus sein.

Die Gegenseiten des Vierecks  $ABCD$  schneiden sich in  $E$  und  $F$ ; die Diagonalen  $AC$  und  $BD$  schneiden  $EF$  in  $H$







Es schneiden sich  $AK$  und  $CL$  in  $D$ , ferner die Gegenseiten von  $ABCD$  in  $E$  und  $F$ ; man ziehe die Diagonalen  $AC$  und  $BD$ , die sich in  $G$  und  $EF$  in  $H$  und  $J$  schneiden, schneide  $AB$  mit  $KL$  in  $M$ ,  $EF$  mit  $GK$  und  $GM$  in  $N$  und




Fig. 30a.

$P$  und beschreibe über  $HJ$  und  $NP$  zwei Kreise. Diese mögen sich in  $O$  und  $O'$  treffen. Wählt man  $O$  als Centrum und  $o$  durch  $O'$  parallel zu  $EF$  als Axe, so läßt sich in das verwandte Fünfeck  $ABCEM$  ein Kreis zeichnen.

Nach 88. wird  $ABCEM$  ein Rhombus, also läßt sich an vier Seiten des Fünfecks ein Berührungskreis legen, dessen Mittelpunkt  $G$  ist. Da aber  $\angle RGM$  ein Rechter ist, so muß dieser Kreis auch  $RM$  berühren, denn jede Tangente dieses Kreises zwischen den parallelen Tangenten  $AB$  und  $CE$  spannt am Mittelpunkte einen rechten Winkel.

Damit die Schnittpunkte  $O$  und  $O'$  reell sind, muß von den Punkten  $N$  und  $P$  der eine auf der Strecke  $HJ$ , der andere auf der Verlängerung liegen. Dies ist aber der Fall, wenn die fünfte Seite  $KL$  eine der Seiten des Vierecks  $ABCD$  selbst, die Gegenseite aber in der Verlängerung schneidet. Man hat daher unter den fünf Geraden vier so zu wählen, daß sie ein Viereck bilden, in welchem die fünfte Gerade die eine Seite selbst, die Gegenseite in der Verlängerung schneidet. Dies aber ist stets möglich.



91. Gegeben sind vier Punkte  $ABCD$  und durch  $A$  die Gerade  $a$ ; die verwandte Figur soll so beschaffen sein, daß das verwandte Viereck  $A'B'C'D'$  ein Rechteck wird und der um dasselbe beschriebene Kreis die verwandte Gerade  $a$  berührt.

Die Gerade  $a$  liegt entweder im Winkel  $BAC$  oder  $CAD$  oder in keinem von beiden. — Im ersten Falle schneide man

$HF$  mit  $a$  in  $J$  und mit  $AD$  in  $K$ , beschreibe über  $HF$  und  $JK$  Kreise, die sich in  $O$  und  $O'$  schneiden. Man nehme  $O$  als Centrum der Verwandtschaft und lege die Axe durch  $O'$  parallel zu  $FH$ .




Fig. 31.

Im zweiten Falle schneide man  $GH$  mit  $a$  in  $J_1$  und mit  $AB$  in  $K_1$ , beschreibe über  $GH$  und  $J_1K_1$  Kreise, die sich in  $O_1$  und  $O_1'$  schneiden, nehme  $O_1$  als Centrum und lege die

Axe durch  $O_1'$  parallel zu  $GH$ .

Im dritten Falle schneide man  $FG$  mit  $a$  in  $J_2$  und mit  $AC$  in  $K_2$ , beschreibe über  $FG$  und  $J_2K_2$  Kreise, die sich in  $O_2$  und  $O_2'$  schneiden, nehme  $O_2$  als Centrum und lege die Axe  $o_2$  durch  $O_2'$  parallel zu  $FG$ .

92. Gegeben sind vier Gerade  $abcd$  und auf  $a$  der Punkt  $P$ ; die verwandten Geraden  $a'b'c'd'$  sollen einen Rhombus bilden, dessen eingeschriebener Kreis durch den verwandten Punkt  $\mathfrak{P}$  geht.




Fig. 32.



Der Punkt  $P$  liegt entweder auf der Strecke  $AB$  oder  $BE$  oder auf keiner von beiden.

Im ersten Falle schneide man  $EF$  mit  $GP$  in  $K$ , beschreibe über  $HJ$  und  $EK$  Kreise, die sich in  $O$  und  $O'$  treffen, nehme  $O$  als Centrum und lege die Axe  $o$  durch  $O'$  parallel zu  $EF$ .

Im zweiten Falle schneide man  $AC$  mit  $JP$  in  $K_1$ , beschreibe über  $GH$  und  $AK_1$  Kreise, die sich in  $O_1$  und  $O'_1$  treffen, nehme  $O_1$  als Centrum und lege die Axe  $o_1$  durch  $O'_1$  parallel zu  $AC$ .

Im dritten Falle schneide man  $GJ$  mit  $HP$  in  $K_2$ , beschreibe über  $GJ$  und  $BK_2$  Kreise, die sich in  $O_2$  und  $O'_2$  schneiden, nehme  $O_2$  als Centrum und lege die Axe durch  $O'_2$  parallel zu  $GJ$ .

93. Gegeben sind drei Punkte  $ABC$  und durch  $A$  und  $B$  die Geraden  $a$  und  $b$ ; der durch die verwandten Punkte beschriebene Kreis soll die verwandten Geraden berühren.




Fig. 33.

Die Geraden  $a$  und  $b$  schneiden sich in  $D$ ; ziehe  $AC$  und  $BC$  lege durch  $D$  eine Gerade, welche  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  in den Punkten  $C'$ ,  $B'$ ,  $A'$  so schneidet, daß  $C'$  und  $D$  durch  $A'$  und  $B'$  getrennt sind, beschreibe über  $C'D$  und  $A'B'$  Kreise, die sich in  $O$  und  $O'$  schneiden, nehme  $O$  als Centrum und lege die Axe durch  $O'$  parallel zu  $C'D$ .

Sind  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{a}\mathfrak{b}$  die verwandten Elemente, so

sind die Winkel  $\mathfrak{D}\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{D}\mathfrak{B}\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{A}\mathfrak{C}\mathfrak{B}$  rechte und daher berührt der durch  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  gehende Kreis die Geraden  $a$  und  $b$  in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$ .

94. Gegeben sind drei Gerade  $abc$  und auf  $a$  und  $b$  die Punkte  $A$  und  $B$ ; die verwandten Geraden sollen einen Kreis in den verwandten Punkten berühren. Fig. 33.



$AB$  werde von  $c$  in  $E$  geschnitten,  $ABEF$  seien harmonisch,  $DF$  treffe  $c$  in  $C$ , man ziehe  $AC$  und  $BC$ , schneide diese und  $AB$  mit einer Geraden durch  $D$  in  $B'$ ;  $A'$ ,  $C'$ , beschreibe über  $A'B'$  und  $C'D$  Kreise, die sich  $O$  und  $O'$  treffen, nehme  $O$  als Centrum und lege die Axe durch  $O'$  parallel zu  $A'B'$ .

#### 95. Die Symmetrie.

Wenn bei einer harmonischen Verwandtschaft das Centrum im Unendlichen, aber auf einer zur Axe senkrechten Richtung liegt, so liegen zwei verwandte Figuren symmetrisch zur Axe, d. h. wenn man die eine Halbebene um die Axe dreht und mit der anderen Halbebene zur Deckung bringt, so fallen die verwandten Figuren aufeinander.

Nimmt man die unendlich entfernte Gerade  $g_\infty$  zur Axe einer harmonischen Verwandtschaft, so liegen zwei verwandte Punkte gleichweit entfernt vom Centrum. Jede Figur kann man durch Verschiebung in der Ebene mit der verwandten Figur zur Deckung bringen.

Im ersten Falle heisst die Verwandtschaft *axiale*, im zweiten *centrale Symmetrie*.

Für jede Art von Symmetrie gelten natürlich die Sätze 79a bis d. Leitet man diese Sätze für die Symmetrie aus den geometrischen Grundsätzen ab, so können sie statt der Congruenz als Fundament der Geometrie benutzt werden. Näheres hierüber im „Leitfaden der ebenen Geometrie“ von Dr. Hubert Müller.

### § 8.

#### Anwendungen der harmonischen Verwandtschaft.

96. Die Verbindungslinien  $ab$ ,  $cd$ ,  $ef$  eines Punktes  $O$  mit den Paaren  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$  von Gegenecken eines vollständigen Vierseits sind drei Strahlenpaare einer Involution.

Man wähle  $O$  als Centrum einer harmonischen Verwandtschaft und die Axe  $o$  so, daß der  $EF$  die  $g_\infty$  verwandt ist, dann ist dem Viereck  $ABCD$  ein Parallelogramm  $ABCD$  verwandt, dessen Seiten zu  $OE$  und  $OF$  parallel sind. (84). Aus den Proportionen



$$O\mathfrak{F} : O\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{F} : \mathfrak{A}\mathfrak{F} = \mathfrak{S}\mathfrak{F} : \mathfrak{B}\mathfrak{G} = \mathfrak{S}\mathfrak{F} : \mathfrak{C}\mathfrak{F}$$

folgt:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{F} \cdot \mathfrak{S}\mathfrak{F} = \mathfrak{C}\mathfrak{F} \cdot \mathfrak{H}\mathfrak{F}.$$




Fig. 34.

Die Schnittpunkte der mit  $e$  parallelen Geraden  $\mathfrak{A}\mathfrak{F}$  der Strahlen  $abcdef$  sind drei Punktpaare einer Involution, deren Centralpunkt  $\mathfrak{F}$  ist, also bilden  $abcdef$  drei Strahlenpaare einer Involution.

97. Die Schnittpunkte  $AB, CD, EF$  einer Geraden  $g$  mit den Paaren von Gegenseiten eines vollständigen Vierecks  $MNPQ$  sind drei Punktpaare einer Involution.




Fig. 35.

Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Geraden  $PQ$  die  $g_\infty$  verwandt ist, dann ist, wenn man mit

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}\mathfrak{M}\mathfrak{N}$$

die zu

$$ABCDEFMN$$

verwandten Punkte und mit

$g$  die zu  $g$  verwandte Gerade bezeichnet,

$$\mathfrak{M}\mathfrak{G} : \mathfrak{N}\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{G} : \mathfrak{D}\mathfrak{G} = \mathfrak{C}\mathfrak{G} : \mathfrak{B}\mathfrak{G},$$

also

$$\mathfrak{A}\mathfrak{G} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{G} = \mathfrak{C}\mathfrak{G} \cdot \mathfrak{D}\mathfrak{G}.$$

Da  $\mathfrak{F}$  im Unendlichen liegt, so sind  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}$  Punktpaare einer Involution mit dem Centralpunkte  $\mathfrak{G}$ ; also sind auch  $ABCDEF$  in Involution. (79f).

98. Jede Gerade  $g$  wird von einem Kreise  $M$  und den Gegenseiten eines eingeschriebenen Vierecks  $ABCD$  in den Punktpaaren einer Involution geschnitten.

Die Schnittpunkte von  $g$  mit  $M$  und den Seitenpaaren  $AB$  und  $CD$ ,  $AD$  und  $BC$  seien  $EF, GH, JK$ . Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Punkte  $K$  ein Punkt auf  $g_\infty$  verwandt ist (82). Die den Punkten  $ABCDEFGHJK$  und der Geraden






Fig. 36.

$g$  verwandten Elemente seien

$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{I}\mathcal{K}$  und  $g$ .

Letztere wird der Geraden  $\mathcal{B}\mathcal{C}$ , auf welcher  $\mathcal{K}$  im Unendlichen liegt, parallel sein. Dann ist

$$\mathfrak{S}\mathcal{A} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{D} = \mathfrak{S}\mathcal{F} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{C}.$$

Weil aber  $\mathcal{A}\mathcal{D}\mathcal{H}\mathcal{G}$  mit  $\mathcal{A}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{B}$  gleichwinklig, also auch ein Kreisviereck ist, so ist auch

$$\mathfrak{S}\mathcal{A} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{D} = \mathfrak{S}\mathcal{H} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{G},$$

also

$$\mathfrak{S}\mathcal{F} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{C} = \mathfrak{S}\mathcal{H} \cdot \mathfrak{S}\mathcal{G},$$

d. h.  $\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{I}\mathcal{K}$  sind drei Punktpaare einer Involution mit dem Centralpunkte  $\mathfrak{S}$ , also sind auch  $\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{I}\mathcal{K}$  in Involution.

98a. Die Tangenten von einem Punkte  $P$  an einen Kreis  $M$  und die Verbindungslinien mit den Gegeneckenpaaren eines umgeschriebenen Vierseits sind in Involution.

I. Es seien  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  die drei Paare von Gegenecken,  $DD_1$  die Berührungspunkte der Tangenten; es seien ferner  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  die Polaren von  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ . Die Verbindungsgerade  $DD_1$  ist die Polare  $p$  von  $P$ . Da  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  die drei Paare von Gegenseiten eines vollständigen dem Kreise  $M$  eingeschriebenen Vierecks sind, so werden sie von  $p$  in einer Involution geschnitten, zu welcher auch das Punktpaar  $DD_1$  gehört. Die Polaren der Punktpaare einer Involution bilden aber die Strahlenpaare einer Strahleninvolution; denn die Strahlenpaare, welche den Mittelpunkt  $M$  mit den Punktpaaren der Punktinvolution verbinden, bilden eine Strahleninvolution; auf diesen Verbindungslinien stehen aber die Polaren jener Punkte senkrecht, bilden also dieselben Winkel und das Büschel von Polaren ist der Strahleninvolution im Mittelpunkte kongruent, also selbst eine Involution.

II. Der Beweis dieses Satzes läßt sich auch durch Benutzung der harmonischen Verwandtschaft ohne Polarisierung führen.

Dazu braucht man folgenden Hilfssatz:



Zieht man von einem Punkt  $P$  an einen Kreis zwei Tangenten und schneidet sie durch zwei parallele Tangenten  $a$  und  $b$  in den Punkten  $EG$  und  $FH$ , so ist für jede Lage von  $a$  und  $b$  das Produkt  $PE \cdot PH = PF \cdot PG$  konstant.




Fig. 36 a.

Sind  $c$  und  $d$  zwei andere parallele Tangenten, welche  $a$  und  $b$  in den Punkten  $AB$  und  $CD$  schneiden und ist  $J$  der Schnittpunkt von  $c$  mit  $PF$ ,  $K$  derjenige von  $d$  mit  $PE$ , so ist, wenn  $N$  und  $L_1$  Berührungspunkte sind:

$$\begin{aligned} \sphericalangle \varepsilon &= \frac{1}{2} NML_1 \\ &= \frac{1}{2} (180^\circ - \alpha) \\ &= 90^\circ - \frac{\alpha}{2} \\ &= \sphericalangle \beta. \end{aligned}$$

Daher haben die Dreiecke  $BMJ$ ,  $JMF$  und  $FMD$  gleiche Winkel und sind ähnlich, folglich gelten die Proportionen

$$BJ : BM = DM : DF$$

oder, weil  $DM = BM$ ,  $BM^2 = BJ \cdot DF$ .

Da auch  $BM^2 = BN \cdot BA$

wegen des rechtwinkligen Dreiecks  $ABM$  und  $BN = BL$ ,  $AB = CD$  ist, so folgt

$$BJ : BL = CD : DF$$

und daraus  $LJ \parallel CF$ ;

ebenso  $KA \parallel GN$ .

Aus den Proportionen

$$BL : BJ = DF : CD$$

und  $BN : BG = DK : AD$

folgt  $BJ : BG = DK : DF$

und  $GJ \parallel FK$ .



Folglich aus ähnlichen Dreiecken

$$PF : PK = PJ : PG$$

oder

$$PF \cdot PG = PK \cdot PJ.$$

Mittelst des bewiesenen Hilfssatzes ergibt sich der Hauptsatz auf folgende Art:

$AC, BD, EF$  seien die Gegeneckenpaare eines dem Kreise  $M$  umgeschriebenen Vierseits,  $P$  ein beliebiger außerhalb des




Fig. 63 b.

Kreises liegender Punkt. Man verwandle durch harmonische Verwandtschaft den Kreis in sich selbst und die Gerade  $PF$  in die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$ ,  $ABCDE$  in  $\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}$ . Durch den zu  $P$  verwandten Punkt  $\mathfrak{P}_\infty$  gehen die zu  $\mathcal{E}\mathfrak{P}_\infty$  parallelen Geraden  $\mathcal{A}\mathcal{C}_1$ ,  $\mathcal{B}\mathcal{D}_1$  und die gleichfalls zu  $\mathcal{E}\mathfrak{P}_\infty$  parallelen Tangenten  $\mathcal{G}\mathcal{H}$  und  $\mathcal{G}_1\mathcal{I}$ . Wenn  $\mathcal{Q}$  der Schnittpunkt von  $\mathcal{C}\mathcal{D}$  und  $\mathcal{E}\mathfrak{P}_\infty$  ist, so hat man die Proportionen

$$\mathcal{Q}\mathcal{D} : \mathcal{Q}\mathcal{G} = \mathcal{C}\mathcal{D} : \mathcal{C}\mathcal{H}$$

$$\mathcal{Q}\mathcal{D}_1 : \mathcal{Q}\mathcal{G}_1 = \mathcal{C}\mathcal{B} : \mathcal{C}\mathcal{I}$$

Da aber nach dem Hilfssatze

$$\mathcal{C}\mathcal{B} \cdot \mathcal{C}\mathcal{D} = \mathcal{C}\mathcal{I} \cdot \mathcal{C}\mathcal{H},$$

so ist auch

$$\mathcal{Q}\mathcal{D} \cdot \mathcal{Q}\mathcal{D}_1 = \mathcal{Q}\mathcal{G} \cdot \mathcal{Q}\mathcal{G}_1$$

und ebenso

$$\mathcal{Q}\mathcal{C} \cdot \mathcal{Q}\mathcal{C}_1 = \mathcal{Q}\mathcal{G} \cdot \mathcal{Q}\mathcal{G}_1,$$

also sind  $\mathcal{C}\mathcal{C}_1$ ,  $\mathcal{D}\mathcal{D}_1$ ,  $\mathcal{G}\mathcal{G}_1$  Punktpaare einer Involution, deren



Centralpunkt  $\mathfrak{Q}$  ist. Nach den Gesetzen der harmonischen Verwandtschaft sind daher die Strahlen

$$P(AC, BD, GG_1, EF)$$

auch in Involution. Die Geraden  $PG$  und  $PG_1$  sind Tangenten des Kreises.

99. Diejenigen Geraden, welche einen Punkt  $P$  von den Punkten eines Kreises und den Gegenseitenpaaren eines ihm eingeschriebenen Vierecks harmonisch trennen, schneiden sich in einem Punkte  $Q$ .

Zunächst soll die Richtigkeit für einen ganz speziellen Fall bewiesen werden.

$EFG$  seien die drei Diagonalepunkte des Vierecks  $ABCD$ . Man halbiere die in  $EFG$  entstehenden Winkel. Als Peri-




Fig. 37.

pheriewinkel ist  $ADG = BCG$ ; ferner  $\sphericalangle DGH = \sphericalangle CGJ$ , also  $\sphericalangle DHG = \sphericalangle CJG$ , und ebenso  $\sphericalangle DKL = \sphericalangle CLK$ , also sind die Dreiecke  $FHJ$  und  $FKL$  gleichschenkelig,  $HJ \parallel KL$ , und es schneiden sich die Halbierungslinien der Winkel in  $EFG$  zweimal zu je drei in zwei im Unendlichen liegenden Punkten  $P_\infty$  und  $Q_\infty$ . Ist  $M$

der Kreismittelpunkt, so ist  $MP_\infty \perp MQ_\infty$ , also sind  $P_\infty$  und  $Q_\infty$  konjugierte Punkte. Da aber  $EP_\infty$  und  $EQ_\infty$ ,  $FP_\infty$  und  $FQ_\infty$ ,  $GP_\infty$  und  $GQ_\infty$  die drei Seitenpaare harmonisch trennen, so ist der Satz für den speziellen Fall bewiesen.

Auf ihn läßt sich der allgemeine Fall zurückführen. Die Geraden, welche den beliebigen Punkt  $P$  von den Seitenpaaren  $(AB, CD)$  und dem Kreise  $M$  harmonisch trennen, seien  $e$  und  $p$  und mögen sich in  $Q$  treffen. Wenn die Gerade  $PQ$  den Kreis trifft, so folgt der Satz unmittelbar aus 98; wenn aber  $PQ$  den Kreis nicht trifft, so stelle man eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und der Geraden  $PQ$  die  $g_\infty$  verwandt ist. Den Punkten  $P$



und  $Q$  sind die bezüglich des Kreises konjugierten Punkte  $\mathfrak{P}_\infty$  und  $\mathfrak{Q}_\infty$  und den Punkten  $ABCDEFG$  sind  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}\mathfrak{G}$  verwandt. Da nun  $\mathfrak{E}\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{E}\mathfrak{C}$  durch  $\mathfrak{E}\mathfrak{P}_\infty$  und  $\mathfrak{E}\mathfrak{Q}_\infty$  harmonisch getrennt sind,  $\mathfrak{E}\mathfrak{P}_\infty \perp \mathfrak{E}\mathfrak{Q}_\infty$  ist, so treffen sich nach dem speziellen Falle die Geraden, welche  $\mathfrak{Q}_\infty$  von den anderen Seitenpaaren des Vierecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  harmonisch trennen, in  $\mathfrak{Q}_\infty$ , also die verwandten Geraden in  $Q$ , womit der Satz bewiesen ist.

100. *Drehen sich drei Seiten eines Vierecks um drei feste Punkte einer Geraden und bewegen sich seine Ecken auf einem Kreise, so dreht sich auch die vierte Seite um einen festen Punkt derselben Geraden.*

Folgt unmittelbar aus 98 und 99.

101. *Der Pascal'sche Satz.*

*In jedem Kreissechsecke liegen die Schnittpunkte der Gegenseiten in einer Geraden.*




Fig. 38.

Das Kreissechseck  $ABCDEF$  teile man durch  $AD$  in die Vierecke  $ABCD$  und  $EFAD$ . Die Seiten  $AB$  und  $DE$ ,  $BC$  und  $EF$ ,  $AD$  und  $AD$  dieser Vierecke gehen durch die Punkte  $MNQ$  einer Geraden, also müssen nach e. auch  $CD$  und  $AF$  sich in einem Punkte dieser Geraden treffen.

102. *Diejenigen drei Geraden, welche einen Punkt  $P$  von den drei Gegenseitenpaaren eines vollständigen Vierecks harmonisch trennen, treffen sich wieder in einem Punkte  $Q$ . Cf. 357.*

Die Paare von Gegenseiten, welche die vier Punkte  $ABCD$  verbinden, seien  $ab$ ,  $cd$ ,  $ef$ . Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß dem Vierecke  $ABCD$  ein Kreisviereck  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  verwandt ist (85). Den Elementen  $abcdefP$  seien verwandt  $abcdef\mathfrak{P}$ . Da nun die Geraden, welche  $\mathfrak{P}$  von  $ab$ ,  $cd$ ,  $ef$  harmonisch trennen, sich nach 99. in einem Punkte  $\mathfrak{Q}$  treffen, so müssen sich auch die verwandten Geraden in einem Punkte  $Q$  treffen. (79c und e).



103. *Diejenigen Punkte, welche eine Gerade  $g$  von den drei Gegeneckpaaren eines vollständigen Vierseits harmonisch trennen, liegen in einer Geraden.*

Man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher der  $g$  die  $g_\infty$  verwandt ist. Da nach 58a der Satz für  $g_\infty$  im verwandten Vierecke gilt, so muß er auch fürs ursprüngliche gelten. (79c und e).

104. *Andere Ableitung des Pascal'schen Satzes.*

Es sei  $ABCDEF$  ein Kreissechseck; es seien  $M, N, Q$  die Schnittpunkte von  $AB$  und  $DE$ ,  $BC$  und  $EF$ ,  $CD$  und  $FA$ .




Fig. 39.

a. Die Gerade  $MN$  schneide den Kreis  $K$  nicht. Man stelle in diesem Falle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher  $K$  sich selbst, der  $MN$  aber  $g_\infty$  verwandt ist. Da die den Punkten  $M$  und  $N$  verwandten Punkte  $\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{N}$  im Unendlichen liegen, so müssen von den Seiten des verwandten Sechsecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{E}\mathfrak{F}$  parallel sein. Weil aber  $\text{Bog. } \mathfrak{A}\mathfrak{D} = \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{E}\mathfrak{F}$  ist, so ist

auch  $\mathfrak{C}\mathfrak{D} \parallel \mathfrak{F}\mathfrak{A}$ . Daher liegt der dem Punkte  $Q$  verwandte Punkt auch auf  $g_\infty$  und  $Q$  somit auf  $MN$ .

b. Wenn  $MN$  den Kreis schneidet, so hat man noch die Fälle zu unterscheiden, ob einer der Punkte  $MNQ$  aufserhalb des Kreises liegt oder nicht.

I.  $M$  liege aufserhalb des Kreises  $K$ .




Fig. 40.

Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß  $K$  sich selbst und dem Punkte  $M$  ein Punkt  $\mathfrak{M}$  auf  $g_\infty$  verwandt ist (82). In dem verwandten Kreissechsecke  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}$  sind also  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  parallel. Daher ist  $\text{Bog. } \mathfrak{A}\mathfrak{C} = \mathfrak{B}\mathfrak{D}$  und  $\sphericalangle \mathfrak{A}\mathfrak{F}\mathfrak{C} = \mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ , also  $\mathfrak{C}\mathfrak{M}\mathfrak{P}\mathfrak{F}$  ein Kreisviereck, folglich  $\sphericalangle \mathfrak{C}\mathfrak{M}\mathfrak{P} + \mathfrak{C}\mathfrak{F}\mathfrak{P} = 2R$ . Da auch  $\mathfrak{C}\mathfrak{B}\mathfrak{A} + \mathfrak{C}\mathfrak{F}\mathfrak{A} = 2R$  ist, so muß

$\mathfrak{C}\mathfrak{M}\mathfrak{P} = \mathfrak{C}\mathfrak{B}\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \parallel \mathfrak{M}\mathfrak{P}$  sein, d. h.  $\mathfrak{M}\mathfrak{P}$  geht durch  $\mathfrak{M}$ , also müssen die verwandten Punkte  $MNP$  auch auf einer Geraden liegen.



II. Keiner der drei Punkte  $MNP$  liegt aufserhalb des Kreises.

Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Punkte  $M$  der Mittelpunkt  $K$  verwandt ist (81. 83). In dem verwandten Kreissechsecke  $ABCE\mathfrak{F}$  schneiden sich die Gegenseiten  $AB$  und  $DE$  in  $K$ ;  $K\mathfrak{P}$  treffe den Kreis in  $\mathfrak{G}$ . Man mache  $\mathfrak{G}\mathfrak{F}_1 = \mathfrak{G}\mathfrak{F}$ , ziehe




Fig. 41.

$\mathfrak{F}_1\mathfrak{P}$  bis  $\mathfrak{A}_1$ , dann ist  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1 \perp K\mathfrak{P}$ ; ziehe ferner  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}_1 \parallel \mathfrak{B}\mathfrak{A}_1$ , dann ist  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{BCE}_1\mathfrak{F}_1$  ein Sechseck, in welchem die Gegenseiten  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}_1$  parallel sind. Daher liegen nach dem vorigen Falle die Schnittpunkte  $(\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}, \mathfrak{E}_1\mathfrak{D})$ ,  $(\mathfrak{B}\mathfrak{C}, \mathfrak{E}_1\mathfrak{F}_1)$ ,  $(\mathfrak{C}\mathfrak{D}, \mathfrak{F}_1\mathfrak{A}_1)$  in einer Geraden. Da der letzte Schnittpunkt aber  $\mathfrak{P}$  ist, so muß diese Gerade  $K\mathfrak{G}$  sein, weil  $K\mathfrak{G} \parallel \mathfrak{A}_1\mathfrak{B}$

ist. Weil ferner Bog.  $\mathfrak{AC} = \mathfrak{BD} = \mathfrak{A}_1\mathfrak{E}_1$  ist, so ist  $\mathfrak{CE}_1 \parallel \mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ , also müssen sich  $\mathfrak{E}_1\mathfrak{F}_1$  und  $\mathfrak{CE}$  in einem Punkte von  $K\mathfrak{G}$  treffen. Da aber auf  $K\mathfrak{G}$  sich auch  $\mathfrak{BC}$  und  $\mathfrak{E}_1\mathfrak{F}_1$  schneiden, so muß auch der Schnittpunkt  $\mathfrak{N}$  von  $\mathfrak{CE}$  und  $\mathfrak{BC}$  auf  $K\mathfrak{G}$  liegen. Auf dieser Geraden liegen also die Punkte  $\mathfrak{M}\mathfrak{N}\mathfrak{P}$ , auf der verwandten Geraden also  $MNP$ .

105. In jedem Kreisfünfecke liegen die Schnittpunkte von zwei Paaren nicht aufeinanderfolgender Seiten mit demjenigen dritten Punkte in einer Geraden, in welchem die fünfte Seite von der Tangente der gegenüberliegenden Ecke geschnitten wird.




Fig. 42.

Es sei  $ABCDE$  ein Kreisfünfeck und  $a$  die Tangente in  $A$ ; man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Schnittpunkte  $M$  von  $a$  und  $CD$  ein unendlich ferner Punkt  $\mathfrak{M}$  verwandt ist (82). In dem verwandten Fünfecke

$\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  ist  $\sphericalangle \mathfrak{ABC} = \mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{P}$ , also ist  $\mathfrak{B}\mathfrak{N}\mathfrak{C}\mathfrak{P}$  ein Kreisviereck und  $\sphericalangle \mathfrak{CPN} = \mathfrak{CBN} = \mathfrak{CAN}$



und  $\mathfrak{M}\mathfrak{P} \parallel \alpha$ . Da also  $\mathfrak{M}\mathfrak{N}\mathfrak{P}$  in einer Geraden liegen, so ist dies auch mit  $MNP$  der Fall.

106. In jedem Kreisvierecke sind die Schnittpunkte der Gegenseiten und der Tangenten in den Gegenecken vier harmonische Punkte.




Fig. 43.

$\mathfrak{M}\mathfrak{P} \parallel \alpha$ . Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Schnittpunkte  $M$  zweier Tangenten  $a$  und  $c$  in den Gegenecken  $A$  und  $C$  ein Punkt  $\mathfrak{M}$  auf  $g_\infty$  verwandt ist. In dem verwandten Kreisvierecke  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  ist  $\mathfrak{B}\mathfrak{N}\mathfrak{D}\mathfrak{P}$  ein Kreisviereck, weil  $\sphericalangle \mathfrak{N}\mathfrak{D}\mathfrak{P} = \sphericalangle \mathfrak{N}\mathfrak{B}\mathfrak{P} = 90^\circ$ , also  $\sphericalangle \mathfrak{N}\mathfrak{P}\mathfrak{D} = \sphericalangle \mathfrak{N}\mathfrak{B}\mathfrak{D} = \sphericalangle \mathfrak{M}\mathfrak{A}\mathfrak{D}$  und folglich  $\mathfrak{A}\mathfrak{M} \parallel \mathfrak{N}\mathfrak{P}$ .

Anderer Beweis.

Die drei Diagonalepunkte des Vierecks  $ABCD$  seien  $NPR$ ;




Fig. 44.

$NP$  ist die Polare von  $R$ , also müssen sich die Tangenten  $a$  und  $c$  in  $A$  und  $C$  in einem Punkte  $M$  von  $NP$  und ebenso diejenigen  $b$  und  $d$  in  $B$  und  $D$  in einem Punkte  $Q$  von  $NP$  schneiden (15, 19). Da aber  $R(ABNP)$  harmonische Strahlen sind (10), so müssen auch

$$NPMQ$$

harmonische Punkte sein (20).

107. (Fig. 44.) Die Tangenten  $abcd$  bilden ein dem Kreise umgeschriebenes Vierseit. Da die Tangenten  $a$  und  $b$  sowohl, wie  $c$  und  $d$  sich auf  $PR$ ,  $a$  und  $d$  aber, sowie  $b$  und  $c$  sich auf  $QR$  schneiden müssen (16, 19), so erhält man den Satz:

In jedem Tangentenvierseite sind die Verbindungslinien der Gegenecken und der Berührungspunkte auf den Gegenseiten harmonische Strahlen.



108. In jedem einem Kreise eingeschriebenen Dreiecke werden die Seiten von den Tangenten durch die Gegenecken in drei Punkten einer Geraden geschnitten.




Fig. 45.

Es sei  $ABC$  ein eingeschriebenes Dreieck; die Tangenten  $abc$  in den Ecken  $ABC$  schneiden die Gegenseiten in  $MNP$ . Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Punkte  $M$  ein Punkt  $\mathfrak{M}$  von  $g_\infty$  verwandt ist. In dem verwandten Dreiecke  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  ist aus Symmetriegründen  $\mathfrak{M}\mathfrak{P} \parallel \mathfrak{B}\mathfrak{C}$ .

Anmerkung. Die Sätze 105, 106, 108 kann man aus dem Pascalschen Satze auch dadurch ableiten, daß man eine oder zwei oder drei

Seiten eines Kreissechsecks unendlich klein werden läßt.

109. Gegeben sind zwei konjugierte Punktpaare  $AA_1$  und  $BB_1$ , man soll zeigen, daß die Schnittpunkte  $CC_1$  von  $AB$  und  $A_1B_1$  sowie  $AB_1$  und  $BA_1$  auch konjugierte Punkte sind.




Fig. 46.

I. Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Kreis sich selbst und dem Punkte  $A$  der Mittelpunkt  $\mathfrak{A}$  verwandt ist, dann ist dem Punkte  $A_1$  ein Punkt  $\mathfrak{A}_1$  im Unendlichen verwandt. Sind  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  die den Punkten  $BB_1CC_1$  verwandten Punkte, so ist  $\mathfrak{C}\mathfrak{B}_1 \parallel$

$\mathfrak{C}_1\mathfrak{B} \parallel \mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ , also wenn  $\mathfrak{B}_1\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{E}$  senkrecht auf  $\mathfrak{A}\mathfrak{C}$  sind,

$$\mathfrak{C}\mathfrak{D} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{D}\mathfrak{B}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}\mathfrak{C} : \mathfrak{A}\mathfrak{B}$$

und

$$\mathfrak{A}\mathfrak{C} - \mathfrak{C}\mathfrak{D} : \mathfrak{A}\mathfrak{B} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{A}\mathfrak{C} : \mathfrak{A}\mathfrak{B}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D} : \mathfrak{A}\mathfrak{C} =$$

also

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{A}\mathfrak{C}.$$



Weil aber  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  konjugierte Punkte sind, so sind  $\mathfrak{B}\mathfrak{D}$  harmonische Pole, also  $\mathfrak{A}\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{A}\mathfrak{B} = r^2$  und folglich sind auch  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}$  harmonische Pole und  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  konjugierte Punkte, mithin auch  $CC_1$ .

II. Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft




Fig. 47.

her, daßs der Geraden  $A_1B_1$ , falls sie den Kreis nicht schneidet, die unendlich ferne Gerade und der Kreis  $O$  sich selbst verwandt ist. Sind wieder  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  die verwandten Punkte, so ist  $\mathfrak{A}M \perp \mathfrak{A}_1M$ ,  $\mathfrak{B}M \perp \mathfrak{B}_1M$ ,  $\mathfrak{C}$  im Unendlichen,  $M$  der Höhenpunkt des Dreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}_1$ , weil  $\mathfrak{A}M \perp \mathfrak{B}\mathfrak{C}_1$ ,  $\mathfrak{B}M \perp \mathfrak{A}\mathfrak{C}_1$ , also  $\mathfrak{C}_1M \perp \mathfrak{A}\mathfrak{B}$ , daher  $\mathfrak{C}_1M$  die Polare von  $\mathfrak{C}_\infty$  und

$\mathfrak{C}_\infty\mathfrak{C}_1$  sind konjugierte Punkte, mithin auch  $CC_1$ .

110. Wenn  $aa_1$  und  $bb_1$  konjugierte Strahlenpaare sind, so sind die Verbindungslinien der Schnittpunkte  $(ab)$  und  $(a_1b_1)$ , sowie  $(ab_1)$  und  $(a_1b)$  auch konjugierte Strahlen.

Durch harmonische Verwandtschaft wie in 109. oder durch Polarisation. Cf. § 10.




Fig. 47 a.

111. Verbindet man die Ecken  $ABC$  eines Dreiecks mit



den Polen ihrer Gegenseiten, so treffen sich die Verbindungslinien in einem Punkte. (Fig. 47a.)

Sind  $A_1 B_1 C_1$  die Pole von  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$ , so sind  $AA_1$  und  $BB_1$  konjugierte Punkte, also auch die Schnittpunkte  $D$  und  $D_1^*)$ , von  $AA_1$  und  $BB_1$ ,  $AB$  und  $A_1 B_1$ . Die Polare von  $D_1$  muß daher sowohl durch  $C_1$  als durch  $C$ , als auch durch  $D$  gehen, mithin liegen  $CC_1 D$  in einer Geraden und die Verbindungslinien  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  schneiden sich in dem Punkte  $D$ .

## § 9.

### Die harmonische Abbildung.

112. Man wähle einen festen Punkt  $O$  als Centrum und eine feste Gerade  $o$  als Axe. Zieht man durch  $O$  eine Gerade  $g$ , welche die Axe in  $\mathfrak{A}$  schneidet, nimmt auf  $g$  beliebig den Punkt  $A$  und macht  $A\mathfrak{A}O\mathfrak{A}_1$  harmonisch, so daß  $O$  und  $A_1$  zugeordnete Punkte sind, so nennt man  $A_1$  das Bild von  $A$ . Verbindet man die Punkte  $AOA_1$  mit einem Punkte  $S$  von  $o$ , so sind  $S(A\mathfrak{A}OA_1)$  harmonische Strahlen.




Fig. 48.

Wenn demnach der Punkt  $A$  den Strahl  $SA$  oder  $a$  durchläuft, so muß das Bild  $A_1$  den Strahl  $SA_1$  oder  $a_1$  durchlaufen; man nennt  $a_1$  das Bild von  $a$ . Der Punkt  $S$  und

überhaupt jeder Punkt der Axe ist sein eigenes Bild. — Nimmt  $a$  irgend eine andere Lage  $a'$  durch  $A$  an, so muß ihr Bild  $a'_1$  sich mit  $a'$  auf der Axe in  $S'$  treffen.

Aus dieser Betrachtung folgt (cf. 79a—f.):

a. Ein Punkt und sein Bild liegen mit dem Centrum in einer Geraden; dieses ist sein eigenes Bild.

b. Eine Gerade und ihr Bild schneiden sich auf der Axe; diese ist ihr eigenes Bild.

c. Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so durchläuft sein Bild das Bild der Geraden.

\*)  $D_1$  ist in der Figur an unrichtiger Stelle; er ist der Schnittpunkt  $(AB, A_1 B_1)$ .



d. Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so dreht sich ihr Bild um das Bild des Punktes.

e. Die Bilder von harmonischen Punkten und Strahlen sind auch harmonisch.

f. Die Bilder von involutorischen Punkten und Strahlen sind auch involutorisch.

113. Man kann einen Punkt  $A$  auch harmonisch abbilden, indem man  $A_1'$  so konstruiert, daß  $AO\mathfrak{A}A_1'$  harmonische Punkte und  $\mathfrak{A}A_1'$  zugeordnet sind.

Diese Art der Abbildung kann man die *axiale*, die erste die *centrale* nennen. Die für die letztere abgeleiteten Sätze (112 a—f) gelten auch für die andere.

114. a. Wenn bei einer centralen Abbildung  $g_\infty$  das Bild von  $g$  ist, so liegt  $O$  in der Mitte zwischen  $g$  und  $o$ ; das Bild von  $g_\infty$  liegt so, daß  $o$  zwischen ihm und  $O$  die Mittelsenkrechte ist.

a'. Bei der axialen Abbildung muß  $o$  die Mittelsenkrechte von  $O$  und  $g$  sein, damit  $g_\infty$  das Bild von  $g$  ist; das Bild von  $g_\infty$  liegt in Bezug auf  $O$  symmetrisch zu  $o$ .

b. Wählt man bei der centralen Abbildung den Mittelpunkt  $M$  eines Kreises als Centrum der Abbildung und  $g_\infty$  als Axe, so ist das Bild von  $M$  ein konzentrischer Kreis mit doppelt so großem Radius.

b'. Wählt man bei der axialen Abbildung den Kreismittelpunkt  $M$  als Centrum und  $g_\infty$  als Axe, so ist das Bild des Kreises  $M$  ein konzentrischer Kreis mit halb so großem Radius.




Fig. 49.

115. Wenn die Radien zweier Kreise im Verhältnisse 1 : 2 Fig. 49. stehen, so ist jeder Kreis das harmonische Bild des anderen und



*zwar der grössere das central-harmonische des kleineren und dieser das axial-harmonische des grösseren. Centrum und Axe sind der innere Ähnlichkeitspunkt und die Potenzlinie.*

Wenn die Radien der Kreise  $M$  und  $M_1$  sich wie  $1:2$  verhalten und  $O$  der innere Ähnlichkeitspunkt ist, so ist auch auf der gemeinschaftlichen Tangente  $OA:OA_1 = 1:2$ . Die Potenzlinie  $o$  halbiert diese Tangente  $AA_1$  in  $Q$ , also ist  $QO = \frac{1}{6} AA_1$  und  $AO:OQ = AA_1:A_1Q = 2:1$ .

Zieht man durch  $O$  eine beliebige Gerade, welche die Kreise in  $BC$  und  $B_1C_1$  trifft, dann müssen  $AB$  und  $A_1B_1$  sowohl, wie  $AC$  und  $A_1C_1$  sich auf der Potenzlinie  $o$  in  $D$  und  $E$  treffen. Da nun  $AQOA_1$  harmonische Punkte sind, so sind  $D(AQOA_1)$  harmonische Strahlen und deshalb  $BROB_1$ \*) und  $CROC_1$  harmonische Punkte.

Wenn die Kreise  $M_1$  und  $M$  sich schneiden, so trifft die Senkrechte in  $O$  auf  $MM_1$  die Kreise in solchen Punkten  $A$




Fig. 50.

und  $A_1$ , dass  $OA = AA_1$ . Deshalb sind  $D(OA_1AE)$  und  $OB_1BR$  und ebenso  $OC_1CR$  harmonisch.

Anmerkung. Auch die harmonische Abbildung gestattet die Ableitung der im vorigen Paragraphen bewiesenen Sätze.

## § 10.

### Die Polarisation.

116. Wenn man jedem Punkte  $A$  in der Ebene eines Kreises  $K$  seine Polare  $a$  und jeder Geraden  $a$  ihren Pol  $A$  zuordnet, so sind dadurch die Punkte der Ebene zu den Ge-

\*)  $R$  ist der Schnittpunkt von  $BC$  mit  $DE$ .



raden in eine verwandtschaftliche Beziehung gebracht. Diese Verwandtschaft heisst *Reciprocität*. Allen Punkten einer Geraden sind alle Strahlen durch ihren Pol reciprok verwandt und umgekehrt. Eine Figur *polarisieren* heisst die ihr reciprok verwandte Figur, d. h. zu jedem Punkte oder jeder Geraden der ersteren die Polare oder den Pol konstruieren. Durch diese Verwandtschaft wird ein allgemeines Prinzip der Geometrie, das *Prinzip der Dualität* begründet. Betrachtet man irgend ein geometrisches Gebilde als Punktgebilde, also entstanden durch Bewegung eines Punktes, so steht ihm *dual* gegenüber das reciproke, entstanden durch die Bewegung einer Geraden. Mittelst des vorher abgeleiteten Prinzips der Dualität folgen aus den Eigenschaften einer Figur sofort diejenigen der dualen Figur.

117. *Die Polaren einer involutorischen Punktreihe bilden ein involutorisches Strahlenbüschel.*

Ist  $AA_1BB_1 \dots$  eine involutorische Reihe,  $M$  der Kreismittelpunkt, so ist  $M(AA_1BB_1 \dots)$  ein involutorisches Büschel. Diesem kongruent, also auch involutorisch ist das Büschel der Polaren von  $AA_1BB_1 \dots$ .

118. *Zieht man durch einen Punkt  $P$  die Tangenten an einen Kreis und die Geraden nach den Ecken eines umgeschriebenen Vierseits, so sind diese sechs Geraden in Involution.*

Es seien  $ABCD$  die Ecken des Tangentenvierseits,  $PE$  und  $PF$  zwei Tangenten,  $pabcdef$  die Polaren von  $PAB CDEF$ . Die Schnittpunkte  $p(abcdef)$  sind die Pole von  $P(AB CDEF)$  und da jene nach 98 in Involution sind, so sind es auch diese.

119. *Diejenigen Punkte, welche eine Gerade  $p$  von den Tangenten eines Kreises und von den Gegenecken eines umgeschriebenen Kreisvierseits harmonisch trennen, liegen auf einer konjugierten Geraden.*

Es seien  $A$  und  $B$ ,  $C$  und  $D$  die Gegenecken des umgeschriebenen Vierseits,  $E$  und  $F$  die Schnittpunkte von  $AC$  und  $BD$  mit  $p$ ,  $Pabcdef$  Pol und Polaren von  $pAB CDEF$ , so treffen sich nach 99. die Geraden, welche  $P$  von den Gegenseitenpaaren  $ac$  und  $bd$  harmonisch trennen, in einem zu  $P$  konjugierten Punkte, also müssen die Punkte, welche  $p$  von



$AC$  und  $BD$  harmonisch trennen, auf einer zu  $p$  konjugierten Geraden liegen.

120. *Durchlaufen drei Ecken eines Vierecks drei feste Gerade, die durch einen Punkt gehen, und bewegen sich seine Seiten als Tangenten eines Kreises, so durchläuft die vierte Ecke eine vierte Gerade, die durch denselben Punkt geht.*

Folgt aus 118 und 119.

121. *Der Satz von Brianchon.*

*In jedem einem Kreise umgeschriebenen Sechseck schneiden sich die Verbindungslinien der Gegenecken in einem Punkte.*

I. Beweis. Das Sechseck sei  $abcdef$ ; man zerlege es in die Vierseite  $abcd$  und  $efad$ . Die Ecken  $(ab)$  und  $(de)$ ,  $(bc)$  und  $(ef)$ ,  $(ad)$  und  $(ad)$  liegen auf drei Geraden  $mng$ , die sich in einem Punkte schneiden, also müssen nach 120. die die Ecken  $(cd)$  und  $(af)$  auch auf einer Geraden liegen, die durch denselben Punkt geht.

II. Beweis. Das Sechseck sei  $abcdef$ ; die sechs Berührungspunkte seien  $ABCDEF$ . In dem von letzteren gebildeten Sechseck liegen die Schnittpunkte

$$(AB, DE), (BC, EF), (CD, FA)$$

nach dem Pascalschen Satze auf einer Geraden, also müssen ihre Polaren

$$(ab, de), (bc, ef), (cd, fa)$$

sich in einem Punkte treffen.

---



## Zweiter Abschnitt.

## Die Kegelschnitte.

§ 11.

### Der Kegelschnitt als harmonische Kurve des Kreises.

122. In jeder harmonischen Verwandtschaft, deren Centrum der Mittelpunkt eines Kreises ist, ist diesem Kreise eine krumme Linie verwandt, deren sämtliche Punkte vom Centrum und von




Fig. 51.

der Mittellinie der Verwandtschaft ein konstantes Abstands-  
verhältniss haben.




Fig. 52.



Diese krumme Linie heisst ein *Kegelschnitt*.

Es sei der Mittelpunkt  $B$  eines Kreises das Centrum und eine beliebige Gerade  $m$  die Axe,  $l$  die Mittellinie der Verwandtschaft;




Fig. 53.

$BD \perp m$ . Aus irgend zwei verwandten Punkten  $E$  und  $E_1$  seien  $EF$  und  $E_1F_1$  senkrecht auf  $m$  gefällt, ferner  $BJ$  und  $E_1H$  senkrecht auf  $BD$ . Da  $EE_1BG$  harmonische Punkte sind, so ist

$$E_1G : E_1B = EG : EB$$

oder

$$E_1F_1 : E_1B = EF : EB$$

$$HD : E_1B = FJ - EJ : EB.$$

Aber  $HD = HC \pm CD = HC \pm BC = BH \pm 2BC$ ,

also  $BH \pm 2BC : E_1B = FJ - EJ : EB$

und  $\frac{BH}{BE_1} \pm \frac{2BC}{BE_1} = \frac{FJ}{BE} - \frac{EJ}{BE}.$

Weil

$$\frac{BH}{BE_1} = \frac{EJ}{BE},$$

so wird

$$\frac{2BH \pm 2BC}{BE_1} = \frac{2CH}{BE_1} = \frac{FJ}{BE}$$

und

$$\frac{LE_1}{BE_1} = \frac{BC}{BE}.$$

Die Abstände des Punktes  $E_1$  vom Centrum  $B$  der Verwandtschaft und von der Mittellinie  $l$  haben also das konstante Verhältniss  $BE : BC = \mu$ .

123. Wenn  $E$  den Kreis durchläuft, so bewegt sich  $E_1$  auf einer krummen Linie, der harmonischen Kurve des Kreises. Man nennt diese *Kegelschnitt*; der Punkt  $B$  heisst ein *Brennpunkt* des Kegelschnittes und die Mittellinie  $l$  der Verwandtschaft eine *Leitlinie* desselben.



Auf der Senkrechten  $BC$  giebt es zwei Punkte des Kegelschnittes, nämlich diejenigen Punkte  $A$  und  $A_1$ , welche  $BC$  im Verhältnisse  $\mu$  harmonisch teilen. Die Gerade  $AA_1$  heisst die *Hauptaxe* des Kegelschnittes, man bezeichnet sie mit  $2a$ . Ihre Endpunkte heissen die *Scheitel* des Kegelschnittes. Die zur Hauptaxe senkrechte Brennpunktssehne heisst der *Parameter* ( $2p$ ) des Kegelschnittes und der über ihm als Durchmesser beschriebene Kreis der *Parameterkreis*. Also gilt:

*Der Kegelschnitt und sein Parameterkreis sind harmonische Kurven.*

#### 124. Die drei Arten der Kegelschnitte.

Der Leitlinie  $l$  ist die unendlich ferne Gerade verwandt; erstere kann mit dem Parameterkreise keinen oder einen oder zwei Punkte gemein haben. Deshalb hat auch ein Kegelschnitt mit der unendlich fernen Geraden keinen oder einen oder zwei Punkte gemein. Im ersten Falle verläuft der Kegelschnitt ganz im Endlichen und heisst *Ellipse* (Fig. 51); im zweiten hat er die unendlich ferne Gerade als Tangente und heisst *Parabel* (Fig. 52); im dritten hat er zwei unendlich ferne Punkte und heisst *Hyperbel* (Fig. 53).

Bei der Ellipse ist das Abstandsverhältnis  $\mu = \frac{p}{BC} < 1$ , bei der Parabel ist  $p = BC$ , also  $\mu = 1$ , bei der Hyperbel ist  $p > BC$ , also  $\mu > 1$ . Demnach folgt:

*Der Kegelschnitt ist Ellipse, Parabel, Hyperbel, je nachdem das Abstandsverhältnis kleiner, gleich oder grösser als die Einheit ist.*

125. Weil die Punkte des Kreises stetig auf einander folgen, so ist dies auch mit den verwandten Punkten des Kegelschnittes der Fall. Der Zusammenhang findet allerdings bei Parabel und Hyperbel im Unendlichen statt.

Der Punkt  $A$  bewege sich (Fig. 53) in dem durch die Pfeile angedeuteten Sinne nach  $N$  hin; er durchläuft dann die Hyperbel und gelangt durchs Unendliche hindurch über  $N_1$ ,  $A_1$ ,  $O_1$  und nochmals durchs Unendliche hindurch über  $O$  zurück nach  $A$ .

Wenn bei der Parabel (Fig. 52) der Punkt  $A$  sich in dem durch die Pfeile angedeuteten Sinne nach  $E_1$  hin bewegt,



so gelangt er durchs Unendliche hindurch über  $N$  nach  $A$  zurück.

Bei allen drei Arten von Kegelschnitten gelangt also ein Punkt, der stets in demselben Sinne sich bewegt, wieder zum Ausgangspunkte zurück und umschließt durch seinen Weg einen Teil der Ebene. Man nennt denselben das *innere Gebiet* des Kegelschnittes, den anderen das *äußere Gebiet*, ganz wie beim Kreise.

Eine Gerade hat mit einem Kreise zwei Punkte oder einen Punkt (eigentlich zwei zusammenfallende Punkte) gemein oder sie trifft ihn gar nicht. Die verwandte Gerade hat also mit dem Kegelschnitte auch entweder zwei Punkte gemein oder einen Punkt oder sie schneidet ihn nicht. Daraus folgt:

a. *Ein Kegelschnitt wird von einer Geraden höchstens in zwei Punkten getroffen.*

Wegen dieser Eigenschaft erhält derselbe den Namen „*Kurve II. Ordnung*“.

Jede Gerade, die den Kreis in einem Punkte (oder zwei zusammenfallenden Punkten) trifft, heißt eine Tangente desselben; die verwandte Gerade trifft den Kegelschnitt auch in einem Punkte (oder zwei zusammenfallenden Punkten) und heißt gleichfalls eine *Tangente des Kegelschnittes*.

Der Unterschied zwischen dem inneren und äußeren Gebiete des Kegelschnittes besteht also darin, daß sich von keinem Punkte des ersteren eine Tangente an denselben ziehen läßt, daß sich ferner in jedem Punkte des äußeren Gebietes zwei Kegelschnittstangenten schneiden und daß endlich durch jeden Punkt des Kegelschnittes nur eine Tangente (eigentlich zwei zusammenfallende Tangenten) geht. Als zweite Haupteigenschaft folgt:

b. *An einen Kegelschnitt lassen sich von einem Punkte höchstens zwei Tangenten ziehen.*

c. *Die unendlich ferne Gerade ist eine Tangente der Parabel.*

Denn die verwandte Leitlinie berührt den Parameterkreis. Im Hyperbelfalle trifft die Leitlinie den Parameterkreis in zwei Punkten  $U$  und  $V$ , denen die unendlich fernen Punkte der Hyperbel  $U_\infty$  und  $V_\infty$  verwandt sind. Die Tangenten in den ersteren schneiden sich in einem Punkte  $P$  des Durch-



messers, welcher durch  $P$  und die Gerade  $UV$  harmonisch getheilt wird. Dem Durchmesser ist die Hauptaxe  $AA_1$  verwandt, den Tangenten in  $U$  und  $V$  sind die Tangenten in  $U_\infty$  und  $V_\infty$ , welche man die *Asymptoten* der Hyperbel nennt, und dem Punkte  $P$  ist ein Punkt  $M$  verwandt. Da  $M$  und die unendlich ferne Gerade  $U_\infty V_\infty$  die Axe  $AA_1$  auch harmonisch teilen müssen, so ist  $AM = A_1M$ :

d. Die *Asymptoten* der Hyperbel schneiden sich in der Mitte der Hauptaxe.

Sie sind den Geraden  $BU$  und  $BV$  parallel.

c. Die Hyperbel heißt *gleichseitig*, wenn die Asymptoten einen rechten Winkel bilden.

126. Der geometrische Ort eines Punktes, dessen Abstände von einem festen Punkte  $B$  und einer festen Geraden  $l$  ein konstantes Verhältniß  $\mu$  haben, ist ein Kegelschnitt mit dem Brennpunkte  $B$  und der Leitlinie  $l$ . (Fig. 51, 52, 53).

Ist  $E_1$  ein Punkt des Ortes, also  $BE_1 : LE_1 = \mu$  konstant, so mache man  $BC \perp l$ ,  $CD = CB$ ,  $m \perp BD$ ,  $BGE_1E$  harmonisch, dann ist

$$E_1G : E_1B = EG : EB$$

$$E_1F_1 : E_1B = EF : EB$$

$$HB \pm 2BC : E_1B = FJ \pm EJ : EB$$

$$\frac{HB}{E_1B} \pm \frac{2BC}{E_1B} = \frac{FJ}{EB} \pm \frac{EJ}{EB}.$$

Es ist

$$\frac{BH}{BE_1} = \frac{EJ}{EB},$$

$$\text{also } \frac{2BH \pm 2BC}{BE_1} = \frac{2CH}{BE_1} = \frac{FJ}{BE} \text{ und da } FJ = 2BC \text{ ist,}$$

$$\frac{LE_1}{BE_1} = \frac{BC}{BE}.$$

Das Verhältniß  $\frac{LE_1}{BE_1}$  ist konstant gleich  $\frac{1}{\mu}$ , ebenso  $BC$ , also auch  $BE$ . Daraus folgt, daß der Ort von  $E_1$  die harmonische Kurve eines Kreises mit dem Radius

$$BE = \mu \cdot BC$$

um den Punkt  $B$ , also ein Kegelschnitt ist.



## § 12.

## Pol und Polare beim Kegelschnitte.

128. *Alle Punkte, welche einen festen Punkt von einem Kegelschnitte harmonisch trennen, liegen auf einer Geraden.* (14, 79e, 122.)

Diese heisst die *Polare* des Punktes und der Punkt heisst ihr *Pol*.

*Folgerungen.* a. *Die Polare eines ausserhalb des Kegelschnittes gelegenen Punktes ist seine Berührungssehne.* (14a, 122, 125.)

b. *Die Polare eines Kegelschnittpunktes ist seine Tangente.* 14b.

129. Der Pol der unendlich fernen Geraden heisst der „*Mittelpunkt*“ des Kegelschnittes, denn er halbiert jede durch ihn gelegte Sehne (4b); jede Sehne durch den Mittelpunkt heisst ein *Durchmesser*. Der Mittelpunkt muß auf der Hauptaxe liegen, weil diese eine Symmetrieaxe ist. Daraus aber folgt, daß die im Mittelpunkte zur Hauptaxe errichtete Senkrechte auch eine Symmetrieaxe ist; sie heisst die *Nebenaxe*. Weiter folgt wegen der symmetrischen Lage des Kegelschnittes zu den beiden Axen, daß derselbe einen *zweiten Brennpunkt* und eine *zweite Leitlinie* haben muß, welche in Bezug auf den Mittelpunkt symmetrisch zu  $B$  und  $l$  liegen und deren Abstände von einem Punkte des Kegelschnittes dasselbe konstante Verhältniß haben, wie seine Abstände von  $B$  und  $l$ .

Da die Parabel die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$  berührt, so hat sie keinen eigentlichen Mittelpunkt; als solchen hat man den Berührungspunkt auf  $g_\infty$  anzusehen, da er der Pol von  $g_\infty$  ist. *Deshalb sind alle Parabeldurchmesser einander und der Hauptaxe parallel; die Nebenaxe der Parabel ist  $g_\infty$ .*

130. *Brennpunkt und Leitlinie sind Pol und Polare, denn  $g_\infty$  ist die Polare des Kreismittelpunktes  $B$  und Leitlinie und  $g_\infty$  in d verwandte Gerade.*

131. *Die Gerade, welche zwei Diagonalepunkte eines dem Kegelschnitte eingeschriebenen Vierecks verbindet, ist die Polare des dritten.* (15.)

132. *Wenn ein Punkt eine Gerade durchläuft, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden.* (16.)



133. *Irgend zwei Tangenten eines Kegelschnittes werden durch einen Strahl ihres Schnittpunktes und dessen Pol harmonisch getrennt.* (17.)

134. *Der Schnittpunkt zweier Diagonalen eines umgeschriebenen Vierseits ist der Pol der dritten.* (18.)

135. *Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so durchläuft ihr Pol die Polare des Punktes.* (19.)

136. *Die Polaren von vier harmonischen Punkten sind harmonische Strahlen und die Pole von vier harmonischen Strahlen sind harmonische Punkte.* (20.)

137. *Die Polaren der Punkte einer involutorischen Reihe bilden ein involutorisches Büschel und die Pole der Strahlen eines involutorischen Büschels bilden eine involutorische Reihe. Beweis wie in 20.*

138. *In jedem einem Kegelschnitte eingeschriebenen Vierecke schneiden sich die Gegenseiten und die Tangenten in den Gegenecken in vier harmonischen Punkten.* (21.)

139. *In jedem einem Kegelschnitte umgeschriebenen Vierseite sind die Verbindungslinien der Gegenecken und der Berührungspunkte auf den Gegenseiten vier harmonische Strahlen.* (22.)

### § 13.

#### Konjugierte Punkte und Strahlen.

140. *Zwei Punkte, von denen jeder auf der Polare des anderen liegt (16), heißen konjugierte Punkte in Bezug auf den Kegelschnitt, zwei Strahlen, von denen jeder durch den Pol des anderen geht (19), heißen konjugierte Strahlen.*

Einem Punkte sind daher alle Punkte seiner Polare und dem Mittelpunkte alle unendlich fernen Punkte konjugiert; einer Geraden sind alle Strahlen durch ihren Pol und der unendlich fernen Geraden alle Durchmesser konjugiert.

Ist  $p$  die Polare eines Punktes  $P$ ,  $Q$  einer ihrer Punkte, so muß dessen Polare  $q$  durch  $P$  gehen und  $p$  in einem zu  $Q$  konjugierten Punkte  $R$  treffen. Da  $Q$  und  $R$  auch zu  $P$  konjugiert sind, so bilden  $PQR$  ein *Tripel konjugierter Punkte* oder ein *Poldreieck*.

*Eine Seite des Poldreiecks ist die Polare der gegenüber-*



liegenden Ecke und deshalb ist jede Seite des Poldreiecks jeder anderen Seite konjugiert.

Zu einem Punkte  $P$  einer Geraden  $g$  giebt es auf derselben nur einen konjugierten Punkt  $P_1$ , nämlich den Schnittpunkt von  $g$  mit der Polare von  $P$ ; zu einem Strahle  $p$  durch einen Punkt  $Q$  giebt es durch denselben nur einen konjugierten Strahl  $p_1$ , nämlich die Gerade, welche den Pol von  $p$  mit  $Q$  verbindet; zu jedem Durchmesser giebt es einen konjugierten Durchmesser; Haupt- und Nebenaxe bilden ein Paar konjugierter Durchmesser.'

141. *Alle Paare von konjugierten Punkten einer Geraden oder von konjugierten Strahlen eines Punktes, insbesondere alle Paare konjugierter Durchmesser, bilden eine Involution. (36 a, 137, 79). Das senkrechte Strahlenpaar der letzteren wird von den beiden Axen gebildet. Die Involution konjugierter Durchmesser hat nur bei der Hyperbel reelle Doppelstrahlen, die beiden Asymptoten.*

142. *Die Involution konjugierter Strahlen in einem Brennpunkte besteht aus Paaren zu einander rechtwinkliger Strahlen.*

Denn bei einem Kreise stehen je zwei konjugierte Durchmesser auf einander senkrecht und jeder Strahl durch das Centrum einer harmonischen Verwandtschaft ist sich selbst verwandt.

143. *Die Involution konjugierter Strahlen in einem Punkte schneidet die Polare desselben in der Involution konjugierter Punkte.*

144. *Die Polare eines Punktes  $P$  einer Leitlinie steht in ihrem Brennpunkte auf seiner Verbindungslinie mit dem Punkte  $P$  senkrecht.*

Denn der Brennpunkt ist der Pol der Leitlinie und in ihm stehen je zwei konjugierte Strahlen auf einander senkrecht.

145. *Der Pol einer Sehne durch einen Brennpunkt liegt auf seiner Leitlinie senkrecht über dem Brennpunkte. (144)*

146. *Von zwei konjugierten Strahlen schneidet mindestens der eine den Kegelschnitt.*

Denn liegt der eine ganz außerhalb des Kegelschnittes, so liegt sein Pol innerhalb desselben, der konjugierte Strahl muß ihn also schneiden.

147. *Von einem Poldreiecke liegen stets zwei Ecken außerhalb, die dritte innerhalb des Kegelschnittes.*

Denn ist  $PQR$  ein Poldreieck und liegt  $P$  außerhalb,



so sind  $PQ$  und  $PR$  konjugierte Strahlen, von denen der eine außerhalb des Kegelschnittes liegt und der andere ihn schneidet.

148. *Von zwei konjugierten Durchmessern einer Hyperbel schneidet nur der eine dieselbe in reellen Punkten.*

Denn die Polare  $g_\infty$  des Mittelpunktes  $M$  schneidet die konjugierten Durchmesser in zwei Punkten  $P$  und  $Q$ , welche mit  $M$  ein Poldreieck bilden. Von diesen Punkten kann nach 147. nur der eine innerhalb der Hyperbel liegen.

148a. *Jeder Durchmesser halbiert die dem konjugierten Durchmesser parallelen Sehnen; die Tangenten in den Endpunkten eines Durchmessers sind dem konjugierten Durchmesser parallel. (122.)*

149. Sind  $SS_1$  irgend zwei konjugierte Punkte eines Durchmessers, so ist das Produkt  $MS \cdot MS_1$  konstant; setzt man dasselbe gleich  $\varrho^2$ , so ist  $\varrho$  die Länge des halben Durchmessers.

Wählt man  $S$  und  $S_1$  auf der Hauptaxe, so giebt die Gleichung  $MS \cdot MS_1 = a^2$  die Größe  $2a$  der Hauptaxe; liegen dagegen  $S$  und  $S_1$  auf der Nebenaxe, so findet man aus der Gleichung  $MS \cdot MS_1 = b^2$  die Größe  $2b$  der letzteren.

Liegen  $S$  und  $S_1$  auf derselben Seite von  $M$ , so schneidet die Nebenaxe den Kegelschnitt, liegen diese Punkte aber auf verschiedenen Seiten, so ist dies nicht der Fall. Ersteres findet bei der Ellipse, letzteres bei der Hyperbel statt.

150. *Zwei konzentrische Kegelschnitte, welche dieselbe Involution konjugierter Durchmesser haben, heißen „ähnlich“. Die Axen des einen verhalten sich wie diejenigen des anderen.*

Man ziehe die Halbaxen  $MA$  und  $MB$  des einen Kegelschnittes, welche den anderen in  $A_1$  und  $B_1$  treffen mögen. Halbiert man  $AB$  in  $C$ , so sind  $MC$  und der durch  $M$  zu  $AB$  parallel gezogene Durchmesser  $d$  konjugiert. Die Parallele  $p$  durch  $A_1$  zu  $AB$  und  $MC$  sind also auch konjugierte Richtungen; schneiden sich  $MC$  und  $p$  in  $C_1$ , so muß  $C_1$  der Halbierungspunkt der durch  $A_1$  gehenden Sehne und der zwischen den Axen liegenden Strecke von  $p$  sein; letztere Gerade geht also durch  $B_1$  und es ist  $AB \parallel A_1B_1$ . Daher

$$MA : MB = MA_1 : MB_1.$$

151. *Jede Gerade wird von einem Kegelschnitte und den*



*Gegenseitenpaaren eines eingeschriebenen Vierecks in den Punktpaaren einer Involution geschnitten. (98.)*

152. *Zieht man durch einen Punkt die Tangenten an einen Kegelschnitt und die Verbindungslinien nach den Gegeneckenpaaren eines umgeschriebenen Vierseits, so bilden diese Strahlenpaare eine Involution. (98 a.)*

153. *Diejenigen Geraden, welche einen Punkt  $P$  von den Punkten eines Kegelschnittes und den Gegenseitenpaaren eines ihm eingeschriebenen Vierecks harmonisch trennen, schneiden sich in einem zu  $P$  konjugierten Punkte. (99.)*

154. *Diejenigen Punkte, welche eine Gerade  $p$  von den Tangenten eines Kegelschnittes und den Gegenecken eines umgeschriebenen Vierseits harmonisch trennen, liegen auf einer konjugierten Geraden. (119.)*

155. *Ist ein Dreieck  $ABC$  einem Kegelschnitte  $K$  eingeschrieben, so schneidet jede Gerade  $g$ , welche der einen Seite  $AB$  konjugiert ist, die beiden anderen in konjugierten Punkten. Und wenn umgekehrt eine Gerade von zwei Seiten eines eingeschriebenen Dreiecks in konjugierten Punkten geschnitten wird, so ist sie der dritten konjugiert.*

Man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und der  $g$  die  $g_\infty$  verwandt ist; dann muß die verwandte Gerade  $\mathfrak{AB}$  von  $AB$  ein Durchmesser von  $\mathfrak{K}$  sein;  $\mathfrak{AC}$  und  $\mathfrak{BC}$  stehen aufeinander senkrecht und treffen  $g_\infty$  daher in zwei konjugierten Punkten.

156. *Ist ein Dreieck  $UVW$  einem Kegelschnitte umgeschrieben, so wird jeder Punkt, welcher der Ecke  $W$  konjugiert ist, aus  $U$  und  $V$  durch konjugierte Strahlen projiziert. Und wenn umgekehrt ein Punkt aus  $U$  und  $V$  durch konjugierte Strahlen projiziert wird, so ist er der Ecke  $W$  konjugiert.*

I. Der konjugierte Punkt  $W_1$  zu  $W$  liege innerhalb des Kegelschnittes  $K$ . Man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und dem Punkte  $W_1$  der Mittelpunkt  $\mathfrak{W}_1$  desselben verwandt ist. Von den verwandten Ecken  $\mathfrak{UVW}$  liegt  $\mathfrak{W}$  im Unendlichen,  $\mathfrak{UV}$  und  $\mathfrak{VW}$  sind parallel und daher ist  $\sphericalangle \mathfrak{UW}_1\mathfrak{V} = 90^\circ$ ;  $\mathfrak{UW}_1$  und  $\mathfrak{VW}_1$  sind also konjugiert.

II. Der konjugierte Punkt  $W_1$  liege außerhalb. Man



stelle die harmonische Verwandtschaft so her, daß der Geraden  $UW_1$  die  $g_\infty$  verwandt ist. Da also die Tangenten durch  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{B}_1$  parallel sind, so sind die Polaren senkrecht zu einander,  $\mathfrak{R}\mathfrak{B}_1$  geht durch den Mittelpunkt des Kreises und ist zu  $g_\infty$  konjugiert.

157. *Die Sätze von Pascal und Brianchon.*

a. *In jedem einem Kegelschnitte eingeschriebenen Sechsecke liegen die Schnittpunkte der Gegenseiten in einer Geraden. (101. 104.)*

b. *In jedem einem Kegelschnitte umgeschriebenen Sechsecke schneiden sich die Verbindungslinien der Gegenecken in einem Punkte. (121.)*

c. Die in 105 bis 111 vom Kreise aufgestellten Sätze behalten ihre Giltigkeit auch für den Kegelschnitt.

## § 14.

**Bestimmung der Kegelschnitte durch Punkte und Tangenten.**

158. *Fünf Punkte eines Kegelschnittes bestimmen alle übrigen.*

I. Es seien  $ABCDE$  fünf Punkte eines Kegelschnittes  $K$ ; man konstruiert die Polare  $p$  des Schnittpunktes  $P$  von  $AB$  und  $CD$ , indem man die Durchschnitte  $R$  von  $AC$  und  $BD$  und  $Q$  von  $AD$  und  $BC$  mit einander verbindet (128, 131). Zieht man  $PE$  und bestimmt darauf den Punkt  $F$ , welcher  $P$  und  $p$  von  $E$  harmonisch trennt, so ist auch  $F$  ein Punkt von  $K$  (128). In  $S$  und  $T$  auf  $p$  schneiden sich die Verbindungslinien von  $CDEF$ . Die Punkte  $MN$ , welche  $QR$  und  $ST$  harmonisch teilen, sind auch Punkte von  $K$ . Ist nun  $XY$  ein Punktpaar, welches  $MN$  harmonisch teilt, so müssen sich (128)  $AX$  und  $BY$ ,  $BX$  und  $AY$  in zwei Punkten  $U$  und  $V$  von  $K$  treffen und wenn  $X$  und  $Y$  die Polare  $p$  durchlaufen, so durchlaufen  $U$  und  $V$  den Kegelschnitt  $K$ .




Fig. 54.






Fig. 55.

II. Durch  $A$  ziehe man eine beliebige Gerade  $x$ , bestimme die Schnittpunkte  $M$  von  $AB$  und  $DE$ ,  $P$  von  $CD$  und  $x$ ,  $N$  von  $BC$  und  $MP$ , so ist der Schnittpunkt  $F$  von  $EN$  und  $x$  ein Punkt des Kegelschnittes (157a). Wenn  $x$  sich um  $A$  dreht, so durchläuft  $F$  den Kegelschnitt.

159. Fünf Tangenten eines Kegelschnittes  $K$  bestimmen alle übrigen.

I. Es seien  $abcde$  fünf Tangenten eines Kegelschnittes  $K$ ; Man konstruiert den Pol  $P$  der Verbindungslinie  $p$  von  $ab$  und  $cd$ , indem man die Verbindungslinien  $r$  von  $ac$  und  $bd$  und  $q$  von  $ad$  und  $bc$  zum Durchschnitte bringt, (134). Zieht man durch den Punkt  $pe$  diejenige Gerade  $f$ , welche  $p$  und  $P$  harmonisch von  $e$  trennt, so ist auch  $f$  eine Tangente von  $K$ ; (134). Auf den durch  $P$  gehenden Geraden  $s$  und  $t$  schneiden sich die Tangenten  $cdef$ . Die Strahlen  $m$  und  $n$ , welche  $qr$  und  $st$  harmonisch trennen, sind auch Tangenten von  $K$ , denn  $qr$  und  $st$  sind Strahlenpaare der dem Punkte  $P$  zugehörigen Involution konjugierter Strahlen. Ist nun  $xy$  ein Strahlenpaar, welches  $mn$  harmonisch trennt, so müssen die Verbindungslinien  $ax$  und  $by$ ,  $ay$  und  $bx$  zwei Tangenten  $u$  und  $v$  von  $K$  sein.

Wenn das Strahlenpaar  $xy$  sich um  $P$  dreht, so wälzen sich  $u$  und  $v$  auf  $K$ .

II. Auf  $a$  nehme man einen beliebigen Punkt  $X$ , konstruiere die Verbindungslinie  $m$  von  $ab$  und  $de$ ,  $p$  von  $cd$  und  $X$ ,  $n$  von  $bc$  und  $mp$ , so ist die Verbindungslinie  $f$  von  $en$  und  $X$  eine Tangente des Kegelschnittes (157b). Wenn  $X$  die Tangente  $a$  durchläuft, so wälzt sich  $f$  auf  $K$ .




Fig. 56.

III. Man konstruiere die Pole  $ABCDE$  von  $abcde$ ; diese sind die Berührungspunkte und also fünf Punkte von  $K$ . Nach 158 findet man alle übrigen.



160. *Vier Punkte eines Kegelschnittes und die Tangente in einem von ihnen bestimmen alle übrigen Punkte.*

I. Von dem Kegelschnitte  $K$  kennt man die Punkte  $ABCD$  und die Tangente  $a$  in  $A$ . Man konstruiere den




Fig. 57.

Durchschnitt  $P$  von  $a$  und  $BC$ , mache  $BCPP_1$  harmonisch, so ist  $AP_1$  die Polare  $p$  von  $P$ , schneide  $p$  mit  $BD$  in  $R$  und mit  $CD$  in  $Q$ , dann müssen sich  $CR$ ,  $BQ$ ,  $PD$  in einem Punkte  $E$  von  $K$  treffen. Endlich mache man  $QRAM$  harmonisch und kann nun alle Punkte von  $K$  auf die 158. gezeigte Art konstruieren.

II. Gegeben sind von  $K$  die fünf Punkte  $ABCDE$ , von denen  $A$  und  $B$  zusammenfallen. Die Konstruktion der übrigen Punkte von  $K$  erfolgt wie in 158. II., wenn man statt  $AB$  die Tangente in  $A$  setzt.

161. *Vier Tangenten eines Kegelschnittes und der Berührungspunkt auf einer bestimmen alle übrigen Tangenten.*

Man kann entweder wie in 159. I. und II. verfahren oder die Methode der Polarisation anwenden.

162. *Drei Punkte und die Tangenten in zwei von ihnen bestimmen alle übrigen.*

I. Gegeben sind die Punkte  $ABC$  und die Tangenten  $a$  und  $b$  in  $A$  und  $B$ . Die Gerade  $AB$  oder  $p$  ist die Polare des Schnittpunktes  $P$  von  $a$  und  $b$ . Man schneide  $p$  mit  $PC$  in  $P_1$ , mache  $PP_1CD$  harmonisch so ist auch  $D$  ein Punkt von  $K$ . Die übrigen Punkte findet man wie in 158. I.

II. Gegeben sind von  $K$  die fünf Punkte  $ABCDE$ , von denen  $AB$  und  $CD$  zusammenfallen. Die Konstruktion der übrigen Punkte erfolgt wie in 158. II., wenn man statt der Sehnen  $AB$  und  $CD$  die Tangenten in  $A$  und  $C$  nimmt.

163. *Drei Tangenten und die Berührungspunkte auf zwei von ihnen bestimmen alle übrigen Punkte und Tangenten.*

Dies folgt auf eine der in 159. angegebenen Arten.



## § 15.

## Die Brennpunkte.

164. Verbindet man den Brennpunkt eines Kegelschnittes mit den Berührungspunkten zweier Tangenten und mit ihrem Schnittpunkte, so halbiert die letzte Verbindungslinie den von den beiden ersten gebildeten Winkel.

Da dieser Satz für den Kreis gilt, so muß er wegen 79 a. und b. auch für den Kegelschnitt gelten.

165. Die Geraden, welche den Berührungspunkt einer




Fig. 58.

Tangente mit den Brennpunkten verbinden, bilden mit der Tangente gleiche Winkel.




Fig. 58 a.



I. Im Punkte  $D$  eines Kegelschnittes  $K$  mit den Brennpunkten  $B$  und  $B_1$  sei eine Tangente gezogen, welche die beiden Leitlinien in  $E$  und  $E_1$  trifft. Diese Punkte sind die Pole von  $BD$  und  $B_1D$  (144) und es ist  $\sphericalangle DBE = \sphericalangle DB_1E_1 = 90^\circ$ . Zieht man noch  $FF_1$  durch  $D$  parallel zur Hauptaxe, so ist

$$DB : DF = DB_1 : DF_1,$$

also auch  $DB : DB_1 = DF : DF_1 = DE : DE_1$ ,

daher ist  $\triangle BDE \sim B_1DE_1$  und  $\sphericalangle BDE = \sphericalangle B_1DE_1$ .

II. Im Falle der Parabel fällt der zweite Brennpunkt  $B_1$  ins Unendliche, also die Gerade  $DB_1$  mit  $DF_1$  zusammen in




Fig. 59.

die Parallele zur Hauptaxe. Es wird  $DB = DF$ ,  $\triangle DBE \cong DFE$ , und  $\alpha = \gamma = \beta$ .

166. Bei einer Ellipse ist die Summe, bei einer Hyperbel die Differenz der Brennpunktsstrahlen eines ihrer Punkte gleich der Hauptaxe.

Für die Punkte  $D$  und  $A$  gelten die Proportionen

$$DB : DB_1 = DF : DF_1$$

und

$$AB : AB_1 = AC : AC_1$$

Aus ihnen folgt:

$$DB_1 \pm DB : DF_1 \pm DF = DB : DF$$

$$AB_1 \pm AB : AC_1 \pm AC = AB : AC$$



Es ist aber

$$DF_1 \pm DF = AC_1 \pm AC, DB:DF = AB:AC, AB_1 \pm AB = AA_1$$

also  $DB_1 \pm DB = AA_1$

168. Die Fußpunkte der Senkrechten, die von den Brennpunkten auf die Tangenten einer Ellipse oder Hyperbel gefällt werden, liegen auf einem Kreise um den Mittelpunkt  $M$ , welcher durch die Scheitel geht. — Scheitelkreis.

Fig. 58. 59. Man fälle  $BG \perp EE_1$  und schneide es mit  $B_1D$  in  $H$ , dann ist  $\triangle BDG \simeq HDG$ , also  $BD = HD$  und  $B_1H = AA_1$ . Ferner ist  $GM \parallel B_1H$ , also  $GM = \frac{1}{2} AA_1 = MA$ .

168. Die Fußpunkte der Senkrechten, die von dem Brennpunkte einer Parabel auf die Tangenten gefällt werden, liegen auf der Scheiteltangente. (Fig. 59.)

Aus der Kongruenz der Dreiecke  $BDE$  und  $FDE$  folgt  $BF \perp DE$ ,  $BG = FG$  ( $G$  ist der Schnittpunkt von  $BF$  und  $DE$ ); also liegt  $G$  auf der Tangente in  $A$ .

169. Die Strecke einer beweglichen Tangente zwischen zwei festen Tangenten erscheint jedem Brennpunkte unter konstantem Winkel.

Sind  $D$  und  $E$  die Berührungspunkte der festen Tangenten,  $F$  und  $G$  ihre Schnittpunkte mit der beweglichen,  $H$  der Berührungspunkt der letzteren, so ist nach 164.  $\sphericalangle FBH = \sphericalangle FBD$ ,  $\sphericalangle GBH = \sphericalangle GBE$ , also  $\sphericalangle FBG = \frac{1}{2} (DBH + EBH)$ .

169a. Die Scheiteltangenten begrenzen auf jeder anderen Tangente eine Strecke, welche jedem Brennpunkte unter einem rechten Winkel erscheint.

Folgt aus 169.

170. Das Rechteck aus den Perpendikeln, die von den Brennpunkten auf eine Tangente gefällt werden können, ist konstant.

Man fälle die Perpendikel  $BG$  und  $B_1G_1$ ; die Fußpunkte liegen nach 165. auf dem Scheitelkreise. Da  $B_1J_1 = BG$  und  $B_1J_1 \cdot B_1G_1 = B_1A_1 \cdot B_1A$  konstant ist, so ist auch  $BG \cdot B_1G_1$  konstant.

171. Man setze die Hauptaxe  $AA_1 = 2a$ , die Excentricität  $BB_1 = 2e$ , dann ist bei der Ellipse (Fig. 58)  $B_1A_1 \cdot B_1A = (a - e)(a + e) = a^2 - e^2 = ML^2$ . Diese Länge  $ML$  bezeichnet man mit  $b$  und nennt sie die halbe Nebenaxe.



Bei der Hyperbel wird  $B_1 A_1 \cdot B_1 A = (e - a)(e + a) = e^2 - a^2 = ML^2$ . Die Länge  $ML = b$  heißt auch hier die halbe kleine Axe, obgleich  $L$  kein Hyperbelpunkt ist (148).

Die senkrechte Brennpunktssehne heißt *Parameter* (2p).

172. Es sei  $QQ_1$  eine Brennpunktssehne, welche die Leitlinie in  $E$  trifft; von  $Q$  und  $Q_1$  fälle man die Senkrechten  $QR$  und  $Q_1 R_1$  auf die Leitlinie, dann ist

$$QB : QR = Q_1 B : Q_1 R_1 = p : BC, \quad (\text{Fig. 51.})$$

$$\text{also} \quad QB : p : Q_1 B = QR : BC : Q_1 R_1 = QE : BE : Q_1 E.$$

Da aber  $QQ_1 EB$  harmonische Punkte sind, so folgt

$$QE : QB = Q_1 E : Q_1 B$$

$$\text{oder} \quad QE : QE + QB = Q_1 E : Q_1 E + Q_1 B$$

$$QE : BE = Q_1 E : 2 Q_1 E - BE$$

$$\text{und} \quad 2 QE \cdot Q_1 E = BE (QE + Q_1 E)$$

Daher auch  $2 QB \cdot Q_1 B = p \cdot (QB + Q_1 B) = p \cdot QQ_1$ , d. h.

*Das doppelte Produkt aus den Abschnitten einer Brennpunktssehne ist gleich dem Produkt aus dieser Sehne und dem halben Parameter.*

173. *Durch die Hauptaxe und eine Tangente ist ein Kegelschnitt bestimmt.*

Es sei  $AA_1$  die Hauptaxe,  $t$  irgend eine Tangente; über  $AA_1$  beschreibe man einen Kreis, welcher die Tangenten in  $D$  und  $D_1$  schneidet, errichte in  $D$  und  $D_1$  auf  $t$  Senkrechte, welche die Achse in  $B$  und  $B_1$  treffen, mache  $AA_1 BC$  harmonisch, so ist die Senkrechte in  $C$  die Leitlinie. Man kennt also vom Kegelschnitte Brennpunkt, Leitlinie und das Verhältniß der Abstände irgend eines Kegelschnittpunktes von beiden gleich  $AB : AC$ . Also ist nach 126 der Kegelschnitt bestimmt.

Liegt  $A_1$  im Unendlichen, so geht der Kreis über  $AA_1$  in die Senkrechte in  $A$  auf  $AA_1$  über, welche die Tangente  $t$  in  $D$  trifft. Man erhält den Brennpunkt  $B$  und wenn man  $AC = AB$  macht und in  $C$  die Senkrechte errichtet, auch die Leitlinie des Kegelschnittes, der in diesem Falle eine Parabel wird.



174. *In jeder harmonischen Verwandtschaft ist einem Kreise oder einem Kegelschnitte ein Kegelschnitt verwandt.*

Es sei  $K$  irgend ein Kegelschnitt,  $O$  sei das Centrum und  $o$  die Axe einer harmonischen Verwandtschaft. Aus den Gesetzen derselben folgt unmittelbar, daß für die verwandte krumme Linie  $\mathfrak{K}$  alle Polareigenschaften gelten. Der Mittellinie  $m$  von  $O$  und  $o$  ist  $g_\infty$  verwandt; es sei  $M$  der Pol von  $m$  bezüglich  $K$ , so ist der verwandte Punkt  $\mathfrak{M}$  der Pol von  $g_\infty$  bezüglich  $\mathfrak{K}$ , also der Mittelpunkt von  $\mathfrak{K}$ . Der Involution konjugierter Strahlen in Bezug auf  $K$  in  $M$  ist daher die Involution konjugierter Durchmesser in  $\mathfrak{M}$  verwandt. Diese hat ein Paar rechtwinklige Strahlen, von denen mindestens einer  $\mathfrak{K}$  schneiden muß (146). Die Schnittpunkte des einen seien  $\mathfrak{U}$  und  $\mathfrak{U}_1$ ; sollten beide Strahlen  $\mathfrak{K}$  schneiden, so sei  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  der größere der beiden Durchmesser. Es sei  $t$  irgend eine Tangente von  $\mathfrak{K}$ ; durch diese und  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  als Hauptaxe ist ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}'$  bestimmt (173), die beiden krummen Linien haben die Tangente  $t$ , die Punkte  $\mathfrak{U}$  und  $\mathfrak{U}_1$  und die Tangenten in ihnen gemeinsam. Diese letzteren stehen nämlich auf  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  senkrecht. Für die Tangenten von  $\mathfrak{K}$  folgt dies deshalb, weil der konjugierte Durchmesser zu  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  auf  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  senkrecht steht und für  $\mathfrak{K}'$  deshalb, weil  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  die Hauptaxe ist. Deshalb muß  $\mathfrak{K}$  mit  $\mathfrak{K}'$  zusammenfallen (163), weil für beide die Polareigenschaften gelten und  $\mathfrak{K}$  ist also ein Kegelschnitt.

Der Beweis in 163. gilt nämlich nicht nur für einen Kegelschnitt, sondern für jede Figur, für welche die Polareigenschaften bestehen.

175. *Die Polarisationsfigur eines Kegelschnittes ist wieder ein Kegelschnitt.* Cf. 271.

Es sei  $K$  irgend ein Kegelschnitt, die Basis der Polarisation ein anderer Kegelschnitt  $O$ .

Aus den Gesetzen der Polarisation folgt unmittelbar, daß für die verwandte krumme Linie  $\mathfrak{K}$  alle Polareigenschaften gelten. Der Pol  $\mathfrak{M}$  von  $g_\infty$  ist also der Mittelpunkt von  $\mathfrak{K}$ . Die Involution konjugierter Durchmesser in  $\mathfrak{M}$  hat ein Paar rechtwinklige Strahlen, von denen mindestens einer  $\mathfrak{K}$  schneiden muß (146). Die Schnittpunkte des einen seien  $\mathfrak{U}$  und  $\mathfrak{U}_1$ .



und wenn beide Strahlen  $\mathfrak{K}$  schneiden, so sollen  $\mathfrak{U}$  und  $\mathfrak{U}_1$  die Endpunkte der größeren Sehne sein. Durch eine Tangente  $t$  von  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  als Hauptaxe ist ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}'$  bestimmt (173), der (163) mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfallen muß.

176. *Eine harmonische Verwandtschaft herzustellen, in welcher einem gegebenen Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und einer gegebenen Geraden  $g$  die  $g_\infty$  verwandt ist.*

Auf der Geraden  $g$ , welche außerhalb  $K$  liegen muß, denke man sich die Involution der konjugierten Punkte hergestellt und über jedem Paare einen Kreis beschrieben. Diese Kreise schneiden sich in zwei Punkten  $O$  und  $O'$  (36c.). In derjenigen harmonischen Verwandtschaft, welche  $O$  als Centrum hat und deren Axe durch  $O'$  parallel zu  $g$  angenommen wird, ist dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  verwandt.

Ist nämlich  $G$  der Pol von  $g$ ,  $AB$  eine Sehne durch  $G$ , sind  $PP_1$ ,  $QQ_1$ ,  $RR_1$ , . . . konjugierte Punkte auf  $g$ , so treffen sich die Geraden  $AP$  und  $BP_1$ ,  $AP_1$  und  $BP$ ,  $AQ$  und  $BQ_1$ ,  $AQ_1$  und  $BQ$ , . . . in den Punkten  $P'$  und  $P'_1$ ,  $Q'$  und  $Q'_1$ , . . . von  $K$ . In der verwandten Figur  $\mathfrak{K}$  werden die verwandten Punkte mit denselben deutschen Buchstaben bezeichnet. Es ist also  $\mathfrak{G}$ , der Pol von  $g_\infty$ , der Mittelpunkt von  $\mathfrak{K}$ ,  $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$  ein Durchmesser. Die Winkel  $\mathfrak{U}\mathfrak{P}'\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{U}\mathfrak{P}'_1\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{U}\mathfrak{Q}'\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{U}\mathfrak{Q}'_1\mathfrak{B}$ , . . . müssen rechte Winkel sein; daher ist  $\mathfrak{K}$  ein Kreis.

177. *Eine harmonische Verwandtschaft herzustellen, in welcher einem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis und einem Punkte  $G$  der Mittelpunkt des Kreises verwandt ist.*

Auf der Polare  $g$  von  $G$  bestimme man die Involution konjugierter Punkte und mittelst derselben ganz wie in 177. die harmonische Verwandtschaft.

178. *Eine harmonische Verwandtschaft herzustellen, in welcher einem Kegelschnitte  $K$  ein anderer und 1. einer Geraden eine Leitlinie des letzteren 2. einem Punkte ein Brennpunkt des letzteren verwandt ist.*

179. Gegeben ist ein Kegelschnitt  $K$  mit den Axen  $2a$  und  $2b$ . Ein Punkt der Axe  $2a$  sei  $C$  und  $c$  seine Polare, welche die Axe in  $D$  schneidet; auf letzterer seien  $E$  und  $E_1$



diejenigen konjugierten Punkte, welche gleichweit von  $D$  entfernt sind. Dann ver-




Fig. 60.

fernt sind. Dann verhält sich  $DE^2 : MF \cdot MF_1 = DE : MF_1$ , wenn  $F$  und  $F_1$  konjugierte Punkte sind. Da  $MF \cdot MF_1 = b^2$  und die Polare von  $E$  mit der Geraden  $E_1CF_1$  zusammenfallen muß, so ist  $DE^2 : b^2 = DE_1 : MF_1$

$= DC : MC$ ; aber  $DC = MD - MC$ ,  $MC \cdot MD = a^2$ ,  $MD = \frac{a^2}{MC}$ , folglich

$$DE^2 : b^2 = a^2 - MC^2 : MC^2$$

und

$$DE^2 = b^2 \cdot \frac{a^2 - MC^2}{MC^2}$$

Beschreibt man über  $EE_1$  einen Kreis, welcher die Axe in  $OO'$  schneidet, zieht  $o \parallel c$  durch  $O'$  und wählt  $O$  und  $o$  als Centrum und Axe einer harmonischen Verwandtschaft, so ist dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  verwandt, denn der Involution konjugierter Strahlen in  $C$  ist eine circulare Involution konjugierter Strahlen verwandt.

Mit Hilfe obiger Formel ist die Aufgabe gelöst: Zu jedem Punkte der Axe  $2a$  als Centrum die Axe derjenigen harmonischen Verwandtschaft zu konstruieren, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis verwandt ist. Wenn nämlich  $O$  ein beliebiger Punkt der Axe ist, so ist

$$\begin{aligned} OM &= DM - OD = DM - DE \\ &= \frac{a^2 - b \sqrt{a^2 - MC^2}}{MC} \end{aligned}$$

oder  $MC \cdot OM = a^2 - b \sqrt{a^2 - MC^2}$ , woraus  $MC$  sich ergibt, die Polare  $c$  von  $C$  und endlich  $o$ .

180. Zwei Kegelschnitte mit den Axen  $2a, 2b$  und  $2a_1, 2b_1$  und den Mittelpunkten  $MM_1$  liegen so, daß zwei derselben z. B.  $2a$  und  $2a_1$  in einer Geraden  $g$  liegen. Für die Potenzen der Involutionen konjugierter Punkte auf einer zu  $g$  senkrechten Geraden findet man nach der oben entwickelten Formel (Fig. 60)



$b^2 \cdot \frac{DC}{MC}$  und  $b_1^2 \cdot \frac{D_1 C_1}{M_1 C_1}$ . Setzt man beide Ausdrücke einander gleich, so bestimmt man die Lage derjenigen Geraden, welche für beide Kegelschnitte dieselbe Involution konjugierter Punkte enthält. Diese Gerade heißt die *reelle oder ideelle gemeinschaftliche Secante* der Kegelschnitte. Man findet, wenn man  $MD = x$ ,  $M_1 D = x_1$ ,  $MD \cdot MC = a^2$ ,  $MD_1 \cdot MC_1 = a_1^2$  setzt,

$$b^2 \cdot \frac{MD - MC}{MC} = b_1^2 \cdot \frac{M_1 D_1 - M_1 C_1}{M_1 C_1}$$

oder 
$$b^2 \cdot \frac{x^2 - a^2}{a^2} = b_1^2 \cdot \frac{x_1^2 - a_1^2}{a_1^2}$$

oder 
$$\frac{x^2 - a^2}{x_1^2 - a_1^2} = \frac{a^2 b_1^2}{a_1^2 b^2}$$

180a. Es kann sich ereignen, daß der eine der beiden Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ , etwa  $K_1$ , ein Punkt wird, wobei noch vorausgesetzt werden soll, daß  $K_1$  auf keiner Axe von  $K$  liegt. Die Polaren zweier Punkte  $A$  und  $B$  bezüglich  $K_1$  seien die Geraden  $a$  und  $b$ , welche sich natürlich in  $K_1$  schneiden müssen; dann sind  $a$  und  $K_1 A$ ,  $b$  und  $K_1 B$  je zwei konjugierte Strahlen. Durch diese beiden Paare ist aber die Involution konjugierter Strahlen bezüglich  $K_1$  gegeben. Die Paare konjugierter Strahlen durch  $K_1$  bezüglich des Kegelschnittes  $K$  bilden auch eine Involution und diese hat mit der vorigen ein Paar konjugierter Strahlen gemein; es sei dieses das Paar  $mm_1$ .

Man kann nun durch eine harmonische Verwandtschaft  $K$  und  $K_1$  so transformieren, daß der Punkt  $\mathfrak{R}_1$  als Kreis angesehen werden kann und im Mittelpunkte von  $\mathfrak{R}$  liegt, wenn  $\mathfrak{R}_1$  und  $\mathfrak{R}$  die transformirten Figuren sind. Zu dem Zwecke schneide man die Involution der konjugierten Strahlen bezüglich  $K_1$  mit der Polare  $p$  von  $K_1$  in Bezug auf  $K$  in einer Punktinvolution. Diese hat keine Doppelpunkte; also schneiden sich die Kreise, die man über den Entfernungen je zweier konjugierten Punkte, als Durchmesser, beschreibt, in zwei Punkten  $O$  und  $O'$ . Den ersteren wähle man als Centrum einer harmonischen Verwandtschaft, deren Mittellinie  $p$  ist und deren Axe also durch  $O'$  parallel zu  $p$  läuft. Die letztere mag  $m$  und  $m_1$  in  $M$  und  $M_1$  schneiden; diesen Punkten sind die im Unendlichen liegenden Punkte  $\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{M}_1$



verwandt, welche auf den Geraden  $OM$  und  $OM_1$  liegen müssen. Da aber  $\sphericalangle MOM_1 = 90^\circ$  ist, so muß auch  $\sphericalangle \mathfrak{M}\mathfrak{R}_1\mathfrak{M}_1 = 90^\circ$  sein. Für den Punktkegelschnitt  $\mathfrak{R}_1$  ist also die Involution konjugierter Strahlen eine circulare, also ist  $\mathfrak{R}_1$  als Kreis zu betrachten.

Der Mittellinie  $p$  der Verwandtschaft ist aber die unendlich ferne Gerade verwandt; dem Pole  $K_1$  von  $p$  in Bezug auf  $K$  ist also der Pol von  $g_\infty$ , der Mittelpunkt von  $\mathfrak{R}$  verwandt und da  $\mathfrak{R}_1$  und  $K_1$  verwandte Punkte sind, so ist  $\mathfrak{R}_1$  der Mittelpunkt von  $\mathfrak{R}$ .

Auf einer im Punkte  $P$  der Nebenaxe senkrecht zu ihr errichteten Geraden seien  $Q$  und  $Q_1$  diejenigen konjugierten Punkte, welche gleichweit von  $P$  entfernt sind; es ist dann, wenn  $P_1$  der konjugierte Punkt von  $P$  auf der Nebenaxe ist,

$$PQ^2 = a^2 \cdot \frac{b^2 - \mathfrak{R}_1 P_1^2}{\mathfrak{R}_1 P_1^2}$$

wo  $a$  und  $b$  die Halbaxen von  $\mathfrak{R}$  sind. Da nun  $\mathfrak{R}_1 P \cdot \mathfrak{R}_1 P_1 = b^2$ , so wird

$$PQ^2 = \frac{a^2 \cdot (\mathfrak{R}_1 P^2 - b^2)}{b^2}$$

Setzt man diesen Ausdruck gleich  $\mathfrak{R}_1 P^2$ , so findet man denjenigen Punkt  $P$ , auf dessen zur Nebenaxe senkrecht errichteten Geraden die Strahlenpaare der circularen Involution in  $\mathfrak{R}_1$  und der Involution konjugierter Strahlen in  $P_1$  sich in denselben Punktpaaren treffen. Man findet

$$\mathfrak{R}_1 P = \pm \frac{a \cdot b}{e}, \text{ wo } e^2 = a^2 - b^2.$$

Diese Senkrechte in  $P$  ist also die ideelle gemeinschaftliche Sekante von  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$ . Die zu ihr bezüglich der Hauptaxe symmetrisch liegende Gerade ist eine zweite ideelle Sekante.

Die ihnen verwandten Geraden  $q$  und  $q_1$  sind zwei ideelle Sekanten von  $K$  und  $K_1$ .

Sind  $P'$  und  $P'_1$  zwei konjugierte Punkte der Hauptaxe und  $Q'Q'_1$  diejenigen konjugierten Punkte auf der in  $P'$  zur Hauptaxe senkrechten Geraden, welche gleichweit von dieser entfernt sind, so ist

$$P'Q'^2 = b^2 \cdot \frac{a^2 - P'_1 \mathfrak{R}_1^2}{P'_1 \mathfrak{R}_1^2} = \frac{b^2 (P' \mathfrak{R}_1^2 - a^2)}{a^2}$$



Setzt man diesen Ausdruck gleich  $P' \mathfrak{R}_1^2$ , so erhält man denjenigen Punkt  $P'$  und in ihm diejenige Gerade, auf welcher jedem Punkte bezüglich  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$  derselbe Punkt konjugiert ist. Man erhält

$$P' \mathfrak{R}_1^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 - a^2}$$

und

$$P' \mathfrak{R}_1 = \pm \frac{ab}{e} \cdot \sqrt{-1}$$

Außer den reellen gemeinschaftlichen Sekanten, die parallel zur Hauptaxe liegen, giebt es also noch zwei imaginäre gemeinschaftliche Sekanten parallel zur Nebenaxe.

Es haben also  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$  zwei reelle und zwei imaginäre gemeinschaftliche Sekanten; dasselbe gilt demnach auch von  $K$  und  $K_1$ . Somit gilt der Satz:

*Ein Kegelschnitt  $K$  und ein Punktkegelschnitt  $K_1$  haben zwei reelle und zwei imaginäre gemeinschaftliche Sekanten. Erstere haben für beide Kegelschnitte dieselbe Involution konjugierter Punkte. — Die Polare von  $K_1$  bezüglich  $K$  geht durch den Schnittpunkt der reellen Sekanten und trennt sie harmonisch von  $K_1$ .*

Denn bei  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$  sind die reellen Sekanten gleichweit vom Mittelpunkte entfernt und zur Axe senkrecht.

181. Diese Entwicklung verliert ihre Giltigkeit für den Fall, daß einer der Kegelschnitte Parabel wird: Um auch für diesen Fall die Lage der gemeinschaftlichen Sekante zu bestimmen, soll zuvor eine Eigenschaft der Parabel abgeleitet werden.

Zwei Gerade  $b$  und  $b_1$  stehen in den Punkten  $B$  und  $B_1$ , welche um  $a$  und  $a_1$  vom Scheitel  $A$  entfernt sind, auf der Axe senkrecht; die Potenzen der auf ihnen befindlichen Involutionen konjugierter Punkte seien  $BD^2 = BE^2$  und  $B_1 D_1^2$ . Man mache  $AC = AB$ ,  $AC_1 = AB_1$ ; dann ist  $EC$  die Polare von  $D$  und  $DC_1$  diejenige von  $G$ . Da

$$B_1 G \cdot B_1 G_1 = B_1 D_1^2,$$

so ist 
$$B_1 D_1^2 : BD^2 = B_1 G \cdot B_1 G_1 : BD \cdot BE.$$

Aber 
$$B_1 G : BE = B_1 C : BC$$

$$B_1 G_1 : BD = B_1 C_1 : BC_1$$

$$B_1 C = BC_1, BC = 2a, B_1 C_1 = 2a_1,$$

also 
$$B_1 D_1^2 : BD^2 = a_1 : a,$$



d. h. die *Potenzen der Involutionen konjugierter Punkte auf zwei zur Parabelaxe senkrechten Geraden verhalten sich wie die Abstände dieser Geraden vom Scheitel.*




Fig. 61.

Denkt man sich jetzt eine Parabel  $K$  und einen anderen Kegelschnitt  $K_1$ , deren Hauptaxen zusammenfallen mögen und in der Entfernung  $x$  vom Scheitel  $A$  der Parabel und  $x_1$  vom Mittelpunkte  $M_1$  eine Senkrechte  $C$  auf der gemeinschaftlichen Axe errichtet, nimmt man ferner die Potenzen der Involutionenkonjugierter Punkte auf derselben gleich  $p^2$  und  $p_1^2$  und diejenige auf der Nebenaxe von  $K_1$  für die Parabel gleich  $q^2$  an,

so ist  $p^2 = q^2 \cdot \frac{x}{M_1 A}$  und  $p_1^2 = b_1^2 \cdot \frac{x_1^2 - a_1^2}{a_1^2}$ .

Sollen beide Potenzen gleich sein, so ist

$$q^2 \cdot \frac{x}{M_1 A} = b_1^2 \cdot \frac{x_1^2 - a_1^2}{a_1^2}$$

worin noch  $x + x_1 = M_1 A$  zu setzen ist.

Sind beide Kegelschnitte Parabeln mit den Scheiteln  $A$  und  $A_1$ , sind  $x$  und  $x_1$  die Entfernungen der Senkrechten  $c$  von den Scheiteln, sind ferner  $q^2$  und  $q_1^2$  die Potenzen zweier zur Axe senkrechten Geraden in den Entfernungen  $a$  und  $a_1$  von den Scheiteln, so muß

$$q^2 \cdot \frac{x}{a} = q_1^2 \cdot \frac{x_1}{a_1},$$

$$\frac{x}{x_1} = \frac{a}{a_1} \cdot \frac{q_1^2}{q^2}$$

sein.



In den beiden ersten Fällen ergeben die Formeln zwei gemeinschaftliche Sekanten; im letztem Falle tritt scheinbar nur eine auf. Als zweite hat man aber hier die unendlich ferne Gerade zu betrachten, welche als gemeinschaftliche Tangente beider Parabeln anzusehen ist.

Beschreibt man um den Schnittpunkt der gemeinschaftlichen Sekante mit der Centrale einen Kreis, dessen Radius die Quadratwurzel aus der Potenz der Involution konjugierter Punkte auf der Sekante ist, so kann man jeden seiner Schnittpunkte als Centrum einer harmonischen Verwandtschaft nehmen, in welcher beiden Kegelschnitten Kreise verwandt sind. Die Axen dieser Verwandtschaften bestimmt man durch die Bedingung, daß die der gemeinschaftlichen Sekante verwandte Gerade ins Unendliche fällt.

Somit ist die Aufgabe gelöst:

*Zwei Kegelschnitte, deren Axen in einer Geraden liegen, durch harmonische Verwandtschaft in Kreise zu verwandeln.*

## § 16.

### Konstruktion der Kegelschnitte aus gegebenen Punkten und Tangenten.

182. *Durch fünf Punkte ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

Sind  $ABCDE$  fünf beliebige Punkte, so stelle man nach 87. eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß die verwandten Punkte auf einem Kreise liegen. Der diesem (174) verwandte Kegelschnitt geht durch  $ABCDE$  und ist wegen 158. der einzige durch diese Punkte.

183. *Durch fünf Tangenten ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

Sind  $abcde$  fünf beliebige Gerade, so stelle man nach 90. eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß die fünf verwandten Geraden einen Kreis berühren. Der diesem verwandte Kegelschnitt ist wegen 159. der einzige, welcher  $abcde$  zu Tangenten hat.

184. *Durch vier Punkte  $ABCD$  und die Tangente  $a$  in  $A$  ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

91. 160.



185. *Durch vier Tangenten und den Berührungspunkt auf einer von ihnen ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

92. 161.

186. *Durch drei Punkte und die Tangenten in zwei von ihnen ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

93. 162.

187. *Durch drei Tangenten und die Berührungspunkte auf zwei von ihnen ist stets ein einziger Kegelschnitt bestimmt.*

94. 163.

188. *Der geometrische Ort des Scheitels eines harmonischen Strahlenbüschels, dessen Strahlen durch vier feste Punkte gehen, von denen keine drei in einer Geraden liegen, ist ein Kegelschnitt.*

Sind  $ABCD$  vier feste, nicht in einer Geraden liegende Punkte und ist  $S(ABCD)$  ein harmonisches Büschel, so ist durch die fünf Punkte  $ABCD S$  ein Kegelschnitt  $K$  bestimmt und jeder Punkt  $S'$  hat, wie beim Kreise, die Eigenschaft, daß  $S'(ABCD)$  auch ein harmonisches Büschel ist. Gäbe es außer der Peripherie von  $K$  noch einen Punkt  $X$ , so daß  $X(ABCD)$  harmonisch wäre, und schnitte  $XA$  den Kegelschnitt in  $Y$ , so wäre auch  $Y(ABCD)$  harmonisch. Weil aber  $XA$  und  $YA$  in einer Geraden liegen, so müßten auch  $BCD$  in einer Geraden liegen, was gegen die Annahme ist.

188a. *Verbindet man zwei feste Punkte  $S$  und  $S_1$  mit den Punktpaaren einer Involution  $AA_1, BB_1, \dots$  so ist der Ort des Schnittpunktes der Verbindungsgeraden ein Kegelschnitt.*




Fig. 61a.

I. Die Involution  $AA_1, BB_1, \dots$  auf  $p$  hat Doppelpunkte  $M$  und  $N$ .

Die Strahlen  $SA, S_1A_1$  und  $S_1A, SA_1$  mögen sich in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  schneiden; dann sind  $S(MN\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1)$  und  $S_1(MN\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1)$  harmonische Büschel, also sind  $SS_1MN\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  Punkte eines Kegelschnittes  $K$ . Wenn sich  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  und  $SS_1$  in  $P$

schneiden, so ist  $A_1P$  die Polare von  $A$  in Bezug auf  $K$  und  $AP$



diejenige von  $A_1$ . Verbindet man  $S$  mit  $B$ , so erhält man mit  $K$  den Schnittpunkt  $\mathfrak{B}$ ; schneidet man  $K$  mit  $P\mathfrak{B}$  in  $\mathfrak{B}_1$ , so müssen sich  $S\mathfrak{B}$  und  $S_1\mathfrak{B}_1$  sowie  $S\mathfrak{B}_1$  und  $SB$  in zwei Punkten der Polare  $p$  oder  $AA_1$  schneiden. Der erste dieser Schnittpunkte ist  $B$ ; der zweite heie  $X$ . Da aber  $PX$  die Polare von  $B$  sein mu, also  $MNBX$  harmonische Punkte sind, so fllt  $X$  mit  $B_1$  zusammen. Also sind die Schnittpunkte der Strahlenpaare  $SB$ ,  $S_1B_1$  und  $S_1B$ ,  $SB_1$ , d. i.  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{B}_1$  Punkte von  $K$ .

II. Die Involution  $AA_1$ ,  $BB_1$ , ... auf  $p$  hat keine Doppelpunkte.

Stellt man eine harmonische Verwandtschaft her, welche  $p$  zur Mittellinie hat und deren Centrum einer der Schnittpunkte ist, in denen die Kreise ber  $AA_1$ ,  $BB_1$ , sich treffen, so sind die Strahleninvolutionen in  $S$  und  $S_1$  circularen Involutionen in den verwandten Punkten  $\mathfrak{S}$  und  $\mathfrak{S}_1$  verwandt. Sind  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ , ... die zu  $AA_1$ ,  $BB_1$ , ... verwandten im Unendlichen liegenden Punkte, so schneiden sich die zu einander rechtwinkligen Strahlen  $\mathfrak{S}\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{S}_1\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{S}\mathfrak{A}_1$  und  $\mathfrak{S}_1\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{S}\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{S}_1\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{S}\mathfrak{B}_1$  und  $\mathfrak{S}_1\mathfrak{B}$ , ... auf dem Kreise  $\mathfrak{K}$  mit dem Durchmesser  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$ . Ihm ist ein Kegelschnitt  $K$  verwandt, welcher durch  $S$  und  $S_1$  und die Schnittpunkte  $SA$  und  $S_1A_1$ ,  $SA_1$  und  $S_1A$ ,  $SB$  und  $S_1B_1$ ,  $SB_1$  und  $S_1B$ , ... geht.

188b. Schneidet man zwei feste Gerade  $s$  und  $s_1$  durch die Strahlenpaare einer Involution  $aa_1$ ,  $bb_1$ , ... so ist der Ort der Verbindungslinien der Schnittpunkte ein Kegelschnitt.

I. Wenn die Involution  $aa_1$ ,  $bb_1$ , ... Doppelstrahlen hat, so lsst sich der Beweis ebenso wie in 188a. fhren.

II. Die Involution  $aa_1$ ,  $bb_1$ , ... hat keine Doppelstrahlen.

Es sei  $M$  der Scheitel der Involution und  $S$  der Schnittpunkt von  $s$  und  $s_1$ . Das Strahlenpaar  $aa_1$  schneide  $s$  in  $PQ$ ,  $s_1$  in  $P_1Q_1$  und es mgen sich  $PQ_1$  und  $P_1Q$  in  $R$  treffen. Durch  $S$  und  $R$  lege man die Gerade  $g$ , diese schneidet die Strahleninvolution in einer Punktinvolution.  $O$  sei einer der Punkte, von denen letztere durch eine circularre Strahleninvolution projiciert wird. Nimmt man  $O$  zum Centrum und  $g$  zur Mittellinie einer harmonischen Verwandtschaft, so ist der



Involution in  $M$  eine circulare Involution in  $\mathfrak{M}$  und dem Tangentenpaare  $ss_1$  ein paralleles Tangentenpaar  $\xi\xi_1$  verwandt. Das Strahlenpaar  $aa_1$  der Involution in  $\mathfrak{M}$  muß parallel sein, also ist die von  $\xi\xi_1aa_1$  gebildete Figur ein Rhombus, in welchen sich ein Kreis  $\mathfrak{K}$  beschreiben läßt, mit  $\mathfrak{M}$  als Mittelpunkt. Jedes durch  $\mathfrak{M}$  gelegte rechtwinklige Geradenpaar, also jedes Strahlenpaar der circularen Involution in  $\mathfrak{M}$ , schneidet aber die parallelen Tangenten  $\xi\xi_1$  in solchen Punkten, daß ihre Verbindungslinien Tangenten von  $\mathfrak{K}$  sind.

Also müssen die Verbindungslinien der Schnittpunkte, welche die Strahlenpaare  $aa_1, bb_1, \dots ss_1$  bestimmen, einen Kegelschnitt  $K$ , welcher der zum Kreise  $\mathfrak{K}$  verwandte Kegelschnitt ist, umhüllen.

189. *Alle Geraden, welche vier feste Gerade, von denen keine drei durch einen Punkt gehen, in harmonischen Punkten schneiden, sind Tangenten eines Kegelschnittes.*

Beweis entweder wie in 188. oder durch Polarisation.

190. *Schneidet man eine Gerade  $g$  mit den Strahlen eines Büschels  $S$  und konstruiert auf jedem Strahle zu seinem Schnittpunkte den konjugierten Punkt bezüglich eines Kegelschnittes  $K$ , so liegen alle konjugierten Punkte auf einem Kegelschnitte  $K_1$ .*

Man stelle eine harmonische Verwandschaft her, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und der  $g$  die  $g_\infty$  verwandt ist. Dem Büschel  $S$  ist ein anderes  $\mathfrak{S}$  verwandt; die konjugierten Punkte zu den Schnittpunkten des letzteren mit  $g_\infty$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  sind die Fußpunkte der vom Mittelpunkte des Kreises auf die Strahlen von  $\mathfrak{S}$  gefälltten Perpendikel. Diese Fußpunkte liegen auf einem Kreise  $\mathfrak{K}$ ; auf dem verwandten Kegelschnitte  $K_1$  liegen die konjugierten Punkte zu den Schnittpunkten der Strahlen von  $S$  mit  $g$  bezüglich  $K$ .

191. *Schneidet man eine Gerade mit den Strahlen eines Büschels und konstruiert in jedem Schnittpunkte zu dem durchgehenden Strahle den konjugierten Strahl bezüglich eines Kegelschnittes  $K$ , so sind alle konjugierten Strahlen Tangenten eines Kegelschnittes.*

Entweder direkt durch harmonische Verwandschaft oder durch Polarisation aus 190.



## § 17.

## Poldreiecke.

192. Sind  $AA_1$  und  $BB_1$  zwei Paar konjugierter Punkte, so sind auch die Schnittpunkte  $CC_1$  der Seitenpaare  $AB$ ,  $A_1B_1$  und  $AB_1$ ,  $BA_1$  konjugierte Punkte.

I. Folgt aus 109.

II. Die Polaren von  $A$  und  $B$  gehen durch  $A_1$  und  $B_1$  und mögen sich in  $D$  schneiden; dann sind  $DA$  und  $DA_1$ ,  $DB$  und  $DB_1$  konjugierte Strahlenpaare. Sie sind aber auch Strahlenpaare der Involution, welche durch die Verbindungs-  
linien von  $D$  mit den sechs Ecken  $AA_1BB_1CC_1$  gebildet wird und da die konjugierten Strahlenpaare in  $D$  gleichfalls eine Involution bilden, so sind  $DC$  und  $DC_1$  konjugierte Strahlen und weil  $C_1D$  die Polare von  $C$  ist, so sind  $CC_1$  konjugierte Punkte.

193. Die sechs Ecken zweier Poldreiecke  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  liegen auf einem Kegelschnitte.

Die Ecke  $A_1$  liege innerhalb; man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, so daß der Geraden  $B_1C_1$  die unendlich ferne Gerade und dem Kegelschnitte ein Kreis verwandt ist.




Fig. 62.

Man bezeichne die verwandten Punkte mit  $\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{A}_1\mathcal{B}_1\mathcal{C}_1$ . In dem Sechseck  $\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{A}_1\mathcal{B}_1\mathcal{C}_1$  bestimme man die Schnittpunkte der Gegenseiten  $\mathcal{D}$ ,  $\mathcal{E}^\infty$ ,  $\mathcal{F}$  von  $\mathcal{A}\mathcal{B}$  und  $\mathcal{A}_1\mathcal{B}_1$ ,  $\mathcal{B}\mathcal{C}$  und  $\mathcal{B}_1\mathcal{C}_1$ ,  $\mathcal{C}\mathcal{A}_1$  und  $\mathcal{A}\mathcal{C}_1$ . Da  $\mathcal{A}_1\mathcal{B}_1 \perp \mathcal{A}_1\mathcal{C}_1$ , als konjugierte Strahlen, stehen muß, so schneiden sich in  $\mathcal{A}$  zwei Höhen  $\mathcal{D}\mathcal{A}$  und  $\mathcal{F}\mathcal{A}$  des Dreiecks  $\mathcal{A}_1\mathcal{D}\mathcal{F}$ , also ist auch

$\mathcal{A}\mathcal{A}_1 \perp \mathcal{D}\mathcal{F}$  und  $\mathcal{D}\mathcal{F}$  geht durch  $\mathcal{E}^\infty$ . Das Sechseck ist also ein Pascal'sches und seine Ecken, mithin auch die des verwandten Sechsecks, liegen auf einem Kegelschnitte.



194. Sind  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  drei Punkte einer gleichseitigen Hyperbel  $H$ , so liegt auf derselben auch der Höhenpunkt des Dreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ . Fig. 62. Cf. 309.

Ist  $\mathfrak{A}_1$  der Höhenpunkt des Dreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ , so beschreibe man um denselben einen Kreis, für welchen  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  ein Poldreieck ist. Man findet seinen Radius  $r$  aus der Gleichung  $r^2 = \mathfrak{A}_1\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{A}_1\mathfrak{C}$ . Durch  $\mathfrak{A}_1$  ziehe man die Geraden nach den unendlich fernen Punkten  $\mathfrak{B}_1^\infty \mathfrak{C}_1^\infty$  der Hyperbel, so stehen diese auf einander senkrecht und deshalb sind  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty \mathfrak{C}_1^\infty$  auch die Ecken eines Poldreiecks des Kreises. Folglich liegen die sechs Ecken  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty \mathfrak{C}_1^\infty$  auf einem Kegelschnitte, der mit  $H$  fünf Punkte gemein hat und also mit ihm identisch ist.

195. Zwei senkrechte Sehnen einer gleichseitigen Hyperbel schneiden sich so, daß die Produkte aus ihren Abschnitten gleich sind. Fig. 62.

Denn aus den ähnlichen Dreiecken  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{C}\mathfrak{C}$  folgt  $\mathfrak{A}\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{A}_1\mathfrak{C} = \mathfrak{B}\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{C}\mathfrak{C}$ .

195 a. Die Höhe auf die Hypotenuse eines rechtwinkligen, einer gleichseitigen Hyperbel eingeschriebenen Dreiecks, ist eine Tangente derselben.

Denn wird  $\sphericalangle \mathfrak{B}\mathfrak{A}\mathfrak{C} = 90^\circ$ , so fällt  $\mathfrak{A}$  mit  $\mathfrak{A}_1$  auf der Geraden  $\mathfrak{A}\mathfrak{C}$  zusammen.

196. Die sechs Seiten zweier Poldreiecke berühren einen Kegelschnitt.

I. Man denke sich eine Parabel konstruiert, welche die vier Geraden  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty$  und natürlich die unendlich ferne Gerade berührt. Der Höhenpunkt  $\mathfrak{A}_1$  des Tangentendreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  liegt auf der Leitlinie der Parabel. Zwei Tangenten der Parabel, deren Schnittpunkt auf der Leitlinie liegt, stehen auf einander senkrecht, also ist  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{C}_1^\infty$  auch eine Tangente der Parabel. — Die benutzten Parabeleigenschaften sind 215. und 221. abgeleitet.

II. Durch Polarisation aus 193.

197. Zwei einem Kegelschnitte  $K$  eingeschriebene Dreiecke  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  sind stets Poldreiecke eines anderen Kegelschnittes.



Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß der Geraden  $B_1C_1$  die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$ , den Winkeln  $B_1A_1C_1$  und  $A_1EB$  rechte Winkel verwandt sind, wenn  $E$  der Schnittpunkt von  $BC$  und  $AA_1$  ist. Zu dem Zwecke beschreibe man über  $B_1C_1$  und  $D_1E_1$  als Durchmesser Kreise; sind  $O$  und  $O_1$  deren Schnittpunkte, so kann man  $O$  als Centrum und die zu  $B_1C_1$  durch  $O_1$  gelegte Parallele als Axe der gesuchten Verwandtschaft wählen. In der verwandten Figur  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty\mathfrak{C}_1^\infty$  ist  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty \perp \mathfrak{A}_1\mathfrak{C}_1^\infty$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  eine Höhe des Dreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ . Da der dem Kegelschnitte  $K$  verwandte Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  eine gleichseitige Hyperbel sein muß, so ist  $\mathfrak{A}_1$  der Höhenpunkt des Dreiecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ . Daher giebt es einen Kreis um  $\mathfrak{A}_1$ , für welchen  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1^\infty\mathfrak{C}_1^\infty$  Poldreiecke sind. Für den ihm verwandten Kegelschnitt sind  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  Poldreiecke.

198. Die Paare konjugierter Punkte  $P_1P_2, P_1'P_2', \dots$  einer Geraden  $p$  bilden eine Involution; ist  $P$  der Pol von  $p$ , so sind  $PP_1P_2, PP_1'P_2', \dots$  Poldreiecke. Jedem derselben läßt sich ein Kreis umschreiben und alle diese Kreise bilden ein Büschel, denn sie haben einen gemeinschaftlichen Punkt und schneiden eine Gerade in einer Involution. Durch  $PP_1$  lege man die Gerade  $q$ , deren Pol  $P_2$  sein muß. Alle Kreise durch  $P_2$ , welche  $q$  in zwei konjugierten Punkten schneiden, bilden ebenfalls ein Büschel; dasselbe hat mit dem vorigen den durch das Poldreieck  $PP_1P_2$  bestimmten Kreis gemeinschaftlich. Man kann die Geraden  $p$  und  $q$  als zwei beliebige Gerade betrachten und folgert dann:

*Die Gesamtheit aller Kreise, welche den Poldreiecken eines Kegelschnittes umgeschrieben sind, bilden ein Netz. (Siehe Nachtrag.)*

199. Es giebt einen Kreis  $\mathfrak{K}$ , welcher alle Kreise dieses Netzes rechtwinklig schneidet; sein Mittelpunkt  $M$  fällt mit demjenigen des Kegelschnittes zusammen. Auf  $\mathfrak{K}$  sei  $D$  ein beliebiger Punkt,  $DE$  und  $DE_1$  seien die beiden Tangenten an den Kegelschnitt, so gehören die Kreise durch  $D$ , welche die Gerade  $EE_1$  in  $E$  und  $E_1$  berühren, zu den Kreisen des Netzes. Da der Kreis  $\mathfrak{K}$  beide im Punkte  $D$  rechtwinklig











Wird  $a < b$ , so wird  $r$  imaginär. In diesem Falle giebt es keine rechtwinkligen Tangenten.

202. *Die konjugierte Hyperbel.*

Die Hyperbel  $H$  schneide die Hauptaxe in  $A$  und  $A_1$ ; in einer harmonischen Verwandtschaft deren Centrum  $A$  ist und




Fig. 66.

deren Axe in  $A_1$  auf der Hauptaxe senkrecht steht, ist der Hyperbel  $H$  eine Ellipse  $E$  verwandt mit der Nebenaxe  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ . Den unendlich fernen Punkten der Hyperbel sind die Ellipsenpunkte  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  verwandt; Hyperbel und Ellipse berühren sich in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  und haben dieselbe Hauptaxe.

Der Pol von  $\mathfrak{A}_1 B_1$  bezüglich  $H$  liegt auf der Nebenaxe, im Schnittpunkte derselben mit der Polare von  $B_1$ . Diese aber geht durch  $A_1$  und den unendlich fernen Punkt der Asymptote  $B_1 M$ , ist also der letzteren parallel und folglich die Gerade  $A_1 \mathfrak{A}$ . Mithin sind  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  konjugierte Punkte der Hyperbel  $H$  auf ihrer Nebenaxe. Alle konjugierten Punktpaare derselben bezüglich  $H$  bilden eine Involution mit dem Centralpunkte  $M$ ; die Potenz derselben  $M\mathfrak{A} \cdot M\mathfrak{A}_1$  bezeichnet man mit  $b^2$  und  $b$  ist also die halbe Nebenaxe der Hyperbel  $H$  und gleichzeitig die halbe Nebenaxe der Ellipse  $E$ :

*Eine Hyperbel und die ihr harmonisch verwandte Ellipse in derjenigen Verwandtschaft, welche den einen Scheitel der Hauptaxe zum Centrum und die Tangente im anderen zur Axe hat, haben gleichgroße Nebenachsen.*

203. Verändert man jetzt die harmonische Verwandtschaft, indem man den einen Scheitel  $\mathfrak{A}$  der Nebenaxe der Ellipse  $E$  zum Centrum und die Tangente in anderen,  $\mathfrak{A}_1$ , zur Axe nimmt, so ist der Ellipse  $E$  eine andere Hyperbel  $\mathfrak{H}$  verwandt, welche denselben Mittelpunkt  $M$  und die Nebenaxe  $b$  der ersteren zur Hauptaxe hat. Den Punkten  $A$  und  $A_1$  sind die unendlich fernen Punkte der Hyperbel  $\mathfrak{H}$  verwandt; diese



hat also die zu  $\mathfrak{A}A$  und  $\mathfrak{A}A_1$  parallelen Geraden zu Asymptoten. Ganz wie vorhin folgert man, daß  $A$  und  $A_1$  konjugierte Punkte der Hyperbel  $\mathfrak{H}$  sind, daß also die Nebenaxe  $2a$  derselben durch die Gleichung  $MA \cdot MA_1 = a^2$  bestimmt ist. Die Hyperbel  $\mathfrak{H}$  hat also mit der Hyperbel  $H$  dieselben Asymptoten und der Richtung nach dieselben, der Größe nach aber vertauschte Haupt- und Nebenachsen. Beide Hyperbeln heißen *konjugierte Hyperbeln*.

Da  $BB_1 = \mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  ist, so folgt:

*Die Asymptoten schneiden auf den Scheiteltangenten die Nebenaxe ab.*

Nennt man den Asymptotenwinkel  $2\alpha$ , so ist

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}.$$

204. Von den beiden konjugierten Hyperbeln liegt jede in zwei Scheitelgebieten der Asymptoten. Die Durchmesser, welche die eine treffen, können die andern nicht schneiden.

Um von einem Punkte  $C$  einer Asymptote an die Hyperbel  $H$  die Tangente zu ziehen, ziehe man  $AC$  bis zum Durch-




Fig. 67.

schnitt in  $C_1$  mit  $\mathfrak{A}_1B_1$ , so sind  $C$  und  $C_1$  verwandte Punkte, weil  $MB_1$  und  $\mathfrak{A}_1B_1$  verwandte Gerade sind; ziehe an die Ellipse  $E$  die Tangente  $C_1D$ , welche die Scheiteltangente



durch  $A_1$  in  $F$  schneidet, dann ist  $CF$  eine Tangente an  $H$ . Den Tangenten von  $E$  sind Tangenten von  $H$  verwandt,  $F$  ist sich selbst verwandt, also muß die der Ellipsen-Tangente  $C_1F$  verwandte Gerade  $CF$  eine Tangente an  $H$  sein.

In analoger Weise zieht man  $\mathfrak{A}C$  bis  $\mathfrak{C}_1$  auf  $A_1B_1$ , die Tangente  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}$  an  $E$ , so ist  $C\mathfrak{F}$  eine Tangente an die konjugierte Hyperbel  $\mathfrak{H}$ .

Aus den ähnlichen Dreiecken  $\mathfrak{A}CB'$  und  $\mathfrak{K}CB_1$ , sowie  $ACB'$  und  $KCB_1$  folgt

$$B'C : B_1C = \mathfrak{A}C : \mathfrak{K}C = AC : KC,$$

also 
$$A\mathfrak{A} \parallel K\mathfrak{K} \parallel MB \parallel C\mathfrak{C}_1$$

und daher 
$$C_1H = \mathfrak{C}_1H.$$

Ist  $G$  der Schnittpunkt der Tangente  $C_1F$  mit  $MB_1$ , so muß die Polare von  $G$  bezüglich der Ellipse  $E$  parallel der zu  $MG$  konjugierten Durchmesser-richtung  $MB$  sein; die von der Ellipse auf der Polare abgeschnittene Sehne wird durch  $GM$  halbiert. Die zweite von  $G$  an die Ellipse gezogene Tangente muß daher die zur Polare parallele Gerade  $C_1\mathfrak{C}_1$  in einem solchen Punkte  $X$  schneiden, daß  $C_1H = XH$  ist; also fällt  $\mathfrak{C}_1$  mit  $X$  zusammen, die Tangente  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}$  geht durch  $G$  und  $D\mathfrak{D}$  ist die Polare von  $G$ , also parallel zu  $BM$ .

Jedem umgeschriebenen Vierseite  $B_1C_1G\mathfrak{C}_1$  ist der Schnittpunkt der Diagonalen  $C_1\mathfrak{C}_1$  und  $F\mathfrak{F}$  der Pol der dritten Diagonale  $B_1G$ ; da dieser im Unendlichen liegt, so ist  $F\mathfrak{F} \parallel C_1\mathfrak{C}_1 \parallel N\mathfrak{N}$ . Daher ist auch

$$MN = M\mathfrak{N}.$$

Macht man  $M\mathfrak{C} = MC$ , so ist  $N\mathfrak{C}$  eine Tangente von  $\mathfrak{H}$ ,  $\mathfrak{N}\mathfrak{C}$  eine von  $H$  und zwar ist

$$CN \parallel \mathfrak{C}\mathfrak{N}, \mathfrak{C}N \parallel C\mathfrak{N}.$$

Daraus folgt: *Parallele Tangenten einer Hyperbel  $H$  schneiden die Asymptoten in solchen Punkten, deren Verbindungslinien parallele Tangenten der konjugierten Hyperbel  $\mathfrak{H}$  sind.*

205. Die Gerade  $AD$  trifft  $CN$  im Berührungspunkte  $D_1$  mit der Hyperbel  $H$ ; die Polare von  $D'$  geht durch  $D$  und steht auf  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  im harmonischen Gegenpunkte zu  $D'$  senkrecht, also sind  $C_1C_1'DD'$  harmonische Punkte; ihnen sind



verwandt  $CND_1$  und der unendliche ferne Punkt auf  $CN$ , daher ist

$$CD_1 = ND_1, \text{ d. h.}$$

*Die Strecke einer Hyperbeltangente zwischen den Asymptoten wird durch den Berührungspunkt halbiert.*

206. Die Gerade  $AD$  trifft die Tangente  $N\mathfrak{C}$  der konjugierten Hyperbel auch im Halbierungspunkte  $\mathfrak{D}_1$ ; deshalb sind die Radien  $MD_1$  und  $M\mathfrak{D}_1$  konjugierte Radien bezüglich beider Hyperbeln  $H$  und  $\mathfrak{H}$ , da sie durch die Asymptoten harmonisch getrennt werden.

Es soll der Pol von  $C\mathfrak{N}$  bezüglich  $H$  ermittelt werden. Man weiß, daß er auf  $M\mathfrak{D}_1$  liegen muß und der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Polare von  $C$  ist. Letztere geht aber durch  $D_1$  und ist der Asymptote  $C\mathfrak{C}$  parallel, trifft also die Tangente  $N\mathfrak{C}$  in ihrem Halbierungspunkte  $\mathfrak{D}_1'$ , der auf  $M\mathfrak{D}_1$  und der Hyperbel  $\mathfrak{H}$  liegt. Also sind  $\mathfrak{D}_1$  und  $\mathfrak{D}_1'$  konjugierte Punkte der Hyperbel  $H$  und die Schnittpunkte von  $\mathfrak{H}$  mit dem Durchmesser  $\mathfrak{D}_1\mathfrak{D}_1'$ . Bezeichnet man mit  $QQ_1$  irgend zwei konjugierte Punkte dieses Durchmessers bezüglich der Hyperbel  $H$ , so folgt wegen der Gleichung

$$M\mathfrak{D}_1^2 = MQ \cdot MQ_1,$$

daß sie auch konjugiert bezüglich der konjugierten Hyperbel  $\mathfrak{H}$  sind. Also:

*Zwei konjugierte Punkte eines Durchmessers der Hyperbel  $H$  sind auch konjugiert für die konjugierte Hyperbel. Diese bestimmt auf den Durchmessern, welche  $H$  nicht treffen, die GröÙe derselben.*

207. Da jeder Durchmesser einer Hyperbel beide Zweige derselben oder keinen Zweig schneidet, so folgt:

*Irgend zwei parallele Tangenten einer Hyperbel berühren beide Zweige derselben.*

Von jedem Punkte  $R$  einer Asymptote läßt sich noch eine zweite Tangente an die Hyperbel ziehen. Ist der Asymptotenwinkel  $2\alpha$  ein spitzer, so gelangt  $R$ , wenn er eine Asymptote durchläuft, auch in eine Lage  $S$ , von der aus sich eine zur Asymptote senkrechte Tangente ziehen läßt, denn der Winkel  $FRU$ , wo  $U$  der unendlich ferne Berührungspunkt der Asymptote ist, wächst kontinuierlich von  $\alpha$  bis  $180^\circ$ .



Wenn der Winkel  $2\alpha$  ein stumpfer ist, so giebt es einen solchen Punkt nicht. Demnach existiert der Kreis  $\mathfrak{R}$ , von dessen Punkten sich rechtwinklige Tangenten an eine Hyperbel ziehen lassen, sobald der Asymptotenwinkel, in welchem die Hyperbel liegt, ein spitzer ist. Dann ist  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}$ , also  $a > b$

Man findet seinen Radius, wenn man in  $M$  auf einer Asymptote eine Senkrechte errichtet, zu ihr in Bezug auf beide Asymptoten den harmonischen Gegenstrahl konstruiert, mit demselben die Hyperbel schneidet und in einem Schnittpunkte die Tangente bis zum Durchschnitte  $R$  mit der Asymptote konstruiert, auf welcher sie senkrecht steht; dann ist  $MR$  der gesuchte Radius.

208. *Harmonische Verwandtschaft zwischen einem Kreise und einer gleichseitigen Hyperbel.*

In einem Kreise  $M$  ziehe man einen Durchmesser  $AA_1$ ,




Fig. 68.

in  $A_1$  die Tangente, wähle  $A$  und diese Tangente als Centrum und Axe einer harmonischen Verwandtschaft, so ist dem Kreise  $M$  eine Hyperbel  $H$  verwandt, welche senkrechte Asymptoten hat. Diese ist eine gleichseitige. Eine Gerade durch  $A$  schneide Kreis und Hyperbel in  $B$  und  $B_1$ ;

man fälle  $BC$  und  $B_1C_1$  senkrecht auf  $AA_1$ , so ist

$$BC : B_1C_1 = AC : AC_1.$$

Ferner

$$BC^2 = AC \cdot A_1C.$$

Da  $AA_1CC_1$  harmonisch sind, so ist  $AC : A_1C = AC_1 : A_1C_1$  also

$$B_1C_1^2 = \frac{BC^2 \cdot AC_1^2}{AC^2} = \frac{A_1C \cdot AC_1^2}{AC} = AC_1 \cdot A_1C_1.$$

Also:

a. *Eine gleichseitige Hyperbel und ein Kreis, welcher die-*



*selbe in den Scheiteln der Hauptaxe berührt, Scheitellkreis, sind harmonisch verwandt.*

b. *Die Senkrechte aus einem Punkte einer gleichseitigen Hyperbel auf die Hauptaxe ist die mittlere Proportionale zwischen den Abschnitten, in welche sie dieselbe zerlegt.*

Da  $C$  und  $C_1$  konjugierte Punkte für den Kreis sind, so ist  $C_1B$  Tangente an denselben und

$$C_1B^2 = AC_1 \cdot A_1C_1 = C_1B_1^2, \text{ also}$$

c. *Errichtet man in einem Punkte der Hauptaxe einer gleichseitigen Hyperbel eine halbe senkrechte Sehne und zieht von ihm die Tangente an den Scheitellkreis, so ist sie gleich der ersteren. Cf. 272 c.*

Unmittelbar aus der Entstehung folgt:

d. *Die konjugierte Hyperbel einer gleichseitigen Hyperbel ist wieder gleichseitig.*

Siehe 202.

209. Es bleibt noch übrig, den Kreis  $\mathfrak{K}$ , den Ort der Fig. 65. Schnittpunkte rechtwinkliger Tangenten, für den Fall der Parabel zu untersuchen. Da auch hier  $QQ_1 = PQ_1$  sein muß, dies aber der Fall ist, wenn  $Q_1$  der Brennpunkt und  $Q$  der Schnittpunkt der Hauptaxe mit der Leitlinie ist, so geht  $\mathfrak{K}$  durch letzteren. Der Mittelpunkt  $M$  liegt bei der Parabel im Unendlichen, also degeneriert  $\mathfrak{K}$  in eine Gerade, die in  $Q$  zur Hauptaxe senkrecht steht, also in die Leitlinie:

*Die Scheitel aller einer Parabel umgeschriebenen rechten Winkel liegen auf der Leitlinie.*

Soll ein Kreis die Leitlinie rechtwinklig schneiden, so muß sein Mittelpunkt auf derselben liegen, also:

*Die Mittelpunkte aller Kreise, welche den Poldreiecken einer Parabel umgeschrieben sind, liegen auf der Leitlinie.*

## § 18.

### Die Parabel.

210. Die Parabel ist der geometrische Ort eines Punktes, dessen Abstände von einem festen Punkte  $B$  und einer festen Geraden  $C$  einander gleich sind;  $B$  und  $C$  sind Brennpunkt



und Leitlinie der Parabel  $\mathfrak{P}$ . Aus der genannten Erklärung lassen sich eine Anzahl von Eigenschaften der Parabel in einfachster Weise herleiten, ohne die Voraussetzung, daß ihr zweiter Brennpunkt im Unendlichen liegt.




Fig. 69.

Vom Brennpunkte  $B$  fälle man  $BC \perp l$ , halbiere  $BC$  in  $A$ , so ist  $A$  der *Scheitel* der Parabel, die Richtung  $AB$  ist die Richtung und Lage ihrer *Hauptaxe*, die Gerade  $a$ , welche in  $A$  senkrecht auf  $BC$  errichtet wird, ist die *Scheiteltangente*. Jede Parallele zur Hauptaxe heisst ein *Durchmesser*.

Um irgend eine andere Tangente und gleichzeitig ihren Berührungspunkt zu konstruieren, verbinde man  $B$

mit einem beliebigen Punkte  $D$  der Leitlinie. Die Strecke  $BD$  wird durch die Scheiteltangente  $a$  in  $E$  halbiert, weil  $AB = AC$  ist. Zieht man noch die Mittelsenkrechte von  $BD$ , so ist sie eine Parabeltangente und ihr Schnittpunkt  $F$  mit der durch  $D$  zur Hauptaxe gezogenen Parallelen ist der Berührungspunkt. Denn da  $FB = FD$ , so ist  $F$  ein Parabelpunkt; auf der Mittelsenkrechten  $EF$  kann es außer  $F$  keinen weiteren Parabelpunkt geben, denn für einen beliebigen Punkt  $X$  von  $EF$  ist  $XB = XD$  und fällt man noch  $XY \perp l$ , so ist  $XY < XD$  also auch  $XY < XB$ , mithin liegt  $X$  nicht auf der Parabel und  $EF$  ist eine Tangente derselben.

Umgekehrt muß der Fußpunkt  $E$  jeder Senkrechten aus dem Brennpunkte auf eine Tangente auf der Scheiteltangente und der Gegenpunkt  $D$  des Brennpunktes in Bezug auf irgend eine Tangente auf der Leitlinie liegen, denn außer den vorhin konstruierten Tangenten kann es keine anderen Parabeltangenten geben. Folglich:

a. Die Fußpunkte der Senkrechten aus dem Brennpunkte auf die Tangenten liegen auf der Scheiteltangente.



b. *Die Gegenpunkte des Brennpunktes in Bezug auf die Tangenten liegen auf der Leitlinie.*

211. Wenn die Leitlinie von der Tangente in  $H$  geschnitten wird, so ist  $HB = HD$ , also ist

$$\triangle BFH \cong FDH$$

und

$$\sphericalangle FBH = FDH = 90^\circ$$

d. h. *die Strecke einer Parabeltangente zwischen dem Berührungspunkte und der Leitlinie erscheint dem Brennpunkte unter einem rechten Winkel.*

212. Ist  $J$  der Schnittpunkt der Tangente  $EF$  mit der Hauptaxe, so ist

$$\triangle DEF \cong BEJ,$$

also

$$EF = EJ,$$

d. h. *die Strecke einer Parabeltangente zwischen dem Berührungspunkte und der Hauptaxe wird durch die Scheiteltangente halbiert.*

213. Durch den Punkt  $H$  der Leitlinie lege man die Parabelsehne  $SS_1$ , welche der Brennstrahl  $BF$  nach dem Berührungspunkte in  $K$  schneidet; von  $S$  und  $S_1$  fälle man  $ST$  und  $S_1T_1$  senkrecht auf die Leitlinie  $l$ , dann ist

$$SB = ST, S_1B = S_1T_1,$$

$$ST : S_1T_1 = SH : S_1H = SB : S_1B,$$

also ist  $BH$  eine Halbierungslinie des Nebenwinkels von  $SB S_1$  und da  $BH \perp BK$ , so sind

$$B(SS_1HK)$$

harmonische Strahlen.

Nennt man noch  $BK$  die Polare von  $H$ ,  $H$  den Pol von  $BK$ , so folgt:

a. *Jede Parabelsehne wird durch ihren Schnittpunkt mit der Leitlinie und seine Polare harmonisch geteilt.*

b. *Die Polare eines Punktes der Leitlinie trifft die Parabel in den Berührungspunkten seiner Tangenten.*

c. *Der Pol einer Brennpunktsehne liegt auf der Leitlinie senkrecht über dem Brennpunkte.*

214. Eine zweite Tangente  $E_1F_1$  schneide die erste  $EF$  in  $G$ . Dann ist

$$GD = GB = GD_1.$$



Hieraus ergibt sich eine Konstruktion der Parabeltangente von einem Punkte  $G$ . Man beschreibe um  $G$  mit seiner Brennpunktsentfernung  $GB$  einen Kreis, welcher die Leitlinie in  $D$  und  $D_1$  trifft, so schneiden die in  $D$  und  $D_1$  errichteten Senkrechten die Parabel in den gesuchten Berührungspunkten.

Eine zweite Konstruktion ergibt sich aus  $a$ . Man beschreibe über  $GB$  als Durchmesser einen Kreis, welcher die Scheiteltangente in  $E$  und  $E_1$  trifft; es sind dann  $GE$  und  $GE_1$  die Tangenten.

Eine dritte Konstruktion folgt aus  $b$ . und  $c$ . Man ziehe  $GB$ , errichte in  $B$  auf  $GB$  die Senkrechte, so trifft sie die Parabel in den Berührungspunkten.

Ist  $HF'$  die zweite Tangente vom Punkte  $H$  der Leitlinie,  $F'D' \perp l$ , so ist

$$HD = HB = HD',$$

also

$$\sphericalangle DBD' = 90^\circ = FHF'$$

d. h. die Tangenten von einem Punkte der Leitlinie stehen aufeinander senkrecht.

215. Man erkennt die Parabel als Tangentengebilde aus den Sätzen 210a und 214, welche in anderer Fassung lauten:

a. Bewegt sich der Scheitel eines rechten Winkels auf einer Geraden  $a$  und dreht sich der eine Schenkel um einen festen Punkt  $B$ , so beschreibt der andere eine Parabel mit dem Brennpunkte  $B$  und der Scheiteltangente  $a$ .

b. Bewegt sich die Spitze eines rechtwinkligen Dreiecks auf einer Geraden  $l$  und dreht sich die Hypotenuse um den festen Fußpunkt  $B$  der Hypotenusenhöhe, so beschreiben die Katheten eine Parabel, deren Brennpunkt  $B$  und deren Leitlinie  $l$  ist.

Fällt man noch  $GM \perp l$ , so ist

$$\begin{aligned} \sphericalangle FBG &= FDG = 180^\circ - DGM = 180^\circ - D_1GM \\ &= F_1D_1G = F_1BG, \text{ also:} \end{aligned}$$

c. Verbindet man den Brennpunkt mit den Berührungspunkten und dem Schnittpunkte zweier Tangenten, so halbiert die letzte Verbindungslinie den von den beiden ersten gebildeten Winkel.

Da  $\sphericalangle DFE = BFE$ , so folgt:

d. Jede Tangente einer Parabel bildet mit dem Brennpunkts-



strahle und dem Durchmesser ihres Berührungspunktes gleiche Winkel.

216.  $\sphericalangle MGH_1 = EE_1B$ , denn ihre Schenkel stehen senkrecht auf einander. Die Punkte  $BEE_1G$  liegen auf einem Kreise, denn  $\sphericalangle BEG = BE_1G = 90^\circ$ , also  $\sphericalangle EE_1B = EGB$  und

$$\sphericalangle MGH_1 = EGB,$$

d. h. a. Je zwei Tangenten bilden mit dem Brennpunktstrahle und dem Durchmesser ihres Schnittpunktes gleiche Winkel.

Da  $\sphericalangle FBE = JBE$  und  $\sphericalangle F_1BE_1 = JBE_1$ , so ist

$$\sphericalangle EBE_1 = \frac{1}{2} FBF_1 = 180^\circ - EGE_1,$$

d. h. b. Der Winkel, unter welchem das Stück der Scheiteltangente zwischen zwei beliebigen Parabeltangenten dem Brennpunkte erscheint, ist die Hälfte des Winkels, den die Brennstrahlen nach den Berührungspunkten bilden, und ergänzt den Tangentenwinkel zu  $2R$ .

217.  $PP_1P_2$  seien die Ecken eines von drei Tangenten gebildeten Dreiecks. Nach 215c ist

$$\sphericalangle FBP_2 = F_1BP_2, \quad FBP_1 = F_2BP_1,$$

also

$$\sphericalangle P_1BP_2 = \frac{1}{2} F_1BF_2 = E_1BE_2 = 2R - E_1PE_2 \quad (216).$$




Fig. 70.



Hält man die Tangenten  $PF_1$  und  $PF_2$  fest, nimmt aber die dritte  $P_1P_2$  veränderlich, so folgt aus der letzten Gleichung:

a. Die Strecke, welche zwei feste Tangenten auf einer beweglichen begrenzen, erscheint dem Brennpunkte unter einem konstanten Winkel, der den Winkel der festen Tangenten zu  $2R$  ergänzt.

b. Die Ecken eines Tangentendreiecks und der Brennpunkt liegen auf einem Kreise.

218. Die Fußpunkte der Senkrechten aus dem Brennpunkte auf die Tangenten,  $EE_1E_2$ , liegen auf einer Geraden, der Scheiteltangente. Diese letzte Eigenschaft läßt sich verallgemeinern, sie gilt für jeden beliebigen Punkt auf der Peripherie des dem Dreieck  $PP_1P_2$  umgeschriebenen Kreises.




Fig. 71.

Es sei also  $PP_1P_2$  ein beliebiges dem Kreise  $K$  eingeschriebenes Dreieck,  $B$  irgend ein Punkt von  $K$ , es seien  $BE \perp P_1P_2$ ,  $BE_1 \perp PP_2$ . Man ziehe  $EE_1$  bis zum Durchschnitte in  $E_2$  mit  $PP_1$ , so ist zu zeigen, daß  $BE_2 \perp PP_1$  steht.

Im Dreiecke  $PP_1P_2$  und im Kreisvierecke  $PP_1BP_2$  ist

$$\alpha + \beta + \gamma = 2R$$

$$\alpha + \varepsilon_1 + \angle EBP_1 = 2R,$$

also da  $\gamma = \delta + \varepsilon$  und  $\varepsilon = \varepsilon_1$  im Kreisviereck  $BEE_1P_2$  ist,

$$\beta + \delta = \angle EBP_1.$$

Als Scheitelwinkel ist  $\delta = \delta_1$ , daher  $\angle \beta + \delta + \angle EE_2P_1 = 2R$ , also auch

$$\angle EBP_1 + \angle EE_2P_1 = 2R.$$

Das Viereck  $BEE_2P_1$  ist also ein Kreisviereck und weil  $\angle BEP_1 = 1R$ , so muß auch  $\angle BE_2P_1 = 1R$  sein.

Mithin:

a. Fällt man aus einem beliebigen Punkte des umgeschriebenen Kreises Senkrechte auf die Seiten, so liegen die Fußpunkte in einer Geraden.



Aus diesem Satze folgt:

b. *An einem Dreiecke giebt es unendlich viele Berührungsparabeln; der Ort ihrer Brennpunkte ist der umgeschriebene Kreis.*

219. Legt man durch den Brennpunkt  $B$  irgend einen Kreis  $K$  und zieht von einem Punkte  $P$  desselben die Tangenten an die Parabel, welche den Kreis  $K$  in  $P_1$  und  $P_2$  schneiden und von  $P_1$  die zweite Tangente an die Parabel, so muß sie wegen b. den Kreis  $K$  in  $P_2$  schneiden. Daraus aber folgt:

*Einem Kreise durch den Brennpunkt einer Parabel lassen sich unendlich viele Tangendendreiecke der Parabel einschreiben.*

220. Es sei  $ABC$  ein beliebiges einem Kreise eingeschriebenes Dreieck,  $P$  ein beliebiger Punkt seiner Peripherie,  $PE_1 \perp AC$ ,  $PE_1 = E_1E_2$ ,  $H$  der Höhenpunkt, also  $HB_1 = B_1B_2$  und  $HC_1 = C_1C_2$ ,  $Q$  der Schnittpunkt von  $E_2H$  mit  $AC$ , dann ist

$$\triangle CHQ \cong CB_2Q,$$

$$\sphericalangle QHC_2 = CQH + HCQ = B_2QC + QCB_2.$$




Fig. 72.

Zieht man  $B_2G \parallel CA$ , so ist Bogen  $B_2C = \text{Bogen } AG$  und  $\sphericalangle B_2QC = GB_2P$ , also

$$\sphericalangle QHC_2 = GB_2P + QCB_2.$$

Die beiden Peripheriewinkel auf der rechten Seite stehen auf den Bogen  $GP$  und  $AB_2$ , deren Summe

$$\widehat{PA} + \widehat{AG} + \widehat{AG} + \widehat{GB_2} = \widehat{PA} + \widehat{AG} + \widehat{B_2C} + \widehat{GB_2} = \widehat{PC}$$

ist. Daher ist

$$\sphericalangle QHC_2 = \sphericalangle HC_2P.$$



Die Geraden  $HQ$  und  $C_2P$  treffen sich also in einem Punkte  $R$  von  $AB$  und fällt man  $PD_1 \perp AB$  und verlängert  $PD_1$  bis zum Durchnitte  $D_2$  mit  $QR$ , so ist

$$PD_1 = D_1 D_2.$$

Ebenso läßt sich zeigen, daß der Gegenpunkt von  $P$  bezüglich der Seite  $BC$  auf der Geraden  $PQ$  liegt. Somit folgt:

*Zeichnet man in einen Kreis ein Dreieck, so liegen die Gegenpunkte eines beliebigen Peripheriepunktes bezüglich der Seiten auf einer Geraden, welche durch den Höhenpunkt des Dreiecks geht.*

221. Ist das Dreieck ein Tangentendreieck der Parabel, so geht der umgeschriebene Kreis durch den Brennpunkt. Die Gegenpunkte desselben bezüglich der Tangenten liegen auf der Leitlinie, also geht diese (220) durch den Höhenpunkt des Tangentendreiecks:

*Der Höhenpunkt jedes Tangentendreiecks der Parabel liegt auf der Leitlinie.*

222.  $PP_1P_2P_3P_4P_5$  seien die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits. Um die Dreiecke  $PP_1P_2$  und  $P_2P_3P_4$  beschreibe man Kreise, die sich noch in  $B$  schneiden, dann ist

$$\sphericalangle PBP_2 = 2R - \alpha,$$

$$P_2BP_3 = 2R - \beta$$

$$\sphericalangle PBP_4 = \sphericalangle PBP_2 +$$

$$P_2BP_4 = 2R - \alpha + \gamma =$$

$$2R - (\alpha - \gamma) = 2R - \delta,$$

also ist  $PBP_4P_5$  ein Kreisviereck und in gleicher Weise läßt sich zeigen, daß auch  $P_3BP_1P_5$  ein Kreisviereck ist. Beschreibt man daher

um die Dreiecke  $PP_4P_5$  und  $P_1P_3P_5$  Kreise, so schneiden sich diese auch in  $B$ , also:

*Beschreibt man um die vier Dreiecke, in welchen sich vier Gerade schneiden, Kreise, so treffen sie sich in einem Punkte.*

223. Fällt man aus  $B$  Senkrechte auf die vier Seiten des Vierseits, so müssen ihre Fußpunkte wegen 218. auf einer Ge-




Fig. 73.



raden und die Gegenpunkte von  $B$  in Bezug auf die vier Seiten wegen 220. auf einer anderen Geraden liegen. Auf dieser liegen auch die Höhenpunkte der vier Dreiecke, welche die vier Geraden bilden:

*Die Höhenpunkte der vier Dreiecke, welche von vier Geraden gebildet werden, liegen in einer Geraden.*

224. Aus 218, 222, 223 folgt:

*Vier Tangenten bestimmen eine Parabel.*

225. Läßt man die beiden Tangenten  $P_1P_3$  und  $P_5P_3$  zusammenfallen, so wird  $P_3$  der Berührungspunkt; die Kreise durch  $P_1P_5P_3$  und  $P_2P_4P_3$  gehen in diejenigen Kreise durch  $P_3$  über, welche  $PP_1$  in  $P_1$  und  $PP_2$  in  $P_2$  berühren.




Fig. 74.

Die Kreise durch  $PP_1P_2$  und  $P_1BP_3$ , welcher letztere  $PP_1$  in  $P_1$  berührt, schneiden sich noch in  $B$ , dann ist

$$\sphericalangle PP_1P_2 + PBP_2 = 180^\circ,$$

$$\sphericalangle CP_1P_3 = P_1BP_3.$$

Als Außenwinkel ist

$$\sphericalangle CP_1P_3 = P_1PP_2 + PP_2P_1 = P_1BP_2 + DP_2P_3,$$

also  $P_1BP_2 + DP_2P_3 = P_1BP_3 = P_1BP_2 + P_2BP_3$

und  $DP_2P_3 = P_2BP_3.$

Folglich geht der Kreis, welcher durch  $P_3$  gelegt wird und  $PD$  in  $P_2$  berührt, auch durch  $B$ . Daraus aber folgt:

*Drei Tangenten und der Berührungspunkt auf einer bestimmen eine Parabel.*

226. Es mögen im Vierseit  $PP_1P_2P_3P_4P_5$  (Fig. 73) die beiden Paare von Gegenseiten zusammenfallen; es sind dann (Fig. 75)  $PP_1$  und  $PP_2$  zwei Tangenten mit den Berührungspunkten  $P_1$  und  $P_2$ . Durch  $P_1$  lege man einen Kreis, der  $PP_2$  in  $P$  berührt und durch  $P_2$  einen anderen, der  $PP_1$  in  $P$  berührt; beide schneiden sich in  $B$ . Dann ist nach einem bekannten Kreissatze

$$\sphericalangle \alpha = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3, \gamma = \gamma_1, \beta = \beta_1.$$



Macht man Sehne  $PC = PD = PD = PB$ , so ist  $\sphericalangle \beta = \beta_2$ ,  $\gamma = \gamma_2$ . Da  $\sphericalangle \alpha_1 + \beta_2 + \gamma_3 = 2R = \alpha_3 + \beta_1 + \gamma$ , so ist

$$\sphericalangle \gamma_3 = \gamma = \gamma_2$$

und

$$P_1C \parallel P_2D.$$

Zieht man  $BE \parallel P_2D$  und fällt  $BF \perp PP_1$ ,  $BG \perp PP_2$ , so kann man  $B$  als Brennpunkt,  $BE$  als Axe,  $FG$  als Scheiteltangente einer Parabel ansehen, welche in  $P_1$  und  $P_2$  die Geraden  $PP_1$  und  $PP_2$  berührt. Somit folgt:




Fig. 75.

*Zwei Tangenten und ihre Berührungspunkte bestimmen eine Parabel.*

### 227. Die Schnittpunkte einer Geraden mit der Parabel.

Eine Parabel sei gegeben durch den Brennpunkt  $B$  und die Leitlinie  $l$ ; sie werde von einer Geraden  $g$  geschnitten. Man




Fig. 76.

beschreibe um die Punkte von  $g$  mit ihren Entfernungen von  $B$  Kreise; diese bilden ein Büschel, denn sie treffen sich noch in dem Gegenpunkte  $B_1$  von  $B$  in Bezug auf  $g$ . Unter ihnen giebt es zwei, mit den Mittelpunkten  $P$  und  $Q$ , welche  $l$  in  $P_1$  und  $Q_1$  berühren. Da  $PP_1 \perp l$ ,  $QQ_1 \perp l$ ,  $PP_1 = PB$ ,  $QQ_1 = QB$ , so sind  $P$  und  $Q$  die Schnittpunkte von  $g$  mit der Parabel. — *Die Parabel hat also höchstens zwei Schnittpunkte mit einer Geraden gemein.*

228. Die Gerade  $BB_1$  steht auf  $g$  senkrecht, sie schneide  $l$  in



$S_1$ , dann ist  $P_1S_1 = Q_1S_1$ , denn die gemeinschaftliche Sehne zweier Kreise, Potenzlinie, halbiert das zwischen den Berührungspunkten liegende Stück einer gemeinschaftlichen Tangente (28). Zieht man durch  $S_1$  die Parallele  $S_1R_1$  zu  $PP_1$ , so ist auch  $PR_1 = QR_1$ . Jede zu  $PQ$  parallele Parabelsehne wird, da die Richtung von  $BB_1$  ungeändert bleibt, auch durch  $S_1R_1$  halbiert. Ist  $S$  der Schnittpunkt von  $S_1R_1$  mit der Parabel, so nennt man die Richtung derjenigen Parabelsehnern, welche durch den Durchmesser  $S_1S$  von  $S$  halbiert werden, zu diesem Durchmesser *konjugiert*. In einem Satze:

*Die Halbierungspunkte aller parallelen Parabelsehnern liegen auf einem Durchmesser, dem konjugierten Durchmesser.*

229. In  $P$  und  $Q$  ziehe man die Tangenten, die sich in  $R$  schneiden, dann sind  $PR$  und  $QR$  die Mittelsenkrechten von  $BP_1$  und  $BQ_1$ , also  $RB = RP_1 = RQ_1$  und daher  $RS_1 \perp P_1Q_1$ ; mithin liegt  $R$  auf der Geraden  $SS_1$ :

a. *Die Tangenten in den Endpunkten einer Sehne schneiden sich auf dem zur letzteren konjugierten Durchmesser.*

Zieht man demnach in  $S$  die Tangente und schneidet sie mit  $RP$  und  $RQ$  in  $P_2$  und  $Q_2$ , so liegen  $P_2$  und  $Q_2$  auf den zu  $RP$  und  $RQ$  konjugierten Durchmessern, welche die Sehnen  $PS$  und  $QS$  und daher auch  $PR$  und  $QR$  halbieren, folglich ist

$$P_2Q_2 \parallel PQ \text{ und } RS = R_1S:$$

b. *Die Tangente in einem Parabelpunkte ist den zu seinem Durchmesser konjugierten Sehnen parallel.*

c. *Die Strecke eines Durchmessers zwischen einem seiner Punkte und dessen Berührungssehne wird durch die Parabel halbiert.*

230. *Die Polareigenschaften.*

Die Bezeichnungen der vorigen Nummer werden festge- Fig. 77. halten. Durch  $R$  ziehe man eine beliebige Gerade  $h$ , welche die Parabel in  $M$  und  $N$  und die Berührungssehne  $PQ$  in  $E$  schneidet. Der Schnittpunkt von  $h$  mit der Tangente in  $S$  sei  $D$ . Die Projektionen von  $DEM N$  auf die Leitlinie seien  $D_1E_1M_1N_1$ .

Die Tangente  $DS$  ist die Mittelsenkrechte von  $BS_1$ , also ist  $DB = DS_1$ . Da  $RS = R_1S$  und  $SD \parallel PQ$ , so ist auch  $RD = DE$  und  $DS_1 = DE_1$ . Es läßt sich also um  $D$  ein







Zieht man durch  $M$  und  $N$  zu  $ER_1$ , die parallelen Parabelsehn  $MM'$  und  $NN'$  und durch  $R$  die Parallele  $RR'$  so sind die Geraden  $RR'$ ,  $EE'$ ,  $MM'$ ,  $NN'$  harmonisch und da  $RM'E'N'$  auf einer Geraden liegen, so müssen sich  $M'N$  und  $MN'$  in  $R_1$  schneiden. Daher werden die Parabelsehn  $MN'$  und  $M'N$  durch  $R_1$  und  $RR'$  harmonisch geteilt. Da  $M$  und  $N$  beliebig waren, so gilt allgemein der Satz:

b. *Alle durch einen innerhalb der Parabel liegenden Punkt gelegten Sehnen werden durch diesen und eine Gerade, seine Polare, harmonisch geteilt. Diese ist konjugiert zu dem durch den Punkt gehenden Durchmesser.*

### 231. Quadratur der Parabel.

In den Punkten  $A$  und  $B$  der Parabel seien die Tangenten gezogen, sie mögen sich in  $C$  schneiden. Durch  $C$  ziehe man die Parallele zur Axe, welche die Berührungssehne in  $D$ , die Parabel in  $E$  schneiden mag, dann ist nach dem letzten Satze

$$CE = DE$$

weil der unendlich grofse Durchmesser in  $C$  und  $D$  harmonisch geteilt wird. Die Tangente in  $E$  mufs durch den im Unendlichen liegenden Pol des Durchmessers  $CD$  gehen, also ist

$$FG \parallel AB.$$

Daher ist, wenn man

$$\begin{aligned} \text{Dreieck } ABC &= \triangle \text{ setzt,} \\ CFG &= \frac{1}{4} \triangle \end{aligned}$$

Die beiden Dreiecke  $AEF$  und  $BEF$  sind gleich  $\frac{1}{8} \triangle$ . Schneidet man die Parabel mit den Durchmessern durch  $F$  und  $G$  in  $H$  und  $J$ , und zieht durch diese Punkte Tangenten, so schneiden sie von den Dreiecken  $AEF$  und  $BEF$  je ein Viertel, also zusammen  $\frac{1}{16} \triangle$  ab.

Fährt man so fort, so zerteilt man das von den Tangenten  $AC$  und  $BC$  und der Parabel gebildete Segment in



$$\frac{1}{4} \Delta + \frac{1}{16} \Delta + \frac{1}{64} \Delta + \dots = \frac{1}{3} \Delta$$

folglich ist das von der Berührungssehne und der Parabel begrenzte Segment gleich  $\frac{2}{3} \Delta$ :

*Jedes Parabelsegment beträgt zwei Drittel desjenigen Dreiecks, welches die Sehne mit den Tangenten in den Endpunkten bildet.*

Es sei  $ABC$  ein beliebiges der Parabel eingeschriebenes




Fig. 77 b.

Dreieck; die Tangenten durch seine Ecken schneiden sich in Punkten  $A_1B_1C_1$ . — Wenn man von dem Tangentenwinkelsegmente  $ABC_1$  die beiden Tangentenwinkelsegmente  $ACB_1$  und  $BCA_1$  abzieht, so behält man das Tangentendreieck  $A_1B_1C_1$ . Da die genannten drei Segmente die Hälften der Parabelsegmente  $(AB)$ ,  $(AC)$ ,  $(BC)$  sind und die Differenz zwischen dem ersten und der Summe der beiden anderen das Dreieck  $ABC$  ist, so ist Dreieck

$$A_1B_1C_1 = \frac{1}{2} ABC, \text{ also:}$$

*Das von drei Tangenten gebildete Dreieck ist halb so groß als das Dreieck ihrer Berührungssehnen.*




Fig. 77 c.

Um den Inhalt eines Parabelsektors  $BDE$ , dessen Scheitel  $B$  der Brennpunkt ist, zu bestimmen, denke man sich denselben in unendlich kleine Dreiecke zerlegt, die sämtlich eine Ecke in  $B$  haben. Es sei  $GH$  ein unendlich kleiner Parabelbogen, so daß er mit seiner Tangente zusammenfällt und  $D$  seine Mitte ist. Fällt man  $GG_1$  und  $HH_1$  senkrecht auf die Leitlinie, so ist  $BH = HH_1$ ,  $BG =$







Es sei  $B$  ein fester Punkt und  $K'$  um  $B'$  ein fester Kreis mit dem Radius  $2a$ . Man ziehe durch  $B$  und  $B'$  den Durchmesser  $CC'$ , halbiere  $BC$  in  $A$  und  $BC'$  in  $A'$ , so sind  $A$  und  $A'$  gleichweit von  $B$  und dem Kreise entfernt, also Punkte des Ortes.

Andere Punkte und gleichzeitig ihre Tangenten findet man durch folgende Konstruktion. Man verbinde  $B$  und  $B'$  mit einem beliebigen Punkte  $E'$  von  $K'$ , zeichne über  $AA'$  als Durchmesser einen Kreis  $M$ , welcher *Scheitelkreis* genannt wird und errichte im Schnittpunkte  $D$  von  $BE'$  mit dem Scheitelkreise die Senkrechte  $d$ , so ist sie eine Tangente des Ortes und ihr Schnittpunkt  $E$  mit  $B'E'$  ist ein Punkt desselben. Um das erste zu beweisen, zeige man, daß es außer  $E$  auf  $d$  keinen Punkt des Ortes giebt. Ist  $X$  ein beliebiger Punkt von  $d$ , so ist  $XB = XE' > XY$ , wenn  $Y$  der Durchschnitt von  $B'X$  mit  $K'$  ist. Also ist  $d$  eine Tangente. Da aber  $EB = EE'$  so ist  $E$  ein Punkt des Ortes. Dieser Ort heißt Ellipse oder Hyperbel, je nachdem  $B$  innerhalb oder außerhalb des Kreises  $K'$  liegt.

Die Tangente  $d$  schneide den Scheitelkreis  $M$  noch in  $D_1$ , dann ist aus Symmetriegründen  $B'D_1 \perp d$ . Verlängert man  $BE$  und  $B'D_1$  bis zum Durchschnitte in  $E_1$ , dann ist wegen Gleichheit der Winkel  $\alpha\beta\gamma\delta$  die Strecke  $B'E_1$  in  $D_1$  halbiert und  $EB' = EE_1$ , also auch

$$BE_1 = B'E' = 2a.$$

Beschreibt man demnach um  $B$  einen Kreis  $K$  mit dem Radius  $2a$ , so kann man denselben Ort auch mittelst des festen Punktes  $B'$  und des festen Kreises  $K$  erzeugen. Deshalb ist  $B'$  der zweite Brennpunkt,  $K$  der zweite Leitkreis.

Weil  $\sphericalangle \beta = \alpha = \gamma$ , so folgt:

a. *Jede Tangente einer Ellipse oder Hyperbel bildet mit den Brennpunktsstrahlen nach dem Berührungspunkte gleiche Winkel.*

Da  $BE \pm B'E = B'E' = 2a$ , so schließt man:

b. *Bei einer Ellipse ist die Summe, bei einer Hyperbel die Differenz zweier Brennpunktsstrahlen konstant gleich dem Radius des Leitkreises.*

Es stehen  $BD$  und  $B'D_1$  auf der Tangente senkrecht, also:



c. Die Fußpunkte aller Senkrechten, die sich von den Brennpunkten auf die Tangenten einer Ellipse oder Hyperbel fällen lassen, liegen auf einem Kreise, dem Scheitelkreise.

233. Eine zweite Tangente  $f$  schneide  $d$  in  $H$ ; sie schneide den Scheitelkreis  $M$  in  $F$ , dann ist  $\sphericalangle BFH = 90^\circ$ . Da auch  $BDH = 90^\circ$ , so sind  $D$  und  $F$  die Schnittpunkte des Scheitelkreises mit dem über  $BH$  als Durchmesser konstruierten Kreise. Darin liegt aber die Konstruktion der Tangenten von einem Punkte  $H$  an eine Ellipse oder Hyperbel.

Da  $BD = DE'$ ,  $BF = FG'$ ,  
so ist  $HE' = HB = HG'$

Ferner ist  $B'E' = B'G' = 2a$ ,  
also sind die Dreiecke  $HE'G'$  und  $B'E'G'$  gleichschenkelig und  
 $\sphericalangle EB'H = G'B'H$ .

$E$  und  $G$  sind aber die Berührungspunkte der Tangenten  $EH$  und  $GH$ , also gilt der Satz:

Verbindet man einen Brennpunkt mit den Berührungspunkten und dem Schnittpunkte zweier Tangenten, so halbiert die letzte Verbindungslinie den von den beiden ersten gebildeten Winkel.

234. Eine beliebige Tangente schneide die beiden festen




Fig. 79.

Tangenten  $HE$  und  $HG$  in  $C$  und  $D$ , dann ist nach dem vorigen Satze  $\sphericalangle \alpha = \beta$ ,  $\gamma = \delta$ , also  $\beta + \gamma = \frac{1}{2}EBG$ :



*Die Strecke einer beweglichen Tangente zwischen zwei festen Tangenten erscheint jedem Brennpunkte unter konstantem Winkel.*

Nimmt man den Punkt  $H$  auf der Nebenaxe und die Tangente  $FK$  parallel der Hauptaxe, so ist  $\sphericalangle FBK = \sphericalangle FB'K$ , also liegen  $BB'FK$  auf einem Kreise. Da aber  $\sphericalangle FBK = \sphericalangle CBD$ ,  $\sphericalangle FB'K = \sphericalangle CB'D$ , so ist auch  $\sphericalangle CBD = \sphericalangle CB'D$  und es liegen auch  $BB'CD$  auf einem Kreise:

*Die Punkte, in denen eine bewegliche Tangente zwei feste Tangenten trifft, die sich auf der Nebenaxe schneiden, liegen mit den Brennpunkten auf einem Kreise.*

Aus diesem Satze ergibt sich eine einfache Konstruktion des Kegelschnittes aus seinen Tangenten. Man beschreibe um die Punkte der Mittelsenkrechten zweier Punkte  $BB'$  Kreise, welche durch diese Punkte hindurchgehen und schneide mit ihnen zwei zur Mittelsenkrechten symmetrisch liegende Gerade. Dann sind die Verbindungsgeraden der vier Schnittpunkte, welche sich auf der Mittelsenkrechten schneiden, Tangenten eines Kegelschnittes.

### 235. Konstruktion der Schnittpunkte einer Geraden.

Um die Schnittpunkte einer Geraden  $g$  mit dem Kegelschnitte zu konstruieren, denke man sich um die Punkte von  $g$  mit ihren Abständen von  $B$  Kreise beschrieben. Diese treffen sich noch im Gegenpunkte von  $B$  bezüglich  $g$  und bilden daher ein Büschel. Unter ihnen giebt es also zwei, welche den Leitkreis von  $B$  berühren; ihre Mittelpunkte sind die beiden Punkte, in denen  $g$  den Kegelschnitt schneidet.

### 236. Konstruktion der Schnittpunkte confocaler Kegelschnitte.

Zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K'$ , welche einen Brennpunkt  $B$  gemein haben, heißen *confocal*. Sind  $B_1$  und  $B_1'$  die anderen Brennpunkte,  $2a$  und  $2a'$  die Hauptachsen, so beschreibe man mit diesen um  $B_1$  und  $B_1'$  die Leitkreise von  $B$  und konstruiere diejenigen Kreise, welche die letzteren berühren und durch  $B$  gehen. Ihre Mittelpunkte sind die gesuchten Schnittpunkte.

Ist einer der Kegelschnitte eine Parabel, so geht der Leitkreis in die Leitlinie über, die Konstruktion bleibt ungeändert.



In gleicher Weise verfährt man, wenn die Kegelschnitte *biconfocal* sind, also beide Brennpunkte gemein haben.

Wenn im letzten Falle  $S$  ein Schnittpunkt zweier Kegelschnitte mit den Brennpunkten  $B$  und  $B_1$  ist, so halbieren die Tangenten die von den Brennpunktsstrahlen gebildeten Winkel und stehen also auf einander senkrecht, die Kegelschnitte schneiden sich also *rechtwinklig*.

Wenn zwei *biconfocale* Kegelschnitte sich schneiden, so bilden sie *rechte Winkel*.

237. In den Kreisvierecken  $HBDF$  und  $HB'D_1F_1$  ist

$$\sphericalangle BHD = \sphericalangle BFD \text{ und } \sphericalangle B'HF_1 = \sphericalangle B'D_1F_1$$

Verlängert man  $D_1B'$  und  $F_1B'$  bis zum Durchschnitt mit dem Scheitelkreise in  $D_2$  und  $F_2$ , so ist

$$B'D_2 = BD, B'F_2 = BF, \text{ also } \triangle B'D_1F_1 \cong BDF$$

$$\text{und } \sphericalangle B'F_2D_2 = \sphericalangle BFD.$$

Im Kreisviereck  $D_1F_1F_2D_2$  ist  $\sphericalangle B'F_2D_2 = \sphericalangle B'D_1F_1$ , also

$$\sphericalangle BHD = \sphericalangle B'HF_1,$$

d. h. die Tangenten eines Punktes bilden mit seinen Brennpunktsstrahlen gleiche Winkel.

238. Wenn die Tangenten  $HD$  und  $HF$  auf einander Fig. 80 u. 80a. senkrecht stehen, so stehen auch  $BD$  und  $BF$  auf einander




Fig. 80.

senkrecht und der Punkt  $H$  liegt auf der Hypotenuse  $E'G'$  und es ist  $E'H = G'H = BH$  und  $\sphericalangle B'HE' = 90^\circ$ .







bis  $E$  und verbinde  $B'$  mit  $E$ . Die Gerade  $B'E$  ist aber parallel zu  $MC$ ; der Schnittpunkt von  $MC$  und  $B'E$  ist aber der Berührungspunkt von  $MC$ ; dieser liegt daher im Unendlichen.

*Die Tangenten der Hyperbel aus ihrem Mittelpunkte heißen Asymptoten; ihre Berührungspunkte liegen im Unendlichen.*

241. Die Asymptoten begrenzen auf jeder Tangente ein Stück, welches jedem Brennpunkte unter einem bestimmten Winkel erscheint (234); die Tangente  $DD_1$  im Scheitel  $A$  der Hyperbel erscheint daher jedem Brennpunkte unter demselben Winkel, wie irgend eine andere Tangente. Da  $\sphericalangle BAD = BCD = 90^\circ$ , so liegen die vier Punkte  $ABCD$  auf einem Kreise und es ist

$MA \cdot MB = MC \cdot MD$ , also  $MB = MD$  und  $AB = CD$ ,  
folglich  $\triangle ABD \cong BCD$  und  $BC = AD$ .

Also  $AD^2 = BC^2 = BA \cdot BA' = BA \cdot AB'$

und deshalb

$$\sphericalangle BDB' = BD_1B' = 90^\circ,$$

$BB'DD_1$  ein Kreisviereck und

$$\sphericalangle DBD_1 + DB'D_1 = 180^\circ,$$

d. h. a. *Die von den Asymptoten begrenzte Strecke irgend einer Tangente erscheint beiden Brennpunkten unter einer Winkelsumme von  $180^\circ$ , oder*

b. *Die Schnittpunkte irgend einer Tangente mit den Asymptoten und die beiden Brennpunkte liegen auf einem Kreise.*

c. *Die von den Asymptoten auf der Scheiteltangente begrenzte Strecke ist doppelt so groß, wie die Tangente von einem Brennpunkte an den Scheiteltkreis.*

242. Die Asymptoten begrenzen auf einer Tangente die Fig. 82.  
Strecke  $CD$ ; es liegen also die Punkte  $CDBB'$  auf einem Kreise. Da  $MD = MD_1$  ist, so folgt:

$$MC \cdot MD = MC \cdot MD_1 = MB^2,$$

d. h. a. *Jede Tangente begrenzt auf den Asymptoten Strecken von konstantem Produkte.*

Weil aber zwei Dreiecke mit demselben Winkel sich wie die Produkte der einschließenden Seiten verhalten, so läßt sich dem vorigen Satze auch folgende Fassung geben:



b. *Die Hyperpeltangenten begrenzen mit den Asymptoten Dreiecke von konstantem Inhalt.*

Die letzten Sätze lassen sich umkehren. Beschreibt man




Fig. 82.

einen beliebigen Kreis, welcher die Asymptoten in zwei Punkten  $C$  und  $D$  schneidet, so muß  $CD$  eine Tangente der Hyperbel sein. Denn die Tangente, welche sich von einem Punkte  $C$  einer Asymptote an die Hyperbel noch ziehen läßt, muß die andere Asymptote in einem Punkte schneiden, der mit  $C$  und den Brennpunkten auf einem Kreise liegt.

Begrenzt ferner eine Gerade  $CD$  mit den Asymptoten ein

Dreieck von dem konstanten Flächeninhalte, welches jede Tangente begrenzt, so muß sie aus gleichen Gründen wie vorher auch eine Tangente sein. Man hat also die Sätze:

c. *Wählt man auf der Halbierungslinie zweier Scheitelwinkel zwei vom Scheitel gleichweit entfernte Punkte, so schneiden alle durch dieselben gelegten Kreise die Schenkel eines jeden der beiden Winkel in zwei Punkten, deren Verbindungslinien Tangenten einer Hyperbel sind, welche die beiden Punkte zu Brennpunkten und die Schenkel der Winkel zu Asymptoten hat.*

d. *Alle Geraden, welche mit zwei festen Geraden Dreiecke von konstantem Flächeninhalte begrenzen, die in einem von den beiden Geraden gebildeten Winkel oder seinem Scheitelwinkel liegen, sind Tangenten einer Hyperbel, welche die festen Geraden zu Asymptoten hat.*

243. Die Gerade  $CD$  begrenze mit den festen Geraden  $a$  und  $a_1$  ein Dreieck  $MCD$  von dem konstanten Inhalte  $J$ . Es sei  $G$  der Halbierungspunkt von  $CD$  und es soll untersucht werden, ob sich durch  $G$  noch eine zweite Gerade ziehen läßt, welche mit  $a$  und  $a_1$  ein Dreieck von demselben Flächeninhalte begrenzt. Wäre  $EF$  eine solche Gerade, so wäre auch



$$\triangle CEG = DFG$$

und weil sich verhält

$$\triangle CEG : DFG = CG \cdot EG : DG \cdot FG,$$

so müßte

$$EG = FG$$

sein. Durch einen Punkt läßt sich aber zwischen zwei Geraden nur eine Strecke so legen, daß sie in jenem Punkte halbiert wird, also ist die letzte Gleichung unmöglich. Von dem Halbierungspunkte  $G$  der Geraden  $CD$ , die man nach dem letzten Satze als eine Hyperbeltangente betrachten kann, läßt sich also keine andere Tan-




Fig. 83.

gente ziehen, also liegt  $G$  auf der Hyperbel. Daraus folgert sich der Satz:

*Die Strecke einer Tangente zwischen den Asymptoten wird durch den Berührungspunkt halbiert.*

Dieser Satz läßt sich auch auf folgende Art beweisen: Fig. 82.

Die Punkte  $CD$ , in welchen eine Tangente die beiden Asymptoten schneidet, liegen mit den Brennpunkten  $BB'$  auf einem Kreise  $O$ . Die Gerade  $OM$  treffe  $CD$  in  $F$ , dann sind die vier Strahlen in  $M$  harmonisch (6e.) also auch die Punkte  $CDEF$ , und daher die Strahlen  $B' (FECD)$ . Diese treffen den Kreis in  $B'BCD$ . Zieht man  $B'G \parallel CD$  und macht  $\widehat{CH} = \widehat{BD}$ , so sind  $CD$  durch  $GH$  ebenso wie durch  $BB'$  harmonisch getrennt, also sind  $B'(CDHG)$  harmonische Strahlen und da  $B'G \parallel CD$  ist, so ist (6a.)  $CJ = DJ$ . Da auch wegen Gleichheit der Bogen  $CH$  und  $BD$  die Sehne  $BH \parallel CD$  ist und  $BJ$  durch  $G$  geht, so ist  $BJ = HJ$ ,  $B'J = GJ$ .

Durch  $J$  kann daher keine andere Hyperbeltangente gehen, weil sonst der Kreis, der durch ihre Schnittpunkte mit den Asymptoten und durch die Brennpunkte sich legen läßt, auch durch  $H$  gehen müßte. Also ist der Halbierungspunkt  $J$  ein Hyperbelpunkt.

244. Beide Beweise, von denen der erste dem ersten



Teile der Steinerschen Vorlesungen, herausgegeben von Geiser, entnommen ist, sind indirekt und begründen den Satz nicht unmittelbar genug aus der Erzeugung der Hyperbel. Dies thut in ausreichendem Maße der folgende Beweis.

Es sei  $M$  der Scheitelkreis,  $B$  und  $B'$  seien die Brennpunkte,  $BE$  eine beliebige Gerade,  $CD \perp BE$ ,  $EF = BE$ . Sind  $H$  und  $J$  die Schnittpunkte der Asymptoten mit dem Kreise  $M$ , so ist  $HJ$  die Polare von  $B$  bezüglich  $M$  und  $BKEE_1$  sind harmonisch, also auch die Strahlen  $N(EE_1BK)$ . Diese schneiden den Durchmesser  $E_1E_2$  in  $E_2E_1M$  und also




Fig. 84.

noch im Unendlichen, daher ist  $NK \parallel E_1E_2$ . Die harmonischen Strahlen  $M(EE_1BK)$  schneiden  $CD$  in den harmonischen Punkten  $EE_2NG$ ; diese vier harmonischen Punkte haben mit  $EE_1KB$  den Punkt  $E$  gemein, also schneiden sich  $E_1E_2$ ,  $NK$  und  $BG$  in einem Punkte; da  $NK \parallel E_1E_2$ , so muß auch  $BG$  beiden Geraden parallel sein. Zieht man  $ME$  bis  $L$ , so muß  $BL = LG$  und  $ML \parallel B'G$  sein. Da aber  $BE = EF$  und deshalb  $ME \parallel B'F$  ist,  $ME$  aber mit  $ML$  zusammenfällt, so muß auch  $B'G$  mit  $B'F$  zusammenfallen, also ist  $G$  ein Hyperbelpunkt. — Errichtet man in  $E$  die Tangente  $EO$ , so sind  $JHKO$  harmonisch;  $O$  ist der Pol von  $EE_1$ , daher ist  $MO \perp EE_1$  und  $MO \parallel CD$ . Die harmonischen Strahlen



$M(JHKO)$  treffen  $CD$  in  $CDG$  und im Unendlichen, daher ist  $CG = DG$ .

245. Die Asymptoten begrenzen auf zwei Tangenten die Strecken  $CD$  und  $C_1D_1$ , dann ist nach (242)




Fig. 85.

$MC \cdot MD = MC_1 \cdot MD_1$  oder  $MC : MC_1 = MD_1 : MD$ ,  
also  $\triangle MCC_1 \sim MDD_1$  und  $CC_1 \parallel DD_1$

Sind  $E$  und  $E_1$  die Mitten von  $CD$  und  $C_1D_1$ , so ist auch  $EE_1 \parallel CC_1$  und wie sich leicht ergibt

$$EF = E_1F_1 :$$

*Die Hyperbel und ihre Asymptoten begrenzen auf jeder Sekante der ersteren gleiche Strecken.*

Von diesem Satze ist der vorige nur ein spezieller Fall. Beide sollen später aus einem allgemeineren Gesichtspunkte abgeleitet werden.

#### 246. Die Leitlinien.

Um die Abhängigkeit der geometrischen Sätze anschaulich zu erkennen, ist es vorteilhaft, die eine Erzeugungsart auf die andere zurückzuführen. Dieselbe Konstruktion, welche zu dem Satze geführt hat, daß der Berührungspunkt einer Hyperbeltangente die zwischen den Asymptoten liegende Strecke derselben halbiert, läßt sich benutzen, um die Beziehungen zwischen Brennpunkt und Leitlinie herzustellen und



schaft so eine Verbindung zwischen scheinbar entfernt liegenden geometrischen Sätzen.

Es sei wieder  $M$  der Scheitelkreis, es seien  $B$  und  $B'$  die Brennpunkte,  $l$  die Polare von  $B$  in Bezug auf den Scheitelkreis  $M$ , welche *Leitlinie* heißt und  $EE_1$  irgend eine Sehne




Fig. 86.

durch  $B$ . Man ziehe den Durchmesser  $E_1E_2$ , verbinde  $E$  mit  $E_2$ , mache  $EF = EB$ . Die Punkte  $EE_1BK$  sind harmonisch, also auch die Strahlen  $N(EE_1BK)$  und daher auch  $E_2E_1M$  und  $P_\infty$  auf  $E_1E_2$ , d. h.  $NK \parallel E_1E_2$ . Die harmonischen Strahlen  $M(EE_1BK)$  treffen  $EE_2$  in den harmonischen Punkten  $EE_2NG$ ; also müssen sich  $E_1E_2$ ,  $NK$  und  $GB$  in einem Punkte schneiden. Da  $E_1E_2 \parallel NK$ , so ist auch  $GB$  zu beiden Geraden parallel. Daher ist auch

$$BL = LG \text{ und } ML \parallel B'G,$$

Aber auch  $BE = EF$  und  $ME \parallel B'F$ ,

also liegen  $B'FG$  in einer Geraden. Der Punkt  $G$  ist daher ein Punkt der Ellipse oder Hyperbel.

Man findet daher Punkte dieser Kegelschnitte durch die folgende Konstruktion, welche gleichmäÙig den Scheitelkreis, den Brennpunkt und die Leitlinie berücksichtigt. Durch den Brennpunkt  $B$  ziehe man eine Sehne  $EE_1$ , welche die Leit-



linie  $l$  in  $K$  schneidet, ziehe den Durchmesser  $E_1E_2$ , dann die Sehne  $EE_2$  und schneide letztere mit  $MK$  in  $G$ , so ist  $G$  ein Punkt des Kegelschnittes.

Der Durchmesser  $E_1E_2$  treffe  $l$  in  $O$ ; es seien  $E_1E_2OP$  harmonisch. Da auch  $E_1EKB$  harmonisch sind, so müssen sich  $EE_2$ ,  $BP$ ,  $KO$  in einem Punkte  $J$  treffen. Die Gerade  $JP$  ist die Polare von  $O$ , denn sie geht durch den Pol  $B$  von  $l$  und teilt mit  $O$  den Durchmesser  $E_1E_2$  harmonisch. Sie steht also auf diesem senkrecht. (12.) Da  $BG \parallel E_1E_2$  ist, so ist auch  $\sphericalangle JBG = 90^\circ$ .

Symmetrisch zu  $l$  in Bezug auf  $M$  konstruiere man die zweite Leitlinie  $l'$  und verlängere  $JG$ , bis sie dieselbe in  $J'$  trifft, dann ist auch  $\sphericalangle J'B'G = 90^\circ$  und da  $\sphericalangle JGB = \sphericalangle J'GB'$ , (237) so ist  $\triangle JGB \sim \triangle J'GB'$  und es verhält sich

$$BG : B'G = JG : J'G = HG : H'G,$$

wenn  $HH' \perp l$ . Daher auch

$$BG + B'G : HG + H'G = BG : HG$$

oder

$$BG : HG = 2a : CC',$$

d. h. Die Entfernungen eines Kegelschnittpunktes von einem Brennpunkte und seiner Leitlinie stehen im konstanten Verhältnisse der Hauptaxe zum Abstände der Leitlinie.

247. *Die Erzeugung des Kegelschnittes durch Brennpunkt und Leitlinie.*

Gegeben sei ein fester Punkt  $B$  und eine feste Gerade  $l$ .




Fig. 87.



Es soll der Ort eines Punktes gesucht werden, dessen Abstände von  $B$  und  $l$  das konstante Verhältniß  $\mu$  haben. Man konstruiere auf der Senkrechten  $BC$  die Punkte  $A$  und  $A_1$  so, daß  $AB : AC = A_1B : A_1C = \mu$ ; diese Punkte gehören dem Orte an, sie heißen die *Scheitel*,  $AA_1$  heißt die *Hauptaxe*, die Mittelsenkrechte  $m$  von  $AA_1$  die *Nebenaxe*. Sind  $BB_1$  sowie  $ll_1$  symmetrisch zu  $M$ , so heißen die Punkte  $BB_1$  die *Brennpunkte*, die Geraden  $ll_1$  die *Leitlinien* des Ortes; dieser selbst heißt ein *Kegelschnitt*.

Um Punkte desselben zu konstruieren, ziehe man durch Brennpunkt  $B$  beliebig eine Gerade  $BD$ , errichte in  $A$  und  $A_1$  Senkrechte, welche jene in  $E$  und  $E_1$  schneiden, und beschreibe um  $N$  mit  $NE$  einen Kreis, welcher die Parallele durch  $D$  zur Hauptaxe in  $F$  und  $F_1$  schneiden mag, dann gehören diese Schnittpunkte dem Kegelschnitte an, denn  $FB : FD = EB : ED = AB : AC$  (7). In gleicher Weise konstruiere man die Kegelschnittpunkte  $K$  und  $K_1$ . — Da  $N$  auf der Mittelsenkrechten  $m$  liegt, so sind  $F$  und  $F_1$  symmetrisch zur Nebenaxe:

*Der Kegelschnitt liegt symmetrisch zur Hauptaxe und Nebenaxe.*

248. Aus den Proportionen  $FB : FD = K_1B : K_1G = \mu$  folgt  $FB : K_1B = FD : K_1G = FL : K_1L$  also halbiert  $BL$  den Nebenwinkel von  $FBK_1$  (6c.). Errichtet man  $BL_1 \perp BL$ , so halbiert  $BL_1$  den Winkel  $FBK_1$ ;  $B(FK_1LL_1)$  sind harmonische Strahlen (6e.) und  $FK_1LL_1$  harmonische Punkte. Nennt man die Senkrechte  $BL_1$  die Polare von  $L$ , so folgt:

a. *Jede Sehne eines Kegelschnittes wird durch ihren Schnittpunkt mit der Leitlinie und seine Polare harmonisch geteilt.*

b. *Jede Sehne durch den Brennpunkt wird durch diesen und seine Leitlinie harmonisch geteilt; die Leitlinie heißt die Polare ihres Brennpunktes und dieser der Pol jener.*

249. Läßt man die Sehne  $FK_1$  (Fig. 87)  $L$  um sich drehen bis sie einen der Schnittpunkte  $Q$  oder  $Q_1$  der Polare  $BL_1$  trifft, so bleibt sie auch in dieser Lage durch letztere und  $L$  harmonisch geteilt und beide Endpunkte müssen mit



$Q$  zusammenfallen (4d), also sind  $LQ$  und  $LQ_1$  Tangenten in  $Q$  und  $Q_1$ .

Ist  $F'K_1'$  irgend eine andere Lage der Sehne  $FK_1$  durch  $L$ , so müssen sich die Sehnenpaare  $FK_1'$  und  $F'K_1$  sowie  $FF'$  und  $K_1K_1'$  (10) auf  $QQ_1$  schneiden. Wenn  $F'K_1'$  unendlich nahe an  $FK_1$  liegt, so gehen die Geraden  $FF'$  und  $K_1K_1'$  in die Tangenten der Punkte  $F$  und  $K_1$  über. Also:

a. Die Polare eines Punktes der Leitlinie ist seine Berührungssehne.

b. Die Tangenten in den Endpunkten einer Sehne schneiden sich auf der Polare ihres Durchschnittspunktes mit der Leitlinie; von keinem Punkte lassen sich mehr als zwei Tangenten an den Kegelschnitt ziehen.

250. Die Sehne  $FK_1$  kann keinen weiteren Punkt mit dem Kegelschnitte gemein haben; denn wäre  $X$  ein solcher, so müßte auch  $FX$  durch  $L$  und  $QQ_1$  harmonisch geteilt werden:

Keine Gerade hat mehr als zwei Punkte mit dem Kegelschnitte gemein.

251. Die Sehne  $FK_1$  wird durch  $L$  und seine Polare




Fig. 88.

harmonisch geteilt, also sind  $B(LQFK_1)$  harmonische Strahlen und da  $BL \perp BQ$ , so ist  $\sphericalangle FBR = K_1BR$ :

Verbindet man einen Brennpunkt mit den Berührungspunkten und dem Schnittpunkte zweier Tangenten, so halbiert die letzte Verbindungslinie den von den beiden ersten gebildeten Winkel.



252. Aus den Proportionen  $QB : QP = QB_1 : QP_1$  folgt  $QB : QB_1 = QP : QP_1 = QL : QL_1$  und da

$\sphericalangle LBQ = L_1B_1Q = 90^\circ$ , so ist  $\triangle BLQ \sim B_1L_1Q$  und

$$\sphericalangle LQB = L_1QB_1$$

also: *Jede Tangente bildet mit den Brennpunktsstrahlen des Berührungspunktes gleiche Winkel.*

253. Aus der Proportion  $QB : QP = QB_1 : QP_1$  folgt ferner  $QB \pm QB_1 : QP \pm QP_1 = QB : QP$ .

In gleicher Weise folgt aus  $AB : AC = A_1B : A_1C$  die neue Proportion  $AB \pm A_1B : AC \pm A_1C = AB : AC$ .

Da  $QP \pm QP_1 = PP_1 = CC_1 = AC \pm A_1C$  und  $QB : QP = AB : AC$ , so ist

$$QB \pm QB_1 = AB \pm A_1B = AA_1,$$

also: *Bei einer Ellipse ist die Summe, bei einer Hyperbel die Differenz der Brennpunktsstrahlen eines ihrer Punkte gleich der Hauptaxe.*

254. *Konstruktion der Schnittpunkte einer Geraden und der Tangenten eines Punktes.*

Um die Schnittpunkte einer Geraden  $g$  mit dem Kegelschnitte zu bestimmen, schneide man mit ihr die Leitlinien in  $L$  und  $L_1$ , verbinde  $L$  mit  $B$  und  $L_1$  mit  $B_1$ , errichte auf den Verbindungslinien in  $B$  und  $B_1$  die Senkrechten, welche  $g$  in  $J$  und  $J_1$  treffen, so ist dasjenige Punktpaar, welches  $LJ$  und  $L_1J_1$  harmonisch teilt, dasjenige, in welchem  $g$  den Kegelschnitt trifft.

In gleicher Weise konstruiert man die Tangenten von einem Punkte  $P$ . Man ziehe  $PB$  und  $PB_1$ , errichte auf ihnen in  $B$  und  $B_1$  die Senkrechten, welche  $l$  und  $l_1$  in  $L$  und  $L_1$  treffen, und konstruiere dasjenige Strahlenpaar, welches  $PB$  und  $PL$ , sowie  $PB_1$  und  $PL_1$  harmonisch trennt.

255. *Polareigenschaften.*

Eine beliebige Gerade  $g$  schneide die Hauptaxe  $AA_1$  in  $Q$ ; man mache  $AA_1QQ_1$  harmonisch, fälle von einem beliebigen Punkte  $P$  der Geraden  $g$  die Senkrechte  $PO$  auf  $AA_1$ , mache  $AA_1OO_1$  harmonisch,  $BR \perp BP$ , dann ist

$$\triangle BCR \sim BOP, \text{ also } CR : CB = BO : PO$$

$$CR : Q_1S = O_1C : O_1Q_1$$







Man konstruiert also die Polare eines Punktes  $P$ , indem man  $PO$  senkrecht auf die Hauptaxe fällt, diese durch  $OO_1$  harmonisch teilt, darauf  $P$  mit dem Brennpunkte  $B$  verbindet, auf  $BP$  in  $B$  die Senkrechte errichtet und ihren Durchschnitt  $R$  mit der Leitlinie bestimmt; die Gerade  $O_1R$  ist die Polare von  $P$ . — Es ist leicht ersichtlich, wie man den Pol  $P$  von  $O_1R$  konstruiert.

Wenn  $g$  durch den Brennpunkt  $B$  geht, so fällt  $Q$  mit  $B$ ,  $Q_1$  mit  $C$ ,  $S$  mit  $R$  zusammen, also liegt der Pol jeder Geraden, die durch einen Brennpunkt gezogen wird, auf der Leitlinie.

Fällt  $P$  mit  $T$  zusammen, also  $O$  mit  $C$ ,  $O_1$  mit  $B$ , so ist  $BS$  die Polare von  $T$  und muß wegen der allgemeinen Konstruktion auf  $TB$  senkrecht stehen.

Hieraus aber folgt, daß  $g$  die Polare von  $S$  ist und  $P$  der Pol von  $O_1S$ . Somit ist der Hauptsatz der Polarentheorie erwiesen:

*Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden und umgekehrt.*

256. Auf  $g$  seien  $PP'P''P'''$  vier harmonische Punkte, dann sind auch ihre Fußpunkte  $OO'O''O'''$  und auch  $O_1O_1'O_1''O_1'''$  harmonisch. Da  $B(PP'P''P''')$  harmonische Strahlen sind, so sind auch  $B(RR'R''R''')$  harmonisch, denn die letzten vier Strahlen stehen auf den ersten senkrecht, und folglich sind auch  $S(RR'R''R''')$  harmonisch:

*Die Polaren von vier harmonischen Punkten sind harmonische Strahlen und die Pole von vier harmonischen Strahlen sind harmonische Punkte.*

257. Eine Gerade  $g$  berühre den Kegelschnitt in  $P$ , man soll die Polare von  $P$  konstruieren. Wenn  $g$  die Leitlinie  $l$  in  $R$  schneidet, so ist, wie eben gezeigt,  $BP$  die Polare von  $R$ , also muß die Polare von  $P$  durch  $R$  gehen. In gleicher Weise folgt, daß diese Polare auch durch  $R_1$  geht, wenn man in  $B_1$  auf  $PB_1$  die Senkrechte errichtet und mit ihr die andere Leitlinie  $l_1$  in  $R_1$  schneidet. Also:

a. *Die Polare eines Kegelschnittpunktes ist die Tangente in ihm.*



Umkehrung: Geht eine Gerade  $g$  durch ihren Pol  $P$ , so ist sie eine Tangente und ihr Pol ein Punkt des Kegelschnittes




Fig. 90.

denn schneidet  $g$  die Leitlinie in  $R$  und  $R_1$ , so müssen sich die Senkrechten in  $R$  und  $R_1$  auf  $BR$  und  $B_1R_1$  in  $P$  treffen.

258. Sind  $PP'$  die Schnittpunkte einer Geraden  $g$  mit dem Kegelschnitte, ist  $Q$  ein beliebiger Punkt von  $g$ ,  $q$  seine Polare und  $Q'$  ihr Schnittpunkt mit  $g$ , sind  $QQ'PX$  harmonische Punkte und  $qq'px$  ihre Polaren, so sind auch diese harmonische Strahlen. Da  $q$  durch  $Q'$ , also  $q'$  durch  $Q$  und  $p$  durch  $P$  geht, so muß auch  $x$  durch  $X$  gehen und es ist  $x$  die Tangente in  $X$ . Daher muß  $X$  mit  $P'$  zusammenfallen und es folgt:

*Jede Sehne eines Kegelschnittes wird durch Pol und Polare harmonisch geteilt.*

259. *Andere Ableitung der Polareigenschaften der Ellipse und Hyperbel.*

Der Ort eines Punktes, der von einem festen Punkte  $B$ , dem Brennpunkte, und einem festen Kreise  $K'$ , dem Leitkreise von  $B$ , gleiche Entfernungen hat, ist eine Ellipse oder Hyperbel. Sie heißt  $K$ . Sind  $D$  und  $E$  zwei Punkte von  $K$ , so berühren die mit  $DB$  und  $EB$  um  $D$  und  $E$  beschriebenen Kreise den Leitkreis  $K'$  in  $D'$  und  $E'$ , die mit  $DB'$  und  $EB'$  je in einer Geraden liegen. Diese Punkte  $D'$  und  $E'$  heißen, die *Bilder* von  $D$  und  $E$ ; man erhält also das Bild  $X'$  eines Punktes  $X$  von  $K$  als Schnittpunkt von  $B'X$  mit  $K'$  und den Leitkreis  $K'$  selbst als Bild von  $K$ .



Die Tangenten in  $D$  und  $E$  an  $K$  sind die Mittelsenkrechten von  $BD'$  und  $BE'$ ; ihr Schnittpunkt  $F$  ist demnach von  $D'E'B$  gleichweit entfernt und der um  $F$  mit  $FB$  beschriebene Kreis geht durch  $D'$  und  $E'$ . Legt man durch  $F$  eine beliebige Gerade  $g$ , welche  $K$  in  $G$  und  $H$  schneidet und




Fig. 91.

beschreibt um  $F$ ,  $G$ ,  $H$  mit  $FB$ ,  $GB$ ,  $HB$  Kreise, so gehören diese einem Büschel an, dessen zweiter Grundpunkt der Gegenpunkt  $B_1$  von  $B$  in Bezug auf  $g$  ist. Die Punkte  $D'E'$  sind aber durch  $G'H'$  harmonisch getrennt. Denn die Tangenten in  $G'$  und  $H'$  und die Gerade  $D'E'$  schneiden sich in einem Punkte  $J$  dem Potenzcentrum der Kreise  $FGHK'$  und dem Pole von  $G'H'$ ; es sind also  $J'LD'E'$  harmonische Punkte und  $G'(J'LD'E')$  harmonische Strahlen und  $G'H'D'E'$  harmonische Punkte des Kreises  $K'$ . Dies giebt den Satz:

a. *Zieht man durch den Schnittpunkt zweier Tangenten eines Kegelschnittes eine Sehne so sind die Bilder ihrer Endpunkte durch diejenigen der Berührungspunkte harmonisch getrennt.*

Die Tangente in  $G$  an  $K$  schneide  $DE$  in  $J$ ; zieht man von  $J$  die zweite Tangente  $JZ$  an  $K$ , so sind die Bilder  $D'E'$



durch  $G'Z'$ , aber auch durch  $G'H'$  harmonisch getrennt, also fällt  $Z'$  mit  $H'$  und  $Z$  mit  $H$  zusammen:

b. *Zieht man durch den Schnittpunkt zweier Tangenten eines Kegelschnitts eine Sehne, so treffen sich die Tangenten ihrer Endpunkte auf der Berührungssehne des ersten Punktes.*

260. Wenn man  $K$  und  $K'$  mit  $FB'$  in  $PQ$  und  $P'Q'$  schneidet, so sind  $P'Q'$ , die Bilder von  $PQ$ , durch  $D'E'$  harmonisch getrennt, also müssen sich die Tangenten in  $D'E'$  in einem Punkte  $F'$  von  $FB'$  schneiden. Dieser Punkt  $F'$  heißt das Bild von  $F$ .

Man kann also zu jedem Punkte der Ebene sein Bild konstruieren. Ist  $F$  ein beliebiger Punkt, so ziehe man an  $K$  die Tangenten  $FD$  und  $FE$ , schneide den Leitkreis  $K'$  mit  $B'D$  und  $B'E$  in  $D'$  und  $E'$  und ziehe endlich in diesen Punkten die Tangenten an  $K'$ , so ist ihr Schnittpunkt  $F'$  das Bild von  $F$ .

In  $G$  und  $H$  denke man sich an  $K$  die Tangenten konstruiert, sie mögen sich in  $J$  schneiden, dann ist  $J'$  das Bild von  $J$ ; der letztere Punkt liegt auf  $DE$ . Man schließt also:

*Die Bilder aller Punkte, von denen sich Tangenten an  $K$  ziehen lassen und die auf einer Geraden  $l$  liegen, welche  $K$  in  $D$  und  $E$  schneidet, liegen wieder auf einer Geraden  $l'$ , welche  $K'$  in den Bildern  $D'$  und  $E'$  von  $D$  und  $E$  schneidet. Man nennt  $l'$  das Bild von  $l$ .*

261. Durch  $F$  lege man eine Gerade  $p$ , welche  $K$  in  $PQ$  trifft, schneide  $K$  mit  $JP$  und  $JQ$  in  $P_1$  und  $Q_1$ , so müssen  $FP_1Q_1$  in einer Geraden liegen. Sind nämlich  $P'Q'P'_1Q'_1$  die Bilder von  $PQP_1Q_1$ , so liegen nach dem letzten Satze die Punkte  $F'P'Q'$ ,  $J'P'P'_1$ ,  $J'Q'Q'_1$  je in einer Geraden, also müssen auch  $F'P'_1Q'_1$  und deshalb  $FP_1Q_1$  in einer Geraden liegen.

Der Schnittpunkt von  $PQ_1$  und  $QP_1$  sei  $R$ ; man nenne  $R$  und  $FJ$ ,  $F$  und  $RJ$ ,  $J$  und  $FR$  *Pol und Polare* bezüglich  $K$ .

Die Gerade  $JR$  schneide  $PQ$  in  $U$ , dann sind  $FUPQ$  harmonisch. Hält man  $PQ$  fest, läßt aber  $J$  die Gerade  $DE$  durchlaufen, so ändert sich auch  $R$ , aber so, daß  $JR$  stets durch  $U$  geht, daher muß  $R$  auf der Geraden  $JU$  liegen.



Rückt  $J$  nach  $D$  oder  $E$ , so thut dies auch  $R$ , also liegt  $R$  auf der Geraden  $DE$  und ebenso  $U$ . Die beliebige Sehne  $PQ$  wird also durch  $F$  und  $DE$ , durch Pol und Polare, harmonisch geteilt. In gleicher Weise folgt, daß  $R$  auch auf  $GH$  liegt.

Die Geraden  $P'Q_1'$  und  $P_1'Q'$  mögen sich in  $R'$  schneiden; es sind dann  $B'(GHFR)$  und  $B'(G'H'F'R')$  harmonisch. Es fallen aber die Strahlenpaare  $B'G$  und  $B'G'$ ,  $B'H$  und  $B'H'$ ,  $B'F$  und  $B'F'$  zusammen, also auch  $B'R$  und  $B'R'$ . Folglich liegen die Punkte  $B'RR'$  in einer Geraden; man nennt  $R'$  *das Bild von R*. Hierdurch sind auch die innerhalb  $K$  liegenden Punkte abgebildet, von denen sich Tangenten nicht ziehen lassen.

Hieraus folgt: Liegen auf einer Geraden  $l$ , welche  $K$  schneidet, vier harmonische Punkte, so sind ihre Bilder auch vier harmonische Punkte auf dem Bilde  $l'$  der Geraden  $l$ .

262. Die Sehnen  $QP_1$  und  $PQ_1$  werden durch  $R$  und  $FJ$ , wie sich aus den Eigenschaften des vollständigen Vierseits ergibt, harmonisch geteilt. Da  $R$  fest bleibt, als Schnittpunkt von  $DE$  und  $GH$ , auch wenn  $P$  sich ändert, so folgt:

*Jede Sehne von K wird durch einen auf ihr, innerhalb K, liegenden Punkt und seine Polare harmonisch geteilt.*

263. Die Bilder aller Punkte der Geraden  $FJ$  müssen also auf  $F'J'$  liegen; das Bild einer Geraden, welche  $K$  nicht schneidet, ist somit wieder eine Gerade.

Ganz allgemein gelten also die Sätze:

*Die Bilder aller Punkte einer Geraden liegen wieder auf einer Geraden, dem Bilde der ersten; die Bilder aller Geraden durch einen Punkt schneiden sich im Bilde des Punktes; die Bilder von vier harmonischen Elementen sind wieder harmonisch diejenigen von Pol und Polare auch Pol und Polare.*

Hieraus folgen für den Kegelschnitt  $K$ , sofern man sie als bewiesen für den Kreis annimmt,

1. *Die Polareigenschaften,*

2. *Die Sätze von Pascal und Brianchon.*

264. *Dritte Ableitung der Polareigenschaften.*

Eine andere einfache Methode zur Ableitung der Polareigenschaften beruht auf der oben mitgetheilten Konstruktion der Tangenten von einem Punkte an einen Kegelschnitt  $K$ .







*Die Bilder von vier harmonischen Punkten oder Strahlen sind wieder harmonisch,*

Aus diesem Satze aber ergeben sich die Polareigenschaften und die Sätze von Pascal und Brianchon.

*Das Bild der unendlich fernen Geraden ist die Leitlinie von  $B$ , das Bild des Mittelpunktes der Brennpunkt  $B$ .*

*Die Bilder der Scheitel von  $K$ , die der Endpunkte der grossen Axe, und des unendlich fernen Punktes der Leitlinie fallen mit diesen Punkten zusammen; sonst giebt es keinen Punkt, der mit seinem Bilde zusammenfällt.*

265. *Der Kegelschnitt als Ort des Mittelpunktes eines Berührungskreises zweier anderen Kreise.*

Ist  $\mathfrak{K}$  ein Kegelschnitt mit den Brennpunkten  $BB'$  und der Hauptaxe  $2a$ , ist  $\mathfrak{C}$  einer seiner Punkte, so ist

$$\mathfrak{C}B + \mathfrak{C}B' = 2a.$$

Beschreibt man um  $\mathfrak{C}$  irgend einen Kreis  $\gamma$  und um  $B$  und  $B'$




Fig. 93.

zwei Kreise, die ihn in  $C$  und  $C'$  berühren, so ist  $BC - C\mathfrak{C} + B'C' + C'\mathfrak{C} = 2a$ , da  $C\mathfrak{C} = C'\mathfrak{C}$ , also:

*Jeder Kegelschnitt ist der Ort des Mittelpunktes eines Berührungskreises zweier festen Kreise; die Mittelpunkte der letzteren sind die Brennpunkte.*



266. Um einen anderen Punkt  $\mathfrak{D}$  von  $\mathfrak{K}$  beschreibe man auch denjenigen Kreis  $\delta$ , welcher die beiden Kreise  $B$  und  $B'$  berührt; die Berührungspunkte seien  $D$  und  $D'$ . Man nennt  $C$  und  $D$  die Bilder von  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$ . Demnach erhält man das Bild eines Punktes  $\mathfrak{D}$  von  $\mathfrak{K}$ , wenn man  $B$  mit  $\mathfrak{D}$  verbindet und die Verbindungslinie über  $\mathfrak{D}$  hinaus bis zum Durchschnitte mit dem Kreise  $B$  verlängert.

Die Verbindungslinie  $CC'$  treffe die Hauptaxe in  $J$ , dann ist  $J$  ein Ähnlichkeitspunkt der Kreise  $B$  und  $B'$ , 54a; der Potenzkreis um  $J$  schneidet also die Berührungskreise  $\gamma$  und  $\delta$  rechtwinklig und daraus ergibt sich:

*Der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  ist der Ort des Mittelpunktes eines Kreises, welcher einen von zwei festen Kreisen berührt und einen anderen rechtwinklig schneidet.*

267. Auf der Geraden  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ , die mit  $g$  bezeichnet werden soll, sei  $\mathfrak{C}$  ein beliebiger Punkt, so läßt sich um ihn ein Kreis  $\varepsilon$  beschreiben, welcher dem durch  $\gamma$  und  $\delta$  bestimmten Büschel angehört, also auch den Potenzkreis  $J$  rechtwinklig schneidet. Er treffe den Kreis  $B'$  in den Punkten  $FG$ , so sind diese durch  $CD$  harmonisch getrennt (36. 37.). Durch  $\mathfrak{C}$  ziehe man eine beliebige Gerade  $g_1$ , welche  $\mathfrak{K}$  in  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1$  schneiden mag; die Bilder  $C_1D_1$  dieser Punkte werden auch durch  $FG$  harmonisch getrennt. Dreht sich  $g$  um  $\mathfrak{C}$  und wird Tangente an  $\mathfrak{K}$  in  $\mathfrak{F}$ , dessen Bild  $H$  sein mag, so wird  $H$  auch durch  $FG$  harmonisch getrennt, es muß also  $H$  mit einem der Punkte  $FG$ , etwa mit  $F$ , zusammenfallen. In gleicher Weise folgt, daß  $G$  das Bild des Berührungspunktes  $\mathfrak{G}$  der zweiten von  $\mathfrak{C}$  an  $\mathfrak{K}$  gezogenen Tangente ist. Die Geraden  $CD$ ,  $C_1D_1$ , ... schneiden sich in einem Punkte  $E$ , dem Pole der Geraden  $FG$  in Bezug auf den Kreis  $B$ , weil je zwei Punkte, wie  $C$  und  $D$ ,  $C_1$  und  $D_1$ , ... durch  $F$  und  $G$  harmonisch getrennt werden. Man nennt  $E$  das Bild von  $\mathfrak{C}$ .

Unmittelbar folgt: Zieht man durch einen Punkt  $\mathfrak{C}$  an  $\mathfrak{K}$  die Tangenten  $\mathfrak{C}\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{C}\mathfrak{G}$  und eine Sekante  $\mathfrak{C}\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ , so werden die Bilder  $FG$  der Berührungspunkte durch diejenigen  $CD$  der Schnittpunkte harmonisch getrennt.

Da die Tangenten in  $F$  und  $G$  an den Kreis  $B$  sich auf der Geraden  $CD$  schneiden müssen, so vertauschen die Punkte



$CD$  ihre Bedeutung mit den Punkten  $FG$ , also auch  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  die ihrige mit  $\mathfrak{F}\mathfrak{G}$ , woraus sich ergibt:

*Die Tangenten in den Punkten  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$  schneiden sich auf  $\mathfrak{F}\mathfrak{G}$ .*

268. Der Punkt  $\mathfrak{C}_1$  liege innerhalb des Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$  auf  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ ; auch um ihn läßt sich ein Kreis  $\varepsilon_1$  beschreiben, der dem von  $\gamma$  und  $\delta$  bestimmten Büschel angehört. Dieser Kreis schneidet den Kreis  $B$  nicht, aber seine Potenzlinie  $p$  mit  $B$  geht durch den Schnittpunkt  $S$  der Tangenten in  $C$  und  $D$  an den Kreis  $B$ , weil diese die Potenzlinien des Kreises  $B$  und der Kreise  $\gamma$  und  $\delta$  sind. Dreht sich nun die Gerade  $g$  und kommt in eine Lage  $g'$ , in welcher sie  $\mathfrak{K}$  in  $\mathfrak{C}'\mathfrak{D}'$  schneidet, und sind  $C'D'$  die Bilder dieser Punkte auf dem Kreise  $B$ , so müssen auch die Tangenten in  $C'$  und  $D'$  sich in einem Punkte  $S'$  von  $p$  schneiden. Da  $S$  und  $S'$  die Pole von  $CD$  und  $C'D'$  in Bezug auf den Kreis  $B$  sind, so müssen  $CD$  und  $C'D'$  sich im Pole  $E_1$  von  $p$  schneiden. *Es soll  $E_1$  das Bild von  $\mathfrak{C}_1$  heißen.*

Um also das Bild  $E$  eines Punktes  $\mathfrak{C}$  zu finden, ziehe man durch  $\mathfrak{C}$  eine Sekante von  $\mathfrak{K}$ , welche diesen Kegelschnitt in  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$  schneidet, konstruiere um  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$  die Kreise  $\gamma$  und  $\delta$ , welche  $B$  und  $B'$  in  $C$  und  $D$  berühren, konstruiere um  $\mathfrak{C}$  denjenigen Kreis  $\varepsilon$ , welcher dem Büschel  $(\gamma\delta)$  angehört, seine Potenzlinie  $p$  mit dem Kreise  $B$  und endlich den Pol  $E$  von  $p$  bezüglich dieses Kreises.

269. Wenn der Punkt  $\mathfrak{C}$  die Gerade  $g$  durchläuft so durchläuft der Kreis  $\varepsilon$  das Büschel  $(\gamma\delta)$ , seine Potenzlinie  $p$  mit dem Kreis  $B$  dreht sich also um einen Punkt der Potenzlinie des Büschels  $(\gamma\delta)$  und der Pol  $E$  dieser Potenzlinie, das Bild von  $\mathfrak{C}$ , durchläuft die Polare  $g$  von  $E$  in Bezug auf den Kreis  $B$ . *Man nennt  $g$  das Bild von  $g$ .*

Man erhält nun leicht die Sätze:

a. *Durchläuft ein Punkt  $\mathfrak{C}$  eine Gerade  $g$ , so durchläuft sein Bild  $E$  eine andere Gerade  $g$ , das Bild von  $g$  — und dreht sich eine Gerade  $g$  um einen Punkt  $\mathfrak{C}$ , so dreht sich ihr Bild  $g$  um das Bild  $E$  von  $\mathfrak{C}$ .*

Sind  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}_2\mathfrak{C}_3$  vier harmonische Punkte von  $g$ , so sind



die Potenzlinien  $pp_1p_2p_3$  harmonische Strahlen und ihre Pole  $EE_1E_2E_3$  harmonische Punkte, also:

b. *Die Bilder von vier harmonischen Punkten sind wieder harmonisch.*

Vier harmonische Strahlen  $gg_1g_2g_3$  schneide man mit einer Geraden in vier harmonischen Punkten  $\mathfrak{G}\mathfrak{G}_1\mathfrak{G}_2\mathfrak{G}_3$ . Durch die vier harmonischen Bilder der letzteren,  $EE_1E_2E_3$ , gehen die vier Bilder  $gg_1g_2g_3$  von  $gg_1g_2g_3$  und sind demnach auch harmonisch:

c. *Die Bilder von vier harmonischen Strahlen sind auch harmonisch.*

#### 270. Vierte Ableitung der Polareigenschaften.

Durch 265—269 ergeben sich die Polareigenschaften und die Sätze von Pascal und Brianchon für den Kegelschnitt aus den entsprechenden vom Kreise und zwar für jede Art des Kegelschnittes. Denn läßt man  $B'$  ins Unendliche rücken, so wird der Kreis  $B'$  eine Gerade und der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  eine Parabel.

#### 271. Die Polarisationsfigur eines Kegelschnittes.

In engem Zusammenhange mit der eben besprochenen Abbildung steht der folgende Satz:

*Die Polarisationsfigur eines Kegelschnittes in Bezug auf irgend einen Kreis um einen Brennpunkt ist ein Kreis. Cf. 175.*




Fig. 94.

Um den Brennpunkt  $B$  des Kegelschnittes  $K$  beschreibe man einen Kreis  $K'$ . Es sei  $AA_1$  eine Brennpunktssehne,



$A_2$  irgend ein Punkt von  $K$ ,  $C_1$  der Schnittpunkt der Tangenten in  $A$  und  $A_1$ ,  $C_2$  derjenige der Tangenten in  $A$  und  $A_2$ ; die Polaren der Punkte  $AA_1A_2C_1C_2$  in Bezug auf den Kreis  $K'$  seien  $aa_1a_2c_1c_2$ . Da  $\sphericalangle ABC_1 = A_1BC_1 = 90^\circ$  ist, so ist auch  $\sphericalangle (c_1a) = (c_1a_1) = 90^\circ$ ; da ferner  $\sphericalangle ABC_2 = A_2BC_2$  ist, so ist auch  $\sphericalangle (c_2a) = (c_2a_2)$ . Dreht sich  $AA_1$  um  $B$ , so durchläuft  $C_1$  die Leitlinie  $l$ , also dreht sich  $c_1$  um einen festen Punkt  $L$ , den Pol von  $l$  in Bezug auf den Kreis  $K'$ . Die Geraden  $aa_1a_2$  werden Tangenten der Polarisationsfigur  $\mathfrak{R}$ ; diese hat also die Eigenschaft, daß die Tangenten in den Endpunkten jeder durch  $L$  gelegten Sehne auf dieser Sehne senkrecht stehen, denn die Schnittpunkte von  $a$  und  $c_1$ , sowie  $a_1$  und  $c_1$  sind die Pole der Tangenten  $AC_1$  und  $A_1C_1$ , also Punkte von  $\mathfrak{R}$ . Die Polare  $c_2$  schneidet  $\mathfrak{R}$  in den Berührungspunkten mit den Tangenten  $a$  und  $a_2$ , also bildet jede Sehne der Polarisationsfigur gleiche Winkel mit den Tangenten in ihren Endpunkten. Also ist  $\mathfrak{R}$  ein Kreis mit dem Mittelpunkt  $L$ . Denn sind  $D_1 E_1 E_2$  die Schnittpunkte von  $a$  und  $a_2$ ,  $a$  und  $c_2$ ,  $a_2$  und  $c_2$ , so ist  $\sphericalangle DEE_2 = DE_2E$  und da  $LE \perp a$ ,  $LE_2 \perp a_2$  auch  $\sphericalangle LEE_2 = LE_2E$ , also  $LE = LE_2$ .

### 272. Der Scheitelkreis.

Ueber der Hauptaxe  $AA_1$  einer Ellipse  $K$  beschreibe man den Kreis  $K'$ , so berührt er die Ellipse in den Scheiteln




Fig. 95.

$AA_1$  und heisst daher der Scheitelkreis. Auf ihm liegen die Fußpunkte der Senkrechten, die man aus den Brennpunkten



$BB_1$  auf die Tangenten fällt. Eine Tangente berühre  $K$  in  $C$ , schneide  $K'$  in  $DD_1$  und die Hauptaxe in  $\mathfrak{C}_1$ . Verlängert man  $BD$  und  $B_1C$  bis zum Durchschnitte  $E$ , so ist  $BD = DE$  (3) also sind  $C\mathfrak{C}_1DD_1$  harmonisch.

Ist  $\mathfrak{K}$  eine Hyperbel mit derselben Hauptaxe  $AA_1$ , so hat sie denselben Scheitelkreis  $K'$ ; eine Hyperbeltangente in  $\mathfrak{C}$  treffe die Hauptaxe in  $C_1$  und den Scheitelkreis in  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$ , so sind auch  $\mathfrak{C}C_1\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  harmonisch:

a. *Die Strecke einer Kegelschnitttangente zwischen dem Berührungspunkte und der Hauptaxe wird durch den Scheitelkreis harmonisch geteilt.*

Die Senkrechte  $CC_1$  auf die Hauptaxe treffe den Scheitelkreis in  $C'$ ; da  $CC_1$  die Polare von  $\mathfrak{C}_1$  bezüglich  $K'$  ist (12), so ist  $C'\mathfrak{C}_1$  Tangente von  $K'$ .

Bei der Hyperbel ziehe man  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  senkrecht auf die Hauptaxe und die Tangente  $\mathfrak{C}_1C'$  an  $K'$ , so steht  $C'C$  auf der Hauptaxe senkrecht.

Aus ähnlichen Dreiecken folgt:

$$\mathfrak{C}_1D : BD = \mathfrak{C}_1C_1 : CC_1$$

$$\mathfrak{C}_1D_1 : B_1D_1 = \mathfrak{C}_1C_1 : CC_1$$

und hieraus durch Zusammensetzen

$$\mathfrak{C}_1D \cdot \mathfrak{C}_1D_1 : BD \cdot B_1D_1 = \mathfrak{C}_1C_1^2 : CC_1^2.$$

Aber  $\mathfrak{C}_1D \cdot \mathfrak{C}_1D_1 = C'\mathfrak{C}_1^2$

$$BD \cdot B_1D_1 = B_1D_1 \cdot B_1F = AB_1 \cdot A_1B_1 = (a + e)(a - e) = a^2 - e^2 = b^2$$

also:  $C'\mathfrak{C}_1 : b = \mathfrak{C}_1C_1 : CC_1.$

Aus den ähnlichen Dreiecken  $\mathfrak{C}_1C_1C'$  und  $\mathfrak{C}_1C'M$  folgt

$$C'\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}_1C_1 = C'M : C'C_1 = a : C'C_1,$$

also:  $a : C'C_1 = b : CC_1,$

oder  $C'C_1 : CC_1 = a : b, \text{ d. h.}$

b. *Auf jeder zur Hauptaxe senkrechten Geraden schneiden der Scheitelkreis und die Ellipse Sehnen ab, die sich wie die Axen verhalten.*

Bei der Hyperbel  $\mathfrak{K}$  hat man zunächst die Proportionen

$$C_1\mathfrak{D} : \mathfrak{B}\mathfrak{D} = C_1\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$$

$$C_1\mathfrak{D}_1 : \mathfrak{B}_1\mathfrak{D}_1 = C_1\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$$

und  $C_1\mathfrak{D} \cdot C_1\mathfrak{D}_1 : \mathfrak{B}\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{B}_1\mathfrak{D}_1 = C_1\mathfrak{C}_1^2 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1^2$



Es ist aber  $C_1\mathfrak{D}.C_1\mathfrak{D}_1=C'C_1^2$

$$\mathfrak{B}\mathfrak{D}.\mathfrak{B}_1\mathfrak{D}_1=\mathfrak{B}_1\mathfrak{F}.\mathfrak{B}_1\mathfrak{D}_1=\mathfrak{B}_1A.\mathfrak{B}_1A_1=(e+a)(e-a)=e^2-a^2=b^2,$$

wenn man die Excentricität  $\mathfrak{B}_1M=e$  setzt; also:

$$C'\mathfrak{C}_1 : b = C_1\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1.$$

Aber  $C'C_1 : C_1\mathfrak{C}_1 = C'M : C'\mathfrak{C}_1 = a : C'\mathfrak{C}_1$

und daher  $a : C'\mathfrak{C}_1 = b : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$

oder  $C'\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = a : b$ , d. h.

c. Zieht man von einem Punkte der Hauptaxe einer Hyperbel die Tangente an den Scheitelkreis und die halbe senkrechte Hyperbelsehne, so verhalten sich diese Geraden wie die Hauptaxe zur Nebenaxe.

Beide Sätze gestatten die Umkehrung:

d. Fällt man aus den Punkten eines Kreises Senkrechte auf einen Durchmesser und teilt dieselben in einem bestimmten Verhältnisse, so liegen die Teilpunkte auf einer Ellipse.

Zieht man in den Punkten eines Kreises Tangenten bis zu ihrem Durchschnitte mit einem Durchmesser und errichtet in den Durchschnittpunkten Senkrechte, welche zu den Tangenten in einem bestimmten Verhältnisse stehen, so liegen die Endpunkte auf einer Hyperbel.

273. Ist  $C$  ein beliebiger Punkt der Ellipse  $K$  und  $CG \perp AA_1$ , so mache man  $AA_1C_1\mathfrak{C}_1$  harmonisch, errichte in  $\mathfrak{C}_1$  die Senkrechte und schneide sie mit  $GA$  in  $\mathfrak{C}$ , dann ist

$$MC_1 \cdot M\mathfrak{C}_1 = MA^2 \text{ oder } MA : MC_1 = M\mathfrak{C}_1 : MA.$$

Hieraus

$$MA - MC_1 : M\mathfrak{C}_1 - MA = MC_1 : MA$$

oder  $AC_1 : A\mathfrak{C}_1 = MC_1 : MC' = C'C_1 : C'\mathfrak{C}_1.$

Aber  $AC_1 : A\mathfrak{C}_1 = C_1G : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = C_1C : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1,$

also  $C_1C : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = C'C_1 : C'\mathfrak{C}_1$

oder  $C'\mathfrak{C}_1 : \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = C'C_1 : C_1C = a : b.$

Wenn also  $C$  die Ellipse  $K$  durchläuft, so bewegt sich  $\mathfrak{C}$  auf einer Hyperbel  $\mathfrak{K}$  und umgekehrt. Beide Kegelschnitte haben demnach dieselben Axen. Degeneriert  $K$  in den Scheitelkreis  $K'$ , so degeneriert  $\mathfrak{K}$  in die gleichseitige Hyperbel  $\mathfrak{K}'$ , die hierdurch in eine einfache Beziehung zum Kreise gesetzt ist.







errichtet in ihnen die Senkrechten  $rp_1t_1s_1$ , so sind diese auch harmonisch. Man findet nun die hyperbolischen Bilder  $\Re \mathfrak{P} \mathfrak{T} \mathfrak{S}$  auch als Durchschnitte von  $A(RP_2T_2S_2)$  mit  $rp_1t_1s_1$  und es liegen also  $\Re \mathfrak{P} \mathfrak{T} \mathfrak{S}$  auf einer durch  $\Re$  gehenden Geraden und sind harmonische Punkte.

Hält man  $P$  fest, läßt aber  $TS$  sich so verändern, daß sie stets  $PR$  harmonisch trennen, so durchlaufen auch  $\mathfrak{T} \mathfrak{S}$  die Gerade  $\mathfrak{P} \mathfrak{R}$ . Somit folgt:

*Durchläuft ein Punkt  $P'$  eine Gerade  $p'$ , so durchläuft sein elliptisches Bild  $P$  eine andere Gerade  $p$ , welche jene in einem Punkte  $R$  der Axe schneidet und sein hyperbolisches Bild  $\mathfrak{P}$  durchläuft eine dritte Gerade  $\mathfrak{p}$ , welche die Axe in dem harmonischen Gegenpunkte  $\Re$  von  $R$  in Bezug auf  $AA_1$  schneidet.*

*Von vier harmonischen Punkten sind sowohl die elliptischen wie hyperbolischen Bilder wieder harmonisch.*

Diejenige Gerade  $p$  oder  $\mathfrak{p}$ , auf welcher die Bilder aller Punkte einer anderen Geraden  $p'$  liegen, nennt man das Bild der letzteren. Unmittelbar folgt:

*Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so dreht sich ihr Bild um das Bild des Punktes.*

*Die Bilder von vier harmonischen Geraden sind wieder harmonisch.*

#### 275. Fünfte Ableitung der Polareigenschaften.

Aus diesen Sätzen folgen wieder die Polareigenschaften und die Sätze von Pascal und Brianchon für Ellipse und Hyperbel aus den entsprechenden für den Kreis.

#### 276. Gleichung der Ellipse.

Ist  $C$  ein variabler Punkt (Fig. 95) von  $K$ ,  $C_1M = x$ ,  $CC_1 = y$ , so ist  $CC_1 : C'C_1 = b : a$ . Aber  $C'C_1^2 = a^2 - x^2$ , also

$$y^2 : a^2 - x^2 = b^2 : a^2$$

und

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

#### 277. Gleichung der Hyperbel.

Ist (Fig. 95)  $\mathfrak{C}$  ein beliebiger Hyperbelpunkt,  $\mathfrak{C}_1M = x$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 = y$ , so ist

$$\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1 : C'\mathfrak{C}_1 = b : a$$



aber  $C' \mathfrak{C}_1^2 = x^2 - a^2$ , also

$$y^2 : x^2 - a^2 = b^2 : a^2$$

und

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

### 278. Fläche der Ellipse.

Unendlich nahe an  $C'$  wähle man den Punkt  $P'$  und fälle  $P'P_1$  senkrecht auf die Hauptaxe; diese Senkrechte schneide die Ellipse in  $P$ . Dann ist

$$\text{Trapez } C'C_1P_1P' = \frac{1}{2} C_1C' \cdot C_1P_1.$$

$$\text{Trapez } CC_1P_1P = \frac{1}{2} C_1C \cdot C_1P_1,$$

also verhält sich

$$C'C_1P_1P' : CC_1P_1P = C_1C' : C_1C = a : b.$$

Denkt man sich nun Halbkreis und Halbellipse in lauter unendlich kleine Trapeze geteilt, so folgt durch Addition, daß sich der Halbkreis zur Halbellipse verhält wie  $a : b$ . Da die Fläche des Halbkreises  $\frac{1}{2} \pi a^2$  ist, so muß diejenige der Halbellipse  $\frac{1}{2} \pi ab$  sein. Demnach ist die

$$\text{Fläche der Ellipse} = \pi ab.$$

### 279. Konjugierte Durchmesser.

Der Pol der unendlich fernen Geraden heißt der *Mittelpunkt* des Kegelschnittes; er halbiert jede durch ihn gezogene Sehne, die man *Durchmesser* nennt.

Zwei senkrechte Kreisdurchmesser haben die Eigenschaft, daß der Pol des einen auf dem anderen liegt; diese Eigenschaft behalten auch ihre Bilder, die ebenfalls durch den




Fig. 97.



Mittelpunkt des Kegelschnittes gehen. Solche Durchmesser nennt man *konjugierte Durchmesser*.

Um zwei konjugierte Durchmesser oder Halbmesser der Ellipse  $K$  zu konstruieren, zeichne man zwei senkrechte Radien  $MC'$  und  $MD'$  des Scheitelkreises und ihre Bilder  $C$  und  $D$ , so sind  $MC$  und  $MD$  konjugierte Halbmesser der Ellipse.

Zieht man in  $D'$  an  $K'$  die Tangente  $D'F$ , so ist  $D'F \parallel C'M$  also  $\triangle D'D_1F \sim C'C_1M$  und da  $C'C_1 : CC_1 = D'D_1 : DD_1 = a : b$ , so ist auch  $\triangle DD_1F \sim CC_1M$  und  $DF \parallel CM$ :

a. Die Tangente in dem Endpunkte eines von zwei konjugierten Durchmessern ist dem andern parallel.

In gleicher Weise ergibt sich mittelst ähnlicher Dreiecke der allgemeinere Satz:

b. Jeder von zwei konjugierten Durchmessern halbiert die dem anderen parallelen Sehnen.

Jedes einem Kreise umgeschriebene Parallelogramm ist ein Rhombus, dessen Diagonalen sich im Kreismittelpunkte senkrecht schneiden; das Bild des Rhombus ist ein der Ellipse umgeschriebenes Parallelogramm, die Bilder der Diagonalen sind konjugierte Durchmesser, also:

c. Die Diagonalen jedes einem Kegelschnitte umgeschriebenen Parallelogramms sind konjugierte Durchmesser.

In gleicher Weise leitet man ab:

d. Die Sehnen, welche einen Kegelschnittspunkt mit den Endpunkten eines Durchmessers verbinden, sind konjugierten Durchmessern parallel.

280. Aus ähnlichen Dreiecken folgt:

$$\triangle CC_1E : C'C_1E = DD_1E : D'D_1E = b : a,$$

also auch  $CC_1D_1D : C'C_1D_1D' = b : a$

Ferner

$$\triangle CC_1M : C'C_1M = DD_1M : D'D_1M = b : a, \text{ daher auch } CC_1D_1D - CC_1M - D_1DM : C'C_1D_1D' - C'C_1M - D'D_1M = b : a$$

oder  $\triangle CMD : C'MD' = b : a$

Da  $\triangle C'MD' = \frac{1}{2} a^2,$

so ist  $\triangle CMD = \frac{1}{2} ab, \text{ d. h.}$



a. *Der Flächeninhalt eines von zwei konjugierten Halbmessern gebildeten Dreiecks ist konstant gleich dem Dreiecke zweier Halbaxen.*

Da die Tangenten in den Endpunkten konjugierter Durchmesser parallel sind, so nimmt der vorige Satz auch folgende Fassung an:

b. *Der Flächeninhalt eines umgeschriebenen Parallelogramms, dessen Seiten konjugierten Durchmessern parallel sind, ist konstant gleich dem Rechtecke aus den Axen.*

Aus rechtwinkligen Dreiecken folgt:

$$\begin{aligned} CM^2 &= CC_1^2 + C_1M^2, & DM^2 &= DD_1^2 + D_1M^2 \\ &= \frac{b^2}{a^2} \cdot C'C_1^2 + C_1M^2, & &= \frac{b^2}{a^2} D'D_1^2 + D_1M^2. \end{aligned}$$

Aus den kongruenten Dreiecken  $C'C_1M$  und  $D'D_1M$  ergibt sich  $C'C_1 = D_1M$ ,  $D'D_1 = C_1M$ , also

$$\begin{aligned} CM^2 + DM^2 &= \frac{b^2}{a^2} (C_1M^2 + D_1M^2) + C_1M^2 + D_1M^2 \\ &= (C_1M^2 + D_1M^2) \left( \frac{a^2 + b^2}{a^2} \right) \end{aligned}$$

Aber  $C_1M^2 + D_1M^2 = C_1M^2 + C'C_1^2 = a^2$ , also

$$CM^2 + DM^2 = a^2 + b^2$$

folglich:

c. *Die Summe der Quadrate zweier konjugierten Halbmesser ist konstant gleich der Summe der Quadrate der Halbaxen.*

281. *Gleichung der Ellipse in Bezug auf zwei konjugierte Durchmesser.* (Fig. 97.)

I. Auf  $K$  sei  $G$  ein beliebiger Punkt, das Bild von  $G'$ ,  $GH \parallel CM$ ,  $H$  das Bild von  $H'$ , so müssen sich  $GH$  und  $G'H'$  auf der Axe in  $J$  schneiden. Man setze

$$GH = x, MH = y, CM = a_1, DM = b_1.$$

Die Gerade  $C'M$  muß parallel zu  $G'J$  sein, also senkrecht auf  $MD'$ , daher

$$G'H'^2 + H'M^2 = G'M^2 = a^2.$$

Aber  $G'H' : GH = G'J : GJ = C'M : CM = a : a_1$

$$MH' : MH = MD' : MD = a : b_1,$$



also 
$$G'H' = a \cdot \frac{GH}{a_1}, \quad MH' = a \cdot \frac{MH}{b_1}$$

$$= a \cdot \frac{x}{a_1}, \quad = a \cdot \frac{y}{b_1}$$

und durch Substitution

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1.$$

II. Eine andere Ableitung der Ellipsengleichung geben die Polareigenschaften.

Es seien  $C\mathfrak{C}$  und  $D\mathfrak{D}$  konjugierte Durchmesser; durch




Fig. 98.

einen beliebigen Punkt  $G$  ziehe man  $GH \parallel C\mathfrak{C}$ ,  $GJ \parallel D\mathfrak{D}$  und in  $G$  die Tangente  $NL$ , setze

$$GH = x, \quad MH = y, \quad MC = a_1, \quad MD = b_1,$$

so sind  $LHD\mathfrak{D}$  und  $NJC\mathfrak{C}$  harmonisch, also

$$y \cdot ML = b_1^2, \quad x \cdot MC = a_1^2.$$

Aber

$$x : HL = NM : ML$$

und

$$x : ML - y = NM : ML$$

$$x \cdot ML + y \cdot MN = ML \cdot MN$$

und

$$\frac{x}{MN} + \frac{y}{ML} = 1$$

oder durch Substitution

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1.$$



Die letzte Methode läßt sich auch zur Ableitung der Hyperbelgleichung anwenden. Man erhält

$$\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1.$$

Setzt man  $ML = MN$ , so geht das Parallelogramm  $NLN_1L_1$  in ein Rechteck über, also wird

$$x = \frac{a_1^2}{MN}, \quad y = \frac{b_1^2}{MN}.$$

Substituiert man diese Werte in die Gleichung

$$\frac{x}{MN} + \frac{y}{ML} = 1,$$

so erhält man

$$a_1^2 + b_1^2 = MN^2.$$

Da aber nach einem vorigen Satze

$$a_1^2 + b_1^2 = a^2 + b^2 \text{ ist, so folgt:}$$

*Die Scheitel aller einer Ellipse umgeschriebenen rechten Winkel liegen auf einem konzentrischen Kreise, dessen Radius gleich der Geraden ist, welche zwei Endpunkte einer Haupt- und Nebenaxe verbindet. Cf. 199. 200.*




Fig. 99.

282. Eine andere einfache Fig. 99 u. 100 Ableitung dieses Satzes ist folgende\*). Im Punkte  $C$  schneiden sich zwei rechtwinklige Tangenten, die den Scheitelkreis in  $DE$  und  $D_1E_1$  treffen. Dann ist

$$\begin{aligned} CF^2 &= CD \cdot CE = CD_1 \cdot CE_1 \\ &= BE \cdot B_1D = BA \cdot BA_1 \\ &= (BD \cdot B_1E \text{ in Fig. 100.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ferner: } MC^2 &= MF^2 \pm CF^2 \\ &= a^2 \pm BA \cdot BA_1 = a^2 \pm b^2 \end{aligned}$$

also  $MC$  konstant.

Mit Hilfe des Scheitelkreises findet man übrigens eine leichte Auflösung der Aufgabe:

\*) Taylor. Ancient and moderne Geometrie S. 88.



„Zu einer Tangente eines Kegelschnittes eine senkrechte Tangente zu konstruieren.“




Fig. 100.

Eine Tangente schneide den Scheitelkreis in  $D$  und  $E$ ; man ziehe  $BD_1$  parallel zu ihr und  $D_1C \perp DC$ .

283. Zu ganz allgemeinen metrischen Beziehungen, welche die Gleichungen der Kegelschnitte in sich enthalten, gelangt man auf folgendem Wege mit Hilfe der Polareigenschaften.




Fig. 101.

In dem Endpunkte  $AA_1$  eines Durchmessers ziehe man die Tangenten, welche parallel sein müssen und schneide sie durch irgend zwei andere Tangenten in  $BB_1$  und  $CC_1$ . Dann müssen sich in dem umgeschriebenen Viereck  $BB_1C_1C$  die Diagonalen  $BC_1$  und  $B_1C$  auf der Verbindungslinie der Berührungspunkte  $AA_1$  in  $D$  schneiden. Aus ähnlichen Dreiecken folgt  $AB:A_1C_1 = AD:A_1D = AC:A_1B_1$  und hieraus

$$AB \cdot A_1B_1 = AC \cdot A_1C_1.$$

Wird  $CC_1$  parallel zu  $AA_1$ , also  $AC = A_1C_1$  gleich dem



zu  $AA_1$  konjugierten, zu  $AB$  parallelen Halbmesser  $ME$ , dann ist

$$AB \cdot A_1B_1 = ME^2$$

d. h. *Eine beliebige Tangente schneidet auf zwei festen parallelen Tangenten Strecken  $ab$ , deren Rechteck gleich dem Quadrate des den festen Tangenten parallelen Halbmessers ist.*

Die festen Tangenten bilden mit  $BB_1$  ein umgeschriebenes Dreieck, dessen eine Ecke im Unendlichen liegt, also schneiden sich  $AB_1$ ,  $BA_1$  und die durch den Berührungspunkt  $P$  zu  $AB$  gezogene Parallele  $PQ$  in einem Punkte  $R$ , welcher die Strecke  $PQ$  halbiert, wie sich sofort aus den Proportionen ergibt:

$$QR : AB = QA_1 : AA_1 = PB_1 : BB_1 = RP : AB.$$

Nimmt man hinzu  $QR : A_1B_1 = QA : AA_1$  so folgt durch Multiplikation

$$QR^2 : AB \cdot A_1B_1 = QA \cdot QA_1 : AA_1^2$$

oder 
$$QP^2 : QA \cdot QA_1 = ME^2 : MA^2.$$

Da  $PP_1$  in  $Q$  halbiert wird, so folgt:

*Eine Sehne und der zu ihr konjugierte Durchmesser teilen sich in solche Abschnitte, daß die Rechtecke aus denselben sich verhalten, wie die Quadrate der parallelen Halbmesser.*




Fig. 102.

284. Die beiden Sehnen  $CD$  und  $EF$  schneiden sich in  $G$ ; der zu  $CD$  konjugierte Durchmesser  $JK$  schneide  $CD$  in  $H$ . Mit  $MG$  schneide man den Kegelschnitt in  $C_1$  und ziehe  $C_1D_1 \parallel CD$ , dann ist  $C_1H_1 = D_1H_1$ . Setzt man  $MJ = a_1$  und den konjugierten Halbmesser  $ML = b_1$ , so ist nach dem letzten Satze

$$CH^2 = HJ \cdot HK \cdot \frac{b_1^2}{a_1^2} = (a_1^2 - MH^2) \frac{b_1^2}{a_1^2} = b_1^2 - MH^2 \cdot \frac{b_1^2}{a_1^2}.$$

Man setze

$$\frac{b_1^2}{a_1^2} = \mu_1^2, \text{ also } CH^2 = b_1^2 - MH^2 \cdot \mu_1^2.$$



Zieht man auf beiden Seiten  $GH^2$  ab:

$$CH^2 - GH^2 = CG \cdot GD = b_1^2 - MH^2 \cdot \mu_1^2 - GH^2.$$

$$\text{Ferner ist } C_1 H_1^2 = b_1^2 - MH_1^2 \cdot \mu_1^2$$

und aus der Proportion

$$MH : GH = MH_1 : C_1 H_1 \text{ oder } MH \cdot \mu_1 : GH = MH_1 \cdot \mu_1 : C_1 H_1$$

folgt

$$MH^2 \cdot \mu_1^2 + GH^2 : MH_1^2 \cdot \mu_1^2 + C_1 H_1^2 = GH^2 : C_1 H_1^2 = GM^2 : C_1 M^2$$

$$\text{oder da } MH_1^2 \cdot \mu_1^2 + C_1 H_1^2 = b_1^2 \text{ ist}$$

$$\left. \begin{array}{l} MH^2 \cdot \mu_1^2 + GH^2 \\ b_1^2 - CG \cdot DG \end{array} \right\} = b_1^2 \cdot \frac{GM^2}{C_1 M^2}$$

$$\text{also endlich } CG \cdot DG = b_1^2 \left(1 - \frac{GM^2}{C_1 M^2}\right).$$

$$\text{Ebenso } EG \cdot FG = b_2^2 \left(1 - \frac{GM^2}{C_1 M^2}\right)$$

$$\text{und } CG \cdot DG : EG \cdot FG = b_1^2 : b_2^2$$

d. h. *Zwei Sehnen eines Kegelschnittes teilen sich in solche Abschnitte, daß die Rechtecke aus denselben sich verhalten wie die Quadrate der parallelen Halbmesser.*

285. Zieht man durch irgend einen Punkt  $G'$  die Sehnen  $C'D'$  und  $E'F'$  parallel zu  $CD$  und  $EF$ , so ist auch

$$C'G' \cdot D'G' : E'G' \cdot F'G' = b_1^2 : b_2^2,$$

$$\text{also } CG \cdot DG : EG \cdot FG = C'G' \cdot D'G' : E'G' \cdot F'G', \text{ d. h.}$$

*Wenn man durch zwei Punkte  $G$  und  $G'$  zwei Paar parallele Sehnen zieht, so ist das Verhältniß der Rechtecke aus ihren Abschnitten konstant.* (Salmon. Analytische Geometrie der Kegelschnitte. Art. 110.)

In der letzten Form gilt der Satz auch für die Parabel, was jetzt nachgewiesen werden soll.

Durch  $A$  sei ein Durchmesser  $AM$  gezogen, in  $A$  die Tangente, welche durch zwei andere in  $B$  und  $C$  geschnitten wird; letztere mögen sich in  $E$  treffen.

Die drei Tangenten bilden mit der unendlich fernen Geraden ein umgeschriebenes Vierseit, dessen Diagonalen die durch  $B$  und  $C$  zu  $CE$  und  $BE$  parallelen Geraden sind und sich auf den Verbindungslinien  $AM$  und  $PP_1$  der Berührungspunkte in  $D$  schneiden müssen; das Viereck  $BDCE$  ist daher ein











Da aber  $DD' = D\mathfrak{D}$ , so ist auch  $EE' = E\mathfrak{E}$  und  $E'$  der Berührungspunkt auf der Tangente  $EF$ .

Hieraus ergibt sich die Proportion

$$D'D : D'F = DG : FE' = FE : FE' = EH : ED$$

aus der wieder der obengenannte Satz folgt.

288. Ein Kegelschnitt werde von einem Kreise in den Punkten  $CDEF$  geschnitten; die gemeinschaftlichen Sehnen  $CD$  und  $EF$  schneiden sich in  $G$ , dann ist, wenn man die parallelen Halbmesser mit  $c$  und  $d$  bezeichnet,

$$CG \cdot DG : EG \cdot FG = c^2 : d^2$$

und da  $CG \cdot DG = EG \cdot FG$  ist, so muß auch

$$c = d$$

sein. Die Halbierungslinien der Winkel gleicher Durchmesser sind aber die Axen, also folgt:

a. *Die Halbierungslinien der Winkel, welche die gemeinschaftlichen Sehnen eines Kreises und eines Centralkegelschnittes bilden, sind den Axen parallel.*

Die Umkehrung ergibt sich leicht:

b. *Zwei Sehnen, welche gegen die Axen gleich und entgegengesetzt geneigt sind, schneiden den Kegelschnitt in vier Punkten, durch welche sich ein Kreis legen läßt.*

Um den vorigen Satz für die Parabel zu beweisen, schneide man dieselbe durch einen Kreis in den Punkten  $CDEF$ , ziehe darauf beliebig die Sehnen  $C_1D_1 \parallel C_2D_2 \parallel CD$  und durch die Halbierungspunkte  $G_1$  und  $G_2$  derselben  $E_1F_1 \parallel E_2F_2 \parallel EF$ , dann ist, wenn man noch den Schnittpunkt von  $CD$  und  $EF$  mit  $G$  bezeichnet,

$$\frac{CG \cdot DG}{EG \cdot FG} = \frac{C_1G_1 \cdot D_1G_1}{E_1G_1 \cdot F_1G_1} = \frac{C_2G_2 \cdot D_2G_2}{E_2G_2 \cdot F_2G_2}.$$

289. *Folgerungen aus den Beziehungen des Scheitelkreises zur Ellipse.*

In einem Punkte  $C$  einer Ellipse ziehe man die Tangente, welche die Axen in  $D$  und  $E$ , und die Normale, welche die Axen in  $F$  und  $G$  schneidet. Tangente und Normale halbieren die von den Brennpunktsstrahlen in  $C$  gebildeten Winkel; es sind somit  $C(BB_1DF)$  harmonische Strahlen,  $BB_1DF$  harmonische Punkte und daher  $MD \cdot MF = MB^2 = e^2$ :



a. *Alle Paare zusammengehöriger Tangenten und Normalen schneiden die Hauptaxe in einer Involution, deren Doppelpunkte*




Fig. 106.

die Brennpunkte und deren Potenz das Quadrat der halben Excentricität ist.

Fällt man  $CH \perp AA_1$ , so sind auch  $AA_1DH$  harmonisch und  
 $MD \cdot MH = a^2$ ; in Verbindung mit der  
 Gleichung  $MD \cdot MF = e^2$  ergibt sich

$MF : MH = e^2 : a^2$ , also aus ähnlichen Dreiecken  
 $CF : CG : FG = FH : MH : MF = a^2 - e^2 : a^2 : e^2 = b^2 : a^2 : e^2$ , d. h.

b. *Die Axen teilen die Normale in Abschnitte, welche sich verhalten wie die Quadrate der Axen zum Quadrate der Excentricität.*

Verlängert man  $HC$  bis zum Durchschnitte in  $C_1$  mit dem Scheitelkreise, so ist  $DC_1$  die Tangente des letzteren; sie treffe die Nebenaxe in  $E_1$ . Zieht man noch  $MJ \parallel DC$ , so sind  $MC$  und  $MJ$  konjugiert, also wenn man  $JK \perp AA_1$  fällt und bis  $J_1$  verlängert, so sind auch  $C_1M$  und  $J_1M$  konjugierte und daher senkrechte Radien des Kreises. Daher ist

$$CD : MJ = CH : JK$$

$$CE : MJ = MH : MK$$

---


$$CD \cdot CE : MJ^2 = CH \cdot MH : JK \cdot MK.$$

Ebenso  $C_1D \cdot C_1E_1 : MJ_1^2 = C_1H \cdot MH : J_1K \cdot MK.$



Aber  $CH : C_1H = JK : J_1K = b : a$   
 und  $C_1D \cdot C_1E_1 = MJ_1^2$ ,  
 also  $CD \cdot CE = MJ^2$ :

c. Die Strecke einer jeden Tangente zwischen den beiden Hauptaxen wird durch den Berührungspunkt in zwei Segmente zerlegt, deren Rechteck gleich dem Quadrate des der Tangente parallelen Halbmessers ist.

Aus  $CF : CD = CE : CG$   
 folgt  $CF \cdot CG = CD \cdot CE = MJ^2$ :

d. Das Rechteck der Segmente der Normale eines Punktes zwischen diesem Punkte und den beiden Axen ist gleich dem Quadrate des Halbmessers, welcher zu dem nach jenem Punkte gezogenen Halbmesser konjugiert ist.

290. Man ziehe durch einen beliebigen Punkt  $C$  die




Fig. 107.

Ellipsensehnen  $DE$  und  $FG$ , fälle  $DD_1$  und  $EE_1$  senkrecht auf die Hauptaxe, so schneiden sich  $DE$  und  $D_1E_1$  auf  $AA_1$  in  $K$ . Zieht man ferner  $FF_1$  und  $GG_1$  senkrecht zur Hauptaxe, so treffen sich  $D_1E_1$  und  $F_1G_1$  in einem Punkte  $C_1$ , so daß  $CC_1$  auch senkrecht auf  $AA_1$  steht. Endlich seien  $MH$  und  $MJ$  parallel zu  $DE$  und  $FG$ ,

$HH_1 \perp AA_1$ . Dann ist

$$DC : D_1C_1 = EC : E_1C_1 = DK : D_1K = HM : H_1M$$

und  $DC \cdot EC = D_1C_1 \cdot E_1C_1 \cdot \left(\frac{HM}{H_1M}\right)^2$ .

Ebenso folgt  $FC \cdot GC = F_1C_1 \cdot G_1C_1 \cdot \left(\frac{JM}{J_1M}\right)^2$ .

Da aber  $D_1C_1 \cdot E_1C_1 = F_1C_1 \cdot G_1C_1$  und  $H_1M = J_1M$ , so wird

$$DC \cdot EC : FC \cdot GC = HM^2 : JM^2$$

d. h. die Rechtecke aus den Abschnitten zweier Ellipsensehnen verhalten sich wie die Quadrate der parallelen Halbmesser.






Fig. 108.

291. Aus diesem Satze ergibt sich die Gleichung der Ellipse in Bezug auf zwei konjugierte Durchmesser. Von den beiden Sehnen  $DE$  und  $FG$  sei die erste ein Durchmesser und die zweite dem konjugierten Halbmesser  $MJ$  parallel, so daß also  $CF = CG$ . Setzt man  $MD = a_1$ ,  $MJ = b_1$ ,  $CM = x$ ,  $CF = y$ , so

folgt aus

$$DC \cdot EC : FC \cdot GC = DM^2 : JM^2$$

$$(a_1 + x)(a_1 - x) : y^2 = a_1^2 : b_1^2$$

und nach kurzer Reduktion

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1.$$

292. Es seien  $DEFG$  die Schnittpunkte einer Ellipse mit einem Kreise; ist dann  $C$  der Schnittpunkt der Sehnen  $DE$  und  $FG$ , so ist  $DC \cdot EC = FC \cdot GC$ , also ist auch (Fig. 107)  $HM = JM$ , d. h.

a. Die zu den gemeinschaftlichen Sehnen eines Kreises und einer Ellipse parallelen Ellipsendurchmesser sind gleich.

Da die Axen die von gleichen Durchmessern gebildeten Winkel halbieren, so folgt weiter:

b. Die Halbierungslinien der von den gemeinschaftlichen Sehnen eines Kreises und einer Ellipse gebildeten Winkel sind den Axen parallel.

293. In den Punkten  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}_1$  seien an den Scheitelkreis zwei Tangenten gezogen und durch einen Punkt  $\mathfrak{P}$  desselben eine Gerade  $\mathfrak{H}\mathfrak{H}_1$  symmetrisch zu beiden, welche den Kreis zum zweiten Male in  $\mathfrak{P}_1$  schneidet. Dann ist

$$\mathfrak{H}\mathfrak{C}^2 = \mathfrak{H}\mathfrak{P} \cdot \mathfrak{H}\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{H}\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{H}_1\mathfrak{P}.$$

Fällt man aus  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  auf die Berührungssehne  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  und die Tangente  $\mathfrak{H}\mathfrak{C}$  die Senkrechten  $s$ ,  $p$ ,  $p_1$ , so findet man aus ähnlichen Dreiecken

$$s : p = \mathfrak{H}\mathfrak{C} : \mathfrak{H}\mathfrak{P} \text{ und } s : p_1 = \mathfrak{H}\mathfrak{C} : \mathfrak{H}\mathfrak{P}_1,$$

also  $s^2 : p \cdot p_1 = \mathfrak{H}\mathfrak{C}^2 : \mathfrak{H}\mathfrak{P} \cdot \mathfrak{H}\mathfrak{P}_1$ , also  $s^2 = p \cdot p_1$ , d. h.



a. Fällt man auf zwei Tangenten eines Kreises und auf die Berührungssehne die Senkrechten aus einem Kreispunkte, so ist das Rechteck der ersteren gleich dem Quadrate der letzten.




Fig. 109.

Die Gerade  $\mathfrak{H}\mathfrak{H}_1$  schneide die Ellipse in  $P$  und  $P_1$ . Fällt man aus ihnen die Senkrechten  $p$  und  $p_1$  auf die Ellipsentangenten, so ist

$$p : \mathfrak{H}\mathfrak{P} = DG : D\mathfrak{C} \text{ und } p : HP = DG : DC,$$

also wegen 272 b.

$$p = p_1 \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{DC}{D\mathfrak{C}} \quad \text{und} \quad p_1 = p \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{DC}{D\mathfrak{C}}$$

$$s^2 = p \cdot p_1 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{DC^2}{D\mathfrak{C}^2}$$

b. Fällt man aus einem Ellipsenpunkte die Senkrechten auf zwei Tangenten und auf die Berührungssehne, so steht das Rechteck der ersteren zum Quadrate der letzten in einem konstanten Verhältnisse.

294. Im Berührungspunkte  $C$  ziehe man  $CO$  senkrecht zur Tangente und beschreibe um  $O$  mit  $OC$  einen Kreis, so berührt er auch die andere Tangente in  $C_1$ . Bezeichnet man die Potenz des Kreises  $O$  im Punkte  $P$  mit  $K_p$ , so ist

$$K_p = PE \cdot PE_1 = PF^2 - EF^2.$$

Ferner ist  $PH \cdot PH_1 = HF^2 - PF^2$ , also

$$K_p = HF^2 - EF^2 - PH \cdot PH_1$$



$$= HE \cdot H_1 E - PH \cdot PH_1$$

$$HE \cdot H_1 E = HE \cdot HE_1 = HC^2 = s^2 \cdot \frac{DC^2}{DG^2},$$

also

$$\begin{aligned} K_p &= s^2 \cdot \frac{DC^2}{DG^2} - p \cdot p_1 \cdot \frac{DC^2}{DG^2} = \frac{DC^2}{DG^2} \left( s^2 - s^2 \cdot \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{D\mathfrak{C}^2}{DC^2} \right) \\ &= \frac{s^2}{DG^2} \cdot \frac{a^2 \cdot DC^2 - b^2 \cdot D\mathfrak{C}^2}{a^2} \\ &= \frac{s^2}{DG^2} \cdot \frac{a^2 (DG^2 + CG^2) - b^2 \cdot (DG^2 + \mathfrak{C}G^2)}{a^2} \end{aligned}$$

Aber  $CG : \mathfrak{C}G = b : a$ , also  $CG \cdot a = \mathfrak{C}G \cdot b$ , daher

$$K_p = s^2 \cdot \frac{e^2}{a^2}, \text{ d. h.}$$

Die Potenz eines Ellipsenpunktes in Bezug auf einen doppelt berührenden Kreis steht zum Quadrate seiner Entfernung von der Berührungssehne in einem konstanten Verhältnisse.

Dieser Satz läßt sich erweitern.

Ein Kreis mit dem Mittelpunkte  $O$  auf der Hauptaxe schneide die Ellipse in  $C' C_1' C'' C_1''$ ; die parallelen Verbindungs-




Fig. 110.

linien treffen den Scheitelkreis in  $\mathfrak{C}' \mathfrak{C}_1' \mathfrak{C}'' \mathfrak{C}_1''$ . Die Gerade  $\mathfrak{P} P$  sei senkrecht zur Hauptaxe. Dann ist

$$\mathfrak{H}\mathfrak{C}' \cdot \mathfrak{H}\mathfrak{C}'' = \mathfrak{H}\mathfrak{P} \cdot \mathfrak{H}\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{H}\mathfrak{P} \cdot \mathfrak{H}_1 \mathfrak{P}.$$

Die Senkrechten aus  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  auf  $\mathfrak{C}' \mathfrak{C}''$  seien  $p$  und  $p_1$



und diejenigen auf  $\mathfrak{C}'C'$  und  $\mathfrak{C}''C''$  seien  $s_1$  und  $s_{11}$ , so folgt wieder

$$s_1 \cdot s_{11} = p \cdot p_1.$$

Fällt man ferner  $p$  und  $p_1$  senkrecht aus  $P$  und  $P_1$  auf  $C'C''$ , so ist

$$s_1 \cdot s_{11} = p \cdot p_1 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{DH^2}{D\mathfrak{S}^2}, \text{ d. h.}$$

Zieht man aus einem Punkte der Hauptaxe zwei gegen diese gleich geneigte Gerade und zieht die parallelen Verbindungslinien ihrer Schnittpunkte mit der Ellipse, so steht das Produkt der Entfernungen eines Ellipsenpunktes von den ersteren zu demjenigen von den letzteren in einem konstanten Verhältnisse.

295. Man bezeichne wieder die Potenz des Kreises  $O$  im Punkte  $P$  mit  $K_p$ , dann ist wie vorher

$$K_p = HE \cdot HE_1 - PH \cdot P_1H$$

$$\text{Aber } HE \cdot HE_1 = HC' \cdot HC'' = s_1 \cdot s_{11} \cdot \frac{DH^2}{DF^2}$$

$$PH \cdot P_1H = p \cdot p_1 \cdot \frac{DH^2}{DF^2} = s_1 \cdot s_{11} \cdot \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{D\mathfrak{S}^2}{DF^2}$$

Also

$$K_p = \frac{s_1 \cdot s_{11}}{DF^2} \cdot \left( DH^2 - \frac{b^2}{a^2} \cdot D\mathfrak{S}^2 \right)$$

und nach einigen Reduktionen

$$K_p = s_1 \cdot s_{11} \cdot \frac{e^2}{a^2}, \text{ d. h.}$$

a. Die Potenz eines Ellipsenpunktes in Bezug auf einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf der Hauptaxe liegt, steht zum Produkte seiner Entfernungen von den parallelen Schnittsehnen in konstantem Verhältnisse.

Drückt man in der letzten Gleichung  $s_1 \cdot s_{11}$  durch  $p \cdot p_1$  aus, so erhält man

$$K_p = p \cdot p_1 \cdot \frac{e^2}{b^2} \cdot \frac{DH^2}{D\mathfrak{S}^2}, \text{ d. h.}$$

b. Die Potenz eines Ellipsenpunktes in Bezug auf einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf der Hauptaxe liegt, steht zum Produkte seiner Entfernungen von zwei gegen die Hauptaxe gleich geneigten Geraden, die sich auf der letzteren schneiden, in einem konstanten Verhältnisse.

296. Ein Kreis  $O$  schneide einen Kegelschnitt in den Punkten



$CDEF$ , dann sind die Sehnen  $CD$  und  $EF$  gegen die Axen gleich geneigt. Die erstere schneide die Hauptaxe in  $G$ , durch




Fig. 111.

$G$  ziehe man die Sehne  $C'D' \parallel EF$ , so liegen die vier Punkte  $CDC'D'$  auf einem Kreise  $O'$ , dessen Mittelpunkt auf der Hauptaxe liegt.

Von einem beliebigen Kegelschnittpunkte  $P$  fälle man auf  $CD$  und  $C'D'$  die Senkrechten  $p$  und  $p'$ , dann ist nach dem

letzten Satze, wenn  $\lambda$  eine Konstante bedeutet,

$$K_{p'} = p \cdot p' \cdot \lambda.$$

Fällt man  $PQ$  senkrecht auf die Centrale  $OO'$  und ist  $R$  der Schnittpunkt der letzteren mit der Potenzlinie  $CD$  der Kreise  $O$  und  $O'$ , so ist

$$\begin{aligned} K_{p'} - K_p &= -(O'P^2 - r'^2 - OP^2 + r^2) \\ &= -(O'Q^2 - OQ^2 - (O'R^2 - OR^2)) \\ &= OO' (O'Q + OQ + O'R + OR) \\ &= 2OO' \cdot p. \end{aligned}$$

Statt des Punktes  $P$  wähle man den Punkt  $E$  und fälle von ihm auf  $CD$  und  $C'D'$  die Senkrechten  $e$  und  $e'$ , dann ist zunächst

$$K_{e'} = e \cdot e' \cdot \lambda, \quad K_e = 0,$$

also

$$2OO' \cdot e' = e \cdot e' \cdot \lambda \quad \text{und} \quad 2OO' = e \cdot \lambda$$

und daher

$$K_p = p \cdot p' \cdot \lambda - e \cdot p \cdot \lambda = p \cdot (p' - e) \cdot \lambda, \quad \text{d. h.}$$

*Die Potenz eines Ellipsenpunktes in Bezug auf einen Kreis, der die Ellipse in vier reellen Punkten schneidet, steht zum Produkte seiner Entfernungen von solchen zwei gemeinschaftlichen Sehnen, welche mit einer Axe gleiche Winkel bilden, in einem konstanten Verhältnisse.*

Aus dem letzten Satze folgt übrigens, dass die vorhergehenden Sätze auch für den Fall gelten, dass der Mittelpunkt des Kreises auf der Nebenaxe liegt. Man kann die letzteren jedoch in analoger Art herleiten, wenn man statt des Scheitel-



kreises denjenigen Kreis zu Hülfe nimmt, der die Ellipse in den Scheiteln der Nebenaxe berührt.

### 297. Die gleichseitige Hyperbel.

Eine Hyperbel heißt gleichseitig, wenn ihre Axen gleich sind, also der Asymptotenwinkel ein Rechter ist.




Fig. 112.

Es sei  $AA_1$  die gemeinsame Hauptaxe einer Hyperbel  $\mathfrak{H}$  mit den Axen  $2a$  und  $2b$  und einer gleichseitigen Hyperbel  $H$ . Eine Senkrechte zur Hauptaxe treffe die erstere in  $C$ , die andere in  $C_1$ , die Hauptaxe in  $D$ ; von  $D$  ziehe man die Tangente  $DE$  an den Scheitelkreis, dann ist

$$CD : DE = b : a$$

$$\text{und } C_1D = DE,$$

also  $CD : C_1D = b : a$ , d. h.

a. Jede zur Hauptaxe senkrechte Gerade wird durch eine Hyperbel und die gleichseitige Scheitelhyperbel in Sehnen geschnitten, die sich verhalten, wie die Nebenaxe zur Hauptaxe.

Von zwei konjugierten Durchmessern einer Hyperbel trifft nur einer dieselbe; die Größe des andern wird durch die *konjugierte Hyperbel* bestimmt, welche dieselben Axen hat, aber auf der Nebenaxe die Strecke  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1 = 2b$  als Hauptaxe und auf der Hauptaxe die Strecke  $AA_1 = 2a$  als Nebenaxe hat. Daher ist die Gleichung der konjugierten Hyperbel  $\mathfrak{H}_1$

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

Die gleichseitige Hyperbel mit der Hauptaxe  $AA_1$  hat auch eine konjugierte Hyperbel  $H_1$ , die ebenfalls gleichseitig ist und deren Gleichung ist

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

Wenn daher eine Senkrechte zur Axe  $AA_1$  die beiden Hyperbeln in  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}_1$  schneidet, so gelten die Gleichungen



$$\frac{\mathfrak{C}\mathfrak{D}^2}{b^2} - \frac{M\mathfrak{D}^2}{a^2} = 1, \text{ und } \frac{\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}^2}{a^2} - \frac{M\mathfrak{D}^2}{a^2} = 1$$

Durch Subtraktion folgt

$$\mathfrak{C}\mathfrak{D} : \mathfrak{C}_1\mathfrak{D} = b : a, \text{ d. h.}$$

b. Jede zur Hauptaxe senkrechte Gerade wird von den beiden konjugierten Hyperbeln  $\mathfrak{H}_1$  und  $H_1$  in Sehnen geschnitten, die sich verhalten wie die Axen.

298. Bildet man wie in 273. die Ebene auf sich selbst mittelst des Verhältnisses  $b : a$  ab, so ist die gleichseitige Hyperbel  $H$  das Bild von  $\mathfrak{H}$  und  $H_1$  dasjenige von  $\mathfrak{H}_1$ . — Das Bild einer Geraden ist wieder eine Gerade, welche die erste auf der Axe  $AA_1$  schneidet; die Bilder von harmonischen Punkten oder Geraden sind wieder harmonisch, die Bilder von Pol und Polare wieder Pol und Polare, von konjugierten Elementen wieder konjugierte Elemente (Cf. 274). Mittelst dieser Abbildung lassen sich die Eigenschaften der Hyperbel aus denen der gleichseitigen Hyperbel in ähnlicher Weise ableiten, wie diejenigen der Ellipse aus den Eigenschaften des Scheitelkreises. Hauptsächlich übertragbar sind die metrischen Beziehungen, weil die Abbildung selbst auf einer solchen beruht. — Zuvor sind daher einige Haupteigenschaften der gleichseitigen Hyperbel zu entwickeln.

299. Je zwei konjugierte Durchmesser einer gleichseitigen Hyperbel sind einander gleich.




Fig. 113.

Ist  $ME$  irgend ein Halbmesser einer gleichseitigen Hyper-



bel  $H$ ,  $C$  und  $D$  die Schnittpunkte der Asymptoten mit der Tangente in  $E$ ,  $MC_1 = MC$ , so ist  $C_1D$  Tangente an die konjugierte Hyperbel. Ist  $E_1$  der Berührungspunkt, so ist

$$C_1E_1 = E_1D = DE = EC, \text{ also}$$

$$ME_1 \parallel CD \text{ und } ME_1 = ME.$$

300. *Irgend zwei Durchmesser bilden denselben Winkel, wie ihre konjugierten Durchmesser.*

Sind  $ME$  und  $MF$  irgend zwei Halbmesser, so findet man nach vorigem Satze die konjugierten, indem man  $EE_1$  und  $FF_1$  senkrecht auf die Asymptote  $MD$  fällt und  $ME_1$ ,  $MF_1$  zieht. Aus Symmetriegründen folgt

$$\sphericalangle EMF = E_1MF_1.$$

301. *Jede Sehne einer gleichseitigen Hyperbel erscheint den beiden Endpunkten eines Durchmessers unter gleichen oder Supplementwinkeln.*

Sind  $EG$  die Endpunkte einer Sehne,  $FF'$  diejenigen eines Durchmessers, so sind sowohl die Geraden  $FE$  und  $F'E$  als  $FG$  und  $F'G$  konjugierten Durchmessern parallel (279 d. 274), also bilden nach vorigem Satze  $FE$  und  $FG$  denselben Winkel wie die konjugierten Richtungen  $F'E$  und  $F'G$ .

302. *Jede Sehne einer gleichseitigen Hyperbel teilt den ihr konjugierten Durchmesser in solche Abschnitte, dass ihre Hälfte zwischen denselben die mittlere Proportionale ist.*

Sind  $CD$  und  $EF$  konjugierte Gerade, so ist  $EG = FG$ . Da ferner  $CE$  und  $DE$  konjugierten Durchmessern parallel sind so ist




Fig. 114.



$\sphericalangle ECG = DEG$  und daher  $\triangle EGC \sim EGD$ ,

also

$$CG : EG = EG : DG$$

oder auch  $EG^2 = CG \cdot DG = MG^2 - MC^2$

303. Wenn sich zwei Sehnen einer gleichseitigen Hyperbel schneiden, so verhalten sich die Rechtecke aus ihren Abschnitten, wie die Quadrate der parallelen Durchmesser.

Die Sehnen  $CD$  und  $EF$  schneiden sich in  $G$ ; ist dann  $H$  die Mitte von  $CD$ , so ist  $CH^2 = HJ \cdot HK = HM^2 - MJ^2$ , also  $CH^2 - GH^2 = CG \cdot DG = HM^2 - MJ^2 - GH^2$ .




Fig. 115.

Zieht man  $C_1D_1 \parallel CD$  durch den Schnittpunkt von  $GM$  mit der Hyperbel, so ist auch  $C_1H_1 = H_1D_1$  und  $H_1M^2 - MJ^2 = C_1H_1^2$ .

Aus der Proportion  $HM : GH = H_1M : C_1H_1$  folgt

$$HM^2 - GH^2 : H_1M^2 - C_1H_1^2 = HM^2 : H_1M^2 = GM^2 : C_1M^2$$

also  $HM^2 - GH^2 = MJ^2 \cdot \frac{GM^2}{C_1M^2}$

und  $CG \cdot DG = MJ^2 \left( \frac{GM^2}{C_1M^2} - 1 \right)$

Daraus ergibt sich:

$$CG \cdot DG : EG \cdot FG = MJ^2 : MJ_1^2$$


wenn  $MJ_1$  der zu  $EF$  parallele Halbmesser ist. (Cf. Seite 177).

304. Hieraus aber folgt allgemein:

Wenn sich zwei Sehnen einer (beliebigen) Hyperbel schneiden, so verhalten sich die Rechtecke aus ihren Abschnitten, wie die Quadrate der parallelen Durchmesser.



Die Sehnen  $DE$  und  $FG$  einer Hyperbel  $\mathfrak{H}$  schneiden sich in  $C$ ; es sei  $\mathfrak{H}_1$  die konjugierte Hyperbel, ferner  $H$  die gleichseitige Scheitelhyperbel und  $H_1$  die zu ihr konjugierte gleichseitige Hyperbel. Sind dann  $DD_1$ ,  $EE_1$ ,  $FF_1$ ,  $GG_1$  senkrecht zu  $AA_1$ , so schneiden sich  $D_1E_1$  und  $DE$  sowie  $F_1G_1$  und



Ftg. 116.

$FG$  auf der Hauptaxe. Endlich sei  $ML \parallel DE$ ,  $MJ \parallel FG$ ,  $LL_1 \perp AA_1$ ,  $JJ_1 \perp AA_1$ , so ist  $ML_1 \parallel D_1E_1$ ,  $MJ_1 \parallel F_1G_1$ . Die Geraden  $D_1E_1$  und  $F_1G_1$  schneiden sich in einem Punkte  $C_1$  so, daß  $CC_1 \perp AA_1$ . Aus ähnlichen Dreiecken folgt:

$$DC : D_1C_1 = EC : E_1C_1 = DK : D_1K = LM : L_1M$$

und 
$$DC \cdot EC = D_1C_1 \cdot E_1C_1 \cdot \left(\frac{LM}{L_1M}\right)^2$$

$$FC \cdot GC = F_1C_1 \cdot G_1C_1 \cdot \left(\frac{JM}{J_1M}\right)^2$$

Da aber  $D_1C_1 \cdot E_1C_1 : F_1C_1 \cdot G_1C_1 = ML_1^2 : MJ_1^2$

so folgt

$$DC \cdot EC : FC \cdot GC = LM^2 : JM^2$$

305. Gleichung der Hyperbel in Bezug auf zwei konjugierte Durchmesser.

Sind  $a_1$  und  $b_1$  die Längen zweier konjugierten Halbmesser,  $x$  und  $y$  die zu ihnen parallelen Ordinaten eines Hyperbelpunktes, so folgt wie 291.

$$\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1.$$



Hieraus folgt als Gleichung der gleichseitigen Hyperbel, da  $a_1 = b_1$  ist

$$x^2 - y^2 = a_1^2.$$

306. *Die Differenz der Quadrate zweier konjugierten Durchmesser einer Hyperbel ist gleich der Differenz der Axenquadrate.*

Sind (Fig. 112)  $MC$  und  $M\mathfrak{C}$  zwei konjugierte Halbmesser,  $CC_1$  und  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  senkrecht zu  $AA_1$ , so ist wie aus Symmetriegründen sofort sich ergibt,  $MD = \mathfrak{C}_1\mathfrak{D}$ ,  $M\mathfrak{D} = C_1D$ . Ferner

$$MC^2 = MD^2 + CD^2 = MD^2 + \frac{b^2}{a^2} \cdot C_1D^2$$

$$M\mathfrak{C}^2 = M\mathfrak{D}^2 + \mathfrak{C}\mathfrak{D}^2 = C_1D^2 + \frac{b^2}{a^2} \cdot MD^2$$

$$MC^2 - M\mathfrak{C}^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cdot (MD^2 - C_1D^2) = a^2 - b^2.$$

307. *Wenn sich zwei Sehnen einer gleichseitigen Hyperbel, welche zwei konjugierten Durchmessern parallel sind, schneiden, so sind die Rechtecke aus ihren Abschnitten gleich.*

Folgt aus 304. und 299.

308. *Zwei rechtwinklige Sehnen einer gleichseitigen Hyperbel teilen sich in solche Abschnitte, daß die Rechtecke aus denselben einander gleich sind.*

Folgt aus 303, da je zwei rechtwinklige Durchmesser einander gleich sind.

309. *Der Höhenpunkt eines jeden einer gleichseitigen Hyperbel eingeschriebenen Dreiecks liegt auch auf ihr.* Cf. 194.

Ist  $ABC$  ein eingeschriebenes Dreieck,  $CD$  die Höhe auf  $AB$ ,  $H$  der auf  $CD$  liegende Höhenschnittpunkt, so folgt aus ähnlichen Dreiecken

$$AD \cdot BD = CD \cdot HD,$$

also liegt  $H$  nach 308. auf der Hyperbel.

311. *Wenn sich zwei gleichseitige Hyperbeln in vier Punkten schneiden, so ist jeder der Höhenpunkt des von den drei anderen gebildeten Dreiecks.*

Folgt aus dem vorhergehenden Satze.

311a. Die beiden letzten Sätze lassen sich auch auf folgende Art ableiten.

$ABC$  sei ein eingeschriebenes Dreieck,  $CD$  senkrecht



auf  $AB$  und  $H$  der Schnittpunkt mit der gleichseitigen Hyperbel. Um  $H$  beschreibe man einen Kreis und bilde von der Hyperbel die Polarisationsfigur. Diese ist eine Parabel. Denn die Polare von  $H$  ist die unendlich ferne Gerade. Zieht man von  $H$  aus nach den Berührungspunkten der Asymptoten die Verbindungslinien, so stehen sie auf einander senkrecht und die Polaren dieser Berührungspunkte sind also zwei sich in  $H$  rechtwinklig schneidende Tangenten der Parabel. Also liegt  $H$  auf der Leitlinie der Parabel. Die Polaren  $a_1 b_1 c_1$  von  $ABC$  bilden ein der Parabel umgeschriebenes Dreieck, dessen Höhenpunkt (221) auf der Leitlinie liegen muß. Da aber der Schnittpunkt  $(a_1 b_1)$  auf der Senkrechten  $CHD$  liegen muß, so ist  $H$  der Höhenpunkt des Dreiecks  $a_1 b_1 c_1$ , also auch des Dreiecks  $ABC$ , weil die Polare eines Punktes auf seiner Centrale senkrecht steht.

## § 20.

## Die Berührungskreise eines Kegelschnittes.

312. Ein Kegelschnitt wird von einem Kreise im Allgemeinen in vier Punkten  $ABCD$  geschnitten: Wenn von diesen vier Schnittpunkten zwei, etwa  $A$  und  $B$  in einen zusammenfallen, so haben der Kegelschnitt und der Kreis in diesem eine *Berührung der ersten Ordnung*; wenn zwei Paar Schnittpunkte, etwa  $A$  mit  $B$  und  $C$  mit  $D$  zusammenfallen, so berühren sich die beiden Kurven *doppelt*; wenn drei der vier Schnittpunkte, etwa  $ABC$ , in einen  $A$  zusammenfallen, so hat der Kreis in diesem eine Berührung der *zweiten Ordnung*. Der Kreis heißt der *Krümmungskreis* des Kegelschnittes im Punkte  $A$ . Fallen endlich alle vier Schnittpunkte zusammen, so haben Kreis und Kegelschnitt eine Berührung der *dritten Ordnung*; doch kann man im Allgemeinen keinen Kreis beschreiben, der mit einem Kegelschnitte eine Berührung dritter Ordnung eingeht, denn zur Bestimmung eines Kreises sind drei Punkte hinreichend.

313. Aus der Erzeugung des Kegelschnittes durch Brennpunkt und Leitlinie (cf. 247), also als Ort eines Punktes, dessen Abstände von einem festen Punkte  $B$  und einer festen Geraden  $l$  ein konstantes Verhältniß haben, geht eine Gruppe von







Aus dieser Konstruktion ergibt sich eine Haupteigenschaft der Tangenten.

Die Tangente in  $F$  schneide die beiden Leitlinien in  $P$  und  $P_1$ ; da  $NF^2 = NE^2 = NB \cdot ND$  (4 c.), so muß der durch  $BDF$  gelegte Kreis  $NF$  in  $F$  berühren. Sein Mittelpunkt muß auf  $PF$  liegen, weil  $\sphericalangle NFP = 90^\circ$  ist und daher auch durch  $P$  gehen, da auch  $\sphericalangle FDP = 90^\circ$  ist. Im Kreisvierecke  $B FDP$  ist  $\sphericalangle BFP = \sphericalangle BDP$ . Aus gleichen Gründen folgt für den zweiten Brennpunkt  $B_1$ , daß  $B_1 F D_1 P_1$  ein Kreisviereck und  $\sphericalangle B_1 F P_1 + \sphericalangle B_1 D_1 P_1 = 180^\circ$  ist; wegen Kongruenz der Dreiecke  $BCD$  und  $B_1 C_1 D_1$  folgt, daß  $\sphericalangle BDC = \sphericalangle B_1 D_1 C_1$ , also auch

$$\sphericalangle BFP = \sphericalangle B_1 F P_1$$

ist, d. h.

*Die Tangente bildet mit den Brennpunktsstrahlen des Berührungspunktes gleiche Winkel.* Cf. 252.

314. Aus ähnlichen Dreiecken folgert man leicht

$$\begin{aligned} FO : FN : ON &= HM : HN : MN \\ &= CD : HN : MN \\ &= CB : CM : MB \end{aligned}$$

Da  $MB \cdot MC = MA^2 = a^2$ ,  $MB = e$ , so folgt

$$MC = \frac{a^2}{e}, \quad BC = MC - MB = \frac{a^2}{e} - e = \frac{a^2 - e^2}{e} = \frac{b^2}{e}$$

und

$$FO : FN : ON = b^2 : a^2 : e^2$$

d. h. *die Abschnitte, in welche Tangente und Axen eine Normale teilen, verhalten sich wie die Quadrate der Halbaxen und der Excentricität.* Cf. 289.

315. Aus den ähnlichen Dreiecken  $BFO$  und  $BDF$  folgt

$$BO : BF = BF : DF = AB : AC = e : a,$$

d. h. *die Strecke der Hauptaxe zwischen Normale eines Punktes und Brennpunkt verhält sich zur Brennpunktsentfernung dieses Punktes wie die Excentricität zur Hauptaxe.*

Bei der Parabel ist  $BO = BF$ .

316. Tangente und Normale stehen aufeinander senkrecht und halbieren die Winkel der Brennpunktsstrahlen nach ihrem Schnittpunkte (313), sind mithin vier harmonische Strahlen und schneiden die Hauptaxe in vier harmonischen Punkten,



von denen zwei zugeordnete die Brennpunkte sind. Diese werden also durch jedes Paar Tangente und Normale harmonisch getrennt, d. h.

*Die Paare von Tangente und Normale bestimmen auf der Hauptaxe eine Involution, welche den Mittelpunkt des Kegelschnittes zum Centrum und das Quadrat der halben Excentricität zur Potenz hat.*

Aus Symmetriegründen folgt:

*Der Kreis um  $O$  mit  $OF$  berührt den Kegelschnitt doppelt.*

317. Diejenigen Kreise, welche einen Kegelschnitt doppelt berühren, teilen sich in zwei Gruppen, in solche, die ihn umschliessend berühren und deren Mittelpunkte auf der Hauptaxe liegen und in solche, welche den Kegelschnitt innerhalb berühren und ihre Mittelpunkte auf der Nebenaxe haben. Die ersteren liegen ganz ausserhalb, die letzteren ganz innerhalb des Kegelschnittes.

Wenn der Punkt  $F$  nach  $A$  rückt, so rückt der Punkt  $N$  nach  $M$  und der zur ersten ausserhalb liegenden Gruppe gehörige Kreis wird der Scheitelkreis, welcher den Kegelschnitt in  $A$  und  $A_1$  berührt. Die Lage des Punktes  $O$ , welcher nach  $O'$  rücken mag, muss aus der Gleichung  $AO' : AM = b^2 : a^2$  bestimmt werden und da  $AM = a$  ist, so wird

$$AO' = \frac{b^2}{a}.$$

Macht man auf der Hauptaxe  $MO'' = MO'$ , so befinden sich zwischen  $O'$  und  $O''$  die Mittelpunkte aller derjenigen doppelt berührenden Kreise, welche innerhalb des Kegelschnittes liegen.

Gelangt der Punkt  $F$  in einen Scheitel  $\mathfrak{A}$  der Nebenaxe, so fällt  $O$  mit  $M$  und  $N$  mit einem Punkte  $N'$  zusammen, welcher wieder aus der Gleichung  $\mathfrak{A}M : \mathfrak{A}N' = b^2 : a^2$  bestimmt wird, so dass also, da  $\mathfrak{A}M = b$  ist,

$$\mathfrak{A}N' = \frac{a^2}{b}$$

wird. Schneidet man also auf der Nebenaxe  $MN'' = MN'$  ab, so befinden sich zwischen  $N'$  und  $N''$  die Mittelpunkte aller Kreise, welche den Kegelschnitt doppelt berühren und ihn umschliessen.



Die mit  $O'A$  um  $O'$  und  $N'\mathfrak{A}$  um  $N'$  beschriebenen Kreise sind die Krümmungskreise in den Scheiteln  $A$  und  $\mathfrak{A}$ . Die Abstände ihrer Mittelpunkte vom Mittelpunkte der Ellipse findet man durch die Gleichungen

$$MO' = a - \frac{b^2}{a} = \frac{e^2}{a}$$

$$MN' = \frac{a^2}{b} - b = \frac{e^2}{b}.$$

Der Radius des ersten Kreises ist gleich dem halben Parameter, also gleich der halben auf der Hauptaxe senkrechten Brennpunktssehne.

Den Mittelpunkt  $N'$  findet man bequem, indem man im Brennpunkte  $B$  auf der Geraden  $\mathfrak{A}B$ , welche einen Scheitel der Nebenaxe mit dem Brennpunkte verbindet, die Senkrechte bis zum Durchschnitte mit der Nebenaxe erhebt.




Fig. 118.

318. Tangente und Normale in  $F$  schneiden die Nebenaxe in  $N$  und  $\mathfrak{N}$ ; nach 289 a. ist

$$MN \cdot M\mathfrak{N} = MB^2,$$

also geht der über  $N\mathfrak{N}$  als Durchmesser beschriebene Kreis durch  $B$  und, weil  $\sphericalangle NF\mathfrak{N} = 90^\circ$ , auch durch  $F$  und es ist  $\sphericalangle F\mathfrak{N}\mathfrak{N} = FB\mathfrak{N} = \varphi$ .

Fällt man  $BC$  senkrecht auf die Tangente  $F\mathfrak{N}$  und macht

$$BC' = BF, \text{ so ist}$$

$$BC : BC' = BC : BF.$$

Da aber  $\sphericalangle CBF = BFN = BB_1N = MBN$ , so folgt aus ähnlichen Dreiecken  $BC : BF = BM : BN$ .

Der Punkt  $C$  liegt auf dem Scheitelkreise; wird der letztere von  $C$  durchlaufen und auf  $BC$  der Punkt  $C'$  stets durch die Proportion  $BC : BC' = BM : BN$  bestimmt, so durchläuft  $C'$



einen Kreis  $N'$ , dessen Mittelpunkt  $N'$  auf  $BM$  liegt, weil  $B$  der Ähnlichkeitspunkt des Kreises  $N'$  und des Scheitelkreises ist. Es ist also  $BM:BN' = BC:BC'$ .

Dreht man nun den Kreis  $N'$  um den Punkt  $B$  um einen Winkel von  $90^\circ - \varphi$ , so fällt  $N'$  auf  $N$ ,  $C'$  auf  $F$ , also der Kreis  $N'$  auf den Kreis  $N$ .

Ist  $\mathfrak{C}$  irgend eine Lage des Punktes  $C$  auf dem Scheitelkreise,  $\mathfrak{C}'$  der Schnittpunkt von  $B\mathfrak{C}$  mit dem Kreise  $N'$ , so fällt nach der Drehung  $\mathfrak{C}'$  auf einen Punkt  $\mathfrak{D}$  des Kreises  $N$ .

Da  $\sphericalangle \mathfrak{C}'B\mathfrak{D} = N'BN = 90^\circ - \varphi$

und  $B\mathfrak{C}:B\mathfrak{D} = B\mathfrak{C}:B\mathfrak{C}' = BM:BN$

ist, so ist  $\triangle B\mathfrak{C}\mathfrak{D} \sim BMN$  und  $\sphericalangle B\mathfrak{C}\mathfrak{D} = BMN = 90^\circ$   
und  $\sphericalangle B\mathfrak{D}\mathfrak{C} = BNM = \varphi$ .

Mithin ist  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  eine Tangente des Kegelschnittes und es folgt:

*Die Geraden, welche einen Brennpunkt mit den Schnittpunkten der Kegelschnitttangente und eines Brennkreises verbinden, sind gegen diese unter gleichen Winkeln geneigt.*

Ebenso beweist man die Umkehrung.

*Zieht man von einem Punkte Gerade nach den Punkten eines Kreises und in diesen andere Gerade, welche mit jenen einen bestimmten Winkel einschließen, so sind die letzteren Tangenten eines Kegelschnittes, welcher den Kreis doppelt berührt.*

319. Auf dem Kegelschnitte sei  $F_1$  ein beliebiger Punkt,  $F_1T$  die halbe kürzeste Sehne durch ihn in dem Kreise  $N$ ,  $F_1L_1$  senkrecht zur Nebenaxe, dann ist

$$\begin{aligned} F_1T^2 &= NT^2 - F_1N^2 = FN^2 - F_1N^2 \\ &= FL^2 + LN^2 - F_1L_1^2 - NL_1^2. \end{aligned}$$

Nach 290. 304 ist

$$FL^2 : \mathfrak{A}L \cdot \mathfrak{A}_1L = a^2 : b^2 = FL^2 : b^2 - ML^2$$

und  $F_1L_1^2 : b^2 - ML_1^2 = a^2 : b^2$ ,

$$\begin{aligned} \text{also } F_1T^2 &= \frac{a^2}{b^2} (ML_1^2 - ML^2) + NL^2 - NL_1^2 \\ &= \frac{a^2}{b^2} \cdot LL_1 (ML_1 - ML) + LL_1 (NL + NL_1). \end{aligned}$$

Aber  $NL + NL_1 = 2NM - (ML_1 - ML)$  und da

$$NM:ML = NO:OF = e^2:b^2$$



$$\begin{aligned}
 F_1 T^2 &= L L_1 (M L_1 - M L) \cdot \frac{e^2}{b^2} + 2 M L \cdot L L_1 \cdot \frac{e^2}{b^2} \\
 &= L L_1^2 \cdot \frac{e^2}{b^2},
 \end{aligned}$$

mithin

$$F_1 T : L L_1 = e : b, \text{ d. h.}$$




Fig. 119.

Zieht man durch einen Punkt eines Kegelschnittes in einem denselben doppelt berührenden umschließenden Kreise die halbe kürzeste Sehne und die Senkrechte auf die Berührungssehne, so ist das Verhältniß der beiden Strecken konstant gleich dem Verhältniß der Excentricität zur Nebenaxe.

320. In  $F_1$  errichte man die Normale  $F_1 N_1$  und beschreibe mit ihr um  $N_1$  den doppelt berührenden Kreis. Durch einen Punkt  $P$  auf dem Kegelschnitte, welcher zwischen beiden Berührungssehnern liegen mag, denke man sich in jedem der Berührungskreise die halbe kürzeste Sehne  $s$  und  $s_1$  gezogen und auf die Berührungssehnern die Senkrechten  $p$  und  $p_1$  gefällt, so verhält sich

$$s : p = s_1 : p_1 = e : b,$$

also auch

$$s + s_1 : p + p_1 = e : b$$



$$s + s_1 = LL_1 \cdot \frac{e}{b}.$$

Liegt  $P$  nicht zwischen den Berührungssehnern, so wird man erhalten

$$s - s_1 = LL_1 \cdot \frac{e}{b}, \text{ d. h.}$$

*Zieht man durch einen Punkt eines Kegelschnittes in zwei doppelt berührenden umschließenden Kreisen die kürzesten Sehnen, so ist ihre Summe oder Differenz konstant, jenachdem der Punkt zwischen den Berührungssehnern liegt oder nicht.*

321. Ist  $P$  einer der beiden Punkte, in denen die gemeinschaftliche Sehne der beiden Kreise den Kegelschnitt trifft, so ist  $s = s_1$ , also auch  $p = p_1$ , d. h.

*Die gemeinschaftliche Sehne zweier umschließenden doppelt berührenden Kreise ist von beiden Berührungssehnern gleich weit entfernt.*

322. Aus den Proportionen

$$NM : ML = N_1M : ML_1 = e^2 : b^2 \text{ folgt}$$

$$NN_1 : LL_1 = e^2 : b^2, \text{ d. h.}$$

*Wenn zwei Kreise einen Kegelschnitt umschließend doppelt berühren, so steht die Entfernung der Mittelpunkte zur Entfernung der Berührungssehnern in einem konstanten Verhältnisse.*

323. Beschreibt man um die Punkte  $O$  und  $O_1$  mit den Radien  $OF$  und  $O_1F_1$  Kreise, so berühren diese den Kegelschnitt doppelt und sind von ihm eingeschlossen. Von solchen Kreisen ergeben sich in analoger Weise die Sätze:

a. *Zieht man durch einen Kegelschnittspunkt an einen doppelt berührenden Kreis die Tangente, so ist ihr Verhältniss zur Entfernung des Punktes von der Berührungssehne konstant, und zwar gleich dem Verhältnisse der Excentricität zur Hauptaxe.*

b. *Zieht man durch einen Kegelschnittspunkt an zwei doppelt berührende eingeschlossene Kreise Tangenten, so ist ihre Summe oder Differenz konstant, jenachdem der Punkt zwischen den Berührungssehnern liegt oder nicht.*

c. *Die gemeinschaftliche Sehne zweier eingeschlossenen doppelt berührenden Kreise ist von der Berührungssehne gleich weit entfernt.*

324. Wegen der Analogie mancher Eigenschaften der



doppelt berührenden Kreise mit den Brennpunkten nennt man erstere *Brennkreise* des Kegelschnittes. Sie sollen gleichartig oder ungleichartig heißen, jenachdem die Mittelpunkte auf derselben Axe oder auf verschiedenen Axen liegen.

325. Sind  $F$  und  $F_1$  die Berührungspunkte zweier gleichartigen Brennkreise  $N$  und  $N_1$ , so ist die Tangente von  $F$  an  $N_1$  gleich derjenigen von  $F_1$  an  $N$  oder die kürzeste Sehne durch  $F$  in  $N_1$  gleich derjenigen durch  $F_1$  in  $N$ .

Folgt aus 319.

326. Sind  $FF'$  und  $F_1F'_1$  die Berührungspunkte eines Kegelschnittes mit zwei Brennkreisen  $N$  und  $N_1$ , so sollen die vier Sehnen  $FF_1$ ,  $FF'_1$ ,  $F'F_1$ ,  $F'F'_1$  nach Steiner *Wechselsehnen* heißen.

327. Jede Wechselsehne schneidet in beiden Kreisen gleiche Sehnen ab.

$FF_1$  schneide die gemeinschaftliche Sehne der Kreise in  $Q$ , diese selbst in  $S$  und  $S_1$ ; also ist  $QS \cdot QF = QS_1 \cdot QF_1$ . Da aber  $QF = QF_1$ , so ist auch  $QS = QS_1$  und daher auch

$$FS = F_1S_1.$$

328. Von den Sätzen 319, 320, 323a, b, c gilt auch die Umkehrung und läßt sich in analoger Weise darthun:

a. Der geometrische Ort eines Punktes, dessen Abstand von einer festen Geraden zu seiner Tangente oder kürzesten Sehne an einen festen Kreis in einem bestimmten Verhältnisse steht, ist ein Kegelschnitt, der den Kreis doppelt berührt.

b. Der geometrische Ort eines Punktes, für welchen die Summe (Differenz) der Tangenten oder kürzesten Sehnen an zwei Kreise konstant ist, ist ein Kegelschnitt, der beide Kreise doppelt berührt.

c. Zwei Gerade, die gleichweit von der gemeinschaftlichen Sehne zweier Kreise entfernt sind, schneiden diese in solchen Punkten, durch welche sich ein beide Kreise doppelt berührender Kegelschnitt legen läßt.

329. Werden zwei Kreise  $N$  und  $N_1$  von zwei Kegelschnitten  $K$  und  $\mathfrak{K}$  doppelt berührt, so liegen die acht Berührungspunkte auf einem dritten Kegelschnitte.

Die Berührungspunkte seien  $FF'$  und  $F_1F'_1$  auf  $K$ ,  $\mathfrak{F}\mathfrak{F}'$



und  $\mathfrak{F}_1\mathfrak{F}_1'$  auf  $\mathfrak{R}$ . In dem Sechsecke  $F\mathfrak{F}\mathfrak{F}_1F_1'F'$  seien  $G, H, J$  die Schnittpunkte der Gegenseiten, ferner  $R$  und  $R_1$  die




Fig. 120.

Schnittpunkte von  $\mathfrak{F}\mathfrak{F}_1$  mit  $FF'$  und  $F_1F_1'$ , dann folgt aus ähnlichen Dreiecken

$$RF \cdot R_1\mathfrak{F} = R\mathfrak{F} \cdot R_1G$$

$$RJ \cdot R_1\mathfrak{F}_1 = R\mathfrak{F}_1 \cdot R_1F_1$$

$$RF' \cdot R_1H = RH \cdot R_1F_1'.$$

Multipliziert man diese Gleichungen und berücksichtigt, daß  $R\mathfrak{F}_1 = R_1\mathfrak{F}$ ,  $R\mathfrak{F} = R_1\mathfrak{F}_1$ , so erhält man

$$RF \cdot RF' \cdot RJ \cdot R_1H = R_1G \cdot R_1F_1 \cdot RH \cdot R_1F_1'.$$

Nennt man die Schnittpunkte der Wechelsehne  $\mathfrak{F}\mathfrak{F}_1$  mit den Kreisen  $\mathfrak{F}^0$  und  $\mathfrak{F}_1^0$ , so ist

$$\mathfrak{F}\mathfrak{F}^0 = \mathfrak{F}_1\mathfrak{F}_1^0 \text{ und da auch } R\mathfrak{F} = R_1\mathfrak{F}_1,$$

$$\text{so ist auch } R\mathfrak{F}^0 = R_1\mathfrak{F}_1^0,$$

mithin

$$R\mathfrak{F} \cdot R\mathfrak{F}^0 = R_1\mathfrak{F}_1 \cdot R_1\mathfrak{F}_1^0 \text{ oder } RF \cdot RF' = R_1F_1 \cdot R_1F_1'$$

folglich auch

$$RJ \cdot R_1H = RH \cdot R_1G \text{ oder } RJ : RH = R_1G : R_1H$$

d. h. die Punkte  $G, H, J$  liegen in einer Geraden, also  $FF'F_1F_1'\mathfrak{F}\mathfrak{F}_1$



auf einem Kegelschnitte, der aus Symmetriegründen auch durch  $\mathfrak{F}' \mathfrak{F}_1'$  gehen muß.

*Umkehrung.* Legt man durch die Berührungspunkte zweier gleichartigen Brennkreise einen Kegelschnitt, welcher jene noch in vier Punkten schneidet, so läßt sich durch dieselben ein doppelt berührender Kegelschnitt legen.

330. Die gemeinschaftlichen Tangenten zweier Kreise bilden in einem doppelten berührenden Kegelschnitte gleiche Sehnen, welche gleich der Summe der Tangenten oder halben kürzesten Sehnen eines Kegelschnittpunktes sind.

Eine gemeinschaftliche Tangente berühre in  $UU_1$  und schneide den Kegelschnitt in  $VV_1$ , dann ist nach 323b

$$VU + VU_1 = V_1U + V_1U_1$$

oder  $2VU + UU_1 = 2V_1U_1 + UU_1$

also  $VU = V_1U_1$  und  $VU + VU_1 = VV_1$

konstant.

331. Zieht man in einem Brennkreise, dessen Mittelpunkt auf der Nebenaxe liegt, durch einen Berührungspunkt die Brennpunktssehne, so ist diese gleich der Hauptaxe.

Verlängert man (Fig. 117) die Tangente in  $F$  bis zum Durchschnitte mit der Leitlinie  $l$  in  $P$ , so ist, da

$$\sphericalangle FDP = FBP = 90^\circ,$$

$B FDP$  ein Kreisviereck, also  $\sphericalangle BDF = BPF = OFB$ , da  $\sphericalangle OFP = 90^\circ$  ist, also auch  $\sphericalangle EBA = RFS$  und aus ähnlichen Dreiecken

$$FS : FR = NE : MA.$$

Da  $FS = 2NE$ , so ist  $FR = 2MA = 2a$ .

332. Die Senkrechte vom Mittelpunkte  $M$  des Kegelschnittes auf die Normale eines Punktes  $F$  desselben schneidet auf den Brennstrahlen des letzteren Strecken ab, welche gleich der halben Hauptaxe sind.

Die Senkrechte  $MC$  treffe die Brennstrahlen in  $D$  und  $D_1$ ; zieht man  $B_1E \parallel DD_1$ , so ist

$$FD = FD_1, DE = D_1B_1 \text{ und auch } DE = DB,$$

also  $FD + FD_1 = FB + FB_1 = 2a$

und  $FD = a.$










Fig. 122.

Setzt man  $AB = \frac{1}{2}p$ , so ist  $F_1 L_1^2 = 2p \cdot AL_1$ ,  $FL^2 = 2p \cdot AL$  (286) also

$$\begin{aligned} F_1 T^2 &= 2p \cdot LL_1 - LL_1 (OL + OL_1) \\ &= LL_1 (2p - OL - OL_1) \end{aligned}$$

Aber  $\frac{1}{2}p - LO = AO - BO - LO = AL - BO$   
 $= AL - BG$

$$\frac{1}{2}p - L_1O = AL_1 - BO = AL_1 - BG$$

$$\begin{aligned} p - LO - L_1O &= AL + AL_1 - 2BG \\ &= AL + AL_1 - 2GL - 2BL \\ &= AL + AL_1 - 4AL - 2BL \\ &= AL_1 - AL - 2(AL + BL) \\ &= LL_1 - p, \end{aligned}$$

also  $F_1 T = LL_1$ , d. h.

b. Die Tangente von einem Parabelpunkte an einen doppelt berührenden Kreis ist gleich der Senkrechten auf die Berührungssehne.

335. Zieht man (Fig. 122)  $F_1K \perp FG$ ,  $F_1F$ , welche den Kreis in  $H$  schneidet,  $FO$  bis  $J$  und  $JH$ , so ist

$$F_1K: FH = F_1F: 2r \text{ oder } F_1F \cdot FH = 2r \cdot F_1K.$$

Wegen des vorigen Satzes



$$FE^2 = LL_1^2 = F_1T^2 = F_1F \cdot F_1H;$$

ferner  $FE^2 + F_1E^2 = F_1F^2,$

also  $F_1E^2 = F_1F^2 - F_1F \cdot F_1H = F_1F \cdot FH$   
 $= 2r \cdot E_1K, \text{ d. h.}$

*Legt man durch einen Parabelpunkt eine Tangente und eine Parallele zur Hauptaxe, so ist das Verhältniß des Abstandsquadrates eines Parabelpunktes von der Parallelen zu seiner Entfernung von der Tangente konstant. \*)*

$$336. FE^2 = F_1T^2 = F_1D \cdot F_1D_1 = F_1L_1^2 - DL_1^2.$$

Ferner  $F_1N \cdot F_1N_1 = NL_1^2 - F_1L_1^2 = NF_1 \cdot NF_2,$

daher  $FE^2 = NL_1^2 - DL_1^2 - NF_1 \cdot NF_2$   
 $= ND \cdot ND_1 - NF_1 \cdot NF_2$   
 $= NF^2 - NF_1 \cdot NF_2$

oder  $NF_1 \cdot NF_2 = NE^2.$

*Zieht man durch einen Parabelpunkt eine Tangente und eine Parallele zur Hauptaxe, so ist die Entfernung eines Punktes der Tangente von der Parallelen die mittlere Proportionale zwischen den Abständen dieses Punktes von den Schnittpunkten der durch ihn zur Hauptaxe senkrecht gezogenen Geraden mit der Parabel.*

337. In zwei Punkten  $F$  und  $F_1$  der Parabel konstruiere man die in ihnen und den bezüglich der Hauptaxe symmetrisch liegenden Punkten doppelt berührenden Kreise, wähle auf der Parabel einen Punkt  $P$ , konstruiere von ihm die Tangenten  $tt_1$  an die doppelt berührenden Kreise und die Senkrechten  $ss_1$  auf die Berührungssehnens, so ist  $t = s$  und  $t_1 = s_1$ , also

$$t \pm t_1 = s \pm s_1$$

jenachdem  $P$  zwischen den Berührungssehnens liegt oder nicht:

*Zieht man durch einen Parabelpunkt an zwei doppelt berührende Kreise zwei Tangenten, so ist ihre Summe oder Differenz konstant gleich der Entfernung der Berührungssehnens.*

338. Die in 328 gegebene Erzeugung des Kegelschnittes läßt sich verallgemeinern. \*\*)

\*) Cf. Weinmeister. Programm der Realschule zu Leipzig. 1880 und 1881.

\*\*) Diese Darstellung ist im Wesentlichen der citierten Programmabhandlung entnommen.



Sind  $g_1 g_2$  irgend zwei parallele Gerade, ist  $M$  der Mittelpunkt eines Kreises mit dem Radius  $r$ , so läßt sich nach dem




Fig. 123.

Orte eines Punktes  $P$  fragen, für welchen das Verhältniß der Potenz des Kreises in ihm zum Produkte seiner Entfernungen von den Geraden  $g_1 g_2$  konstant gleich  $\lambda^2$  ist.

Die Entfernungen des Punktes  $P$  von  $g_1$  und  $g_2$  seien  $PA_1$  und  $PA_2$ , dann soll

$$\lambda^2 \cdot PA_1 \cdot PA_2 = PM^2 - r^2 \text{ sein.}$$

Ist  $PA$  die Entfernung von  $P$  und der Mittellinie zwischen  $g_1$  und  $g_2$ , also  $PA_1 = AA_1 - PA$ ,  $PA_2 = PA + AA_1$ , so ist

$$PA_1 \cdot PA_2 = AA_1^2 - PA^2,$$

also 
$$\lambda^2 \cdot PA^2 = (r^2 + \lambda^2 \cdot AA_1^2) - PM^2.$$

Setzt man  $r^2 + \lambda^2 \cdot AA_1^2 = \varrho^2$  und beschreibt mit  $\varrho$  um  $M$  einen Kreis, so ist  $(\varrho^2 - PM^2)$  die Potenz desselben in  $\varrho$ ; folglich ist der Ort von  $P$  nach 328a. ein Kegelschnitt, für welchen  $\lambda = \frac{e}{b}$  oder  $\frac{e}{a}$  ist, jenachdem der Mittelpunkt des Kreises auf der Nebenaxe oder Hauptaxe liegt.

Für einen beliebigen Punkt einer der beiden Geraden  $g_1$  und  $g_2$  wird das Verhältniß zwischen dem Produkte seiner Abstände von  $g_1 g_2$  und der Potenz des Kreises in ihm  $o$ , nur für die Schnittpunkte der Geraden mit dem Kreise nimmt dieses Verhältniß die Form  $\frac{o}{o}$  an und wird gleich  $\lambda^2$ , da diese die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte werden müssen. Es folgt:

*Der Ort eines Punktes, für welchen das Verhältniß des Produktes seiner Abstände von zwei festen Parallelen zur Potenz eines festen Kreises in ihm konstant ist, ist ein Kegelschnitt, welcher durch die Schnittpunkte jener Geraden mit dem Kreise geht.*

339. Die beiden Parallelen  $g_1$  und  $g_2$  mögen den Kreis



in vier reellen Punkten treffen;  $l_1$  und  $l_2$  seien zwei gegen  $g_1$  und  $g_2$  gleich geneigte Verbindungslinien der Schnittpunkte, der von ihnen gebildete Winkel sei  $2\alpha$ . Welches ist der Ort des Punktes, für welchen das Produkt seiner Abstände von  $l_1$  und  $l_2$  zur Potenz des Kreises in ihm in einem konstanten Verhältnisse steht?

Durch  $P$  ziehe man die Parallele zu  $g_1$ , welche den Kreis in  $C$  und  $D$ , die Geraden  $l_1$  und  $l_2$  in  $B_1$  und  $B_2$  schneidet. Dann ist

$$K_p = PC \cdot PD = PE^2 - EC^2$$

$$PB_1 \cdot PB_2 = PE^2 - EB_1^2,$$

also

$$K_p = PB_1 \cdot PB_2 - (EC^2 - EB_1^2)$$

$$= PB_1 \cdot PB_2 - CB_1 \cdot DB_1$$

$$= PB_1 \cdot PB_2 - JB_1 \cdot HB_1.$$

Von  $P$  fälle man auf  $g_1 g_2 l_1 l_2$  die Perpendikel, deren Länge auch mit  $g_1 g_2 l_1 l_2$  bezeichnet werde, so ist

$$K_p = \frac{l_1 \cdot l_2 - g_1 \cdot g_2}{\cos^2 \alpha}.$$

Durch die Punkte  $FGHJ$  giebt es unendlich viele Kegelschnitte, welche sämtlich die Halbierungslinie des Winkels ( $l_1 l_2$ ) zu einer Axe haben. Liegt  $P$  auf diesem Kegelschnitte, so ist

$$K_p = g_1 \cdot g_2 \cdot \mu^2.$$

Setzt man hieraus den Wert von  $g_1 \cdot g_2$  in die letzte Gleichung, so erhält man

$$K_p = l_1 \cdot l_2 \cdot \frac{\mu^2}{\mu^2 \cos^2 \alpha + 1} = l_1 \cdot l_2 \cdot \lambda^2, \text{ d. h.}$$

*Wenn ein Kreis auf zwei Geraden gleiche Sehnen abschneidet, so ist der Ort eines Punktes, für welchen das Produkt seiner Abstände von den Geraden zur Potenz des Kreises in ihm in einem konstanten Verhältnisse steht, ein Kegelschnitt.*

340. Die Gerade  $l_1$  werde um die Strecke  $s$  parallel mit sich selbst verschoben und heiße in der neuen Lage  $l_3$ ; das Perpendikel von  $P$  auf  $l_3$  sei  $l_3$ , so daß also  $l_3 = l_1 + s$  ist. Durch  $F$  und  $G$  denke man sich einen Kreis mit dem Mittelpunkt  $M'$  gelegt, dann ist

$$K'_p - K_p = 2MM' \cdot l_2,$$



also

$$\begin{aligned} K_p' &= l_1 \cdot l_2 \cdot \lambda^2 + 2MM' \cdot l_2 \\ &= l_2 (l_3 \lambda^2 - s \cdot \lambda^2 + 2MM'). \end{aligned}$$

Setzt man  $s \cdot \lambda^2 = 2MM'$ , wodurch der Kreis  $M'$  bestimmt ist, so hat man

$$K_p' = l_2 \cdot l_3 \cdot \lambda^2.$$

Der Ort des Punktes  $P$ , welcher der letzten Gleichung genügt, ist also ein Kegelschnitt, welcher durch die Schnittpunkte der Geraden  $l_2$  und  $l_3$  mit dem Kreise  $M'$  geht und zwar derjenige Kegelschnitt, welcher mit dem durch die Gleichung  $K_p = l_1 \cdot l_2 \cdot \lambda^2$  bestimmten identisch ist.

341. Wenn die Gerade  $l_3$  den Kegelschnitt schneidet, so schneidet ihn auch der Kreis  $M'$  in denselben Punkten; es ist also  $l_3$  eine gemeinschaftliche Sehne des Kreises und Kegelschnittes. — Alle durch  $F$  und  $G$  gelegten Kreise haben mit dem Kegelschnitte solche reellen oder ideellen gemeinschaftlichen Sekanten, welche zu  $l_1$  parallel sind. Daher ist die Gerade  $l_3$ , falls sie den Kegelschnitt nicht schneidet, eine ideelle Sekante des Kreises  $M'$  und des Kegelschnittes. Verschiebt man auch noch  $l_2$  sich selbst parallel in die Lage  $l_4$ , so kann  $l_4$  auch den Kreis schneiden oder nicht. Daraus folgt:

*Sind zwei Gerade gegen eine Axe eines Kegelschnittes entgegengesetzt gleich geneigt, so giebt es stets einen Kreis von der Lage, daß seine Potenz in einem Kegelschnittpunkte zum Produkte der Abstände des letzteren von den beiden Geraden in einem konstanten Verhältnisse steht. Die Geraden sind reelle oder ideelle gemeinschaftliche Sekanten des Kreises und des Kegelschnittes.*

Hieraus folgt für jeden Kegelschnitt (cf. 288)

*Die Halbierungslinien der Winkel gemeinschaftlicher Sehnen eines Kreises und eines Kegelschnittes sind den Axen des letzteren parallel.*

342. *Der Krümmungskreis.*

Wenn ein Kreis mit einem Kegelschnitte drei zusammenfallende Punkte gemein hat, so heißt er (312) ein Krümmungskreis des Kegelschnittes.

Sind  $C$  und  $D$  zwei unendlich benachbarte Punkte eines Centralkegelschnittes, so schneiden sich ihre Normalen im Mittelpunkt  $K$  des Krümmungskreises.






Fig. 124.

Die Verbindungslinie  $CD$  ist eine Tangente  $TT_1$  des Kegelschnittes. — Verbindet man  $C$  und  $D$  mit den Brennpunkten  $B$  und  $B_1$  und beschreibt um letztere mit  $BC$  und  $B_1D$  Kreise, welche bezüglich  $BD$  in  $C_1$  und  $B_1C$  in  $D_1$  treffen, so sind die Dreiecke  $CC_1D$  und  $DD_1C$

bei  $C_1$  und  $D_1$  rechtwinklig. — Da

$$BC \pm B_1C = BD \pm B_1D = 2a, \text{ so folgt}$$

$$BD - BC = \pm (B_1C - B_1D) \text{ oder } C_1D = CD_1,$$

$$\text{also } \triangle CDC_1 \cong CDD_1 \text{ und } \sphericalangle DCC_1 = CDD_1$$

oder

$$\sphericalangle BCT = B_1DT_1$$

d. h. für den Fall des Zusammenfallens von  $C$  und  $D$ :

*Die Tangente bildet mit den Brennstrahlen des Berührungspunktes gleiche Winkel.* (Cf. 232 a, 252, 313.)

343. Die Normalen in den Punkten  $C$  und  $D$  sind die Halbierungslinien der Winkel  $BCB_1$  und  $BDB_1$ . Ist  $E$  der Schnittpunkt von  $BD$  und  $CK$ , so ist, wenn man  $\sphericalangle BCK = \omega$ ,  $\sphericalangle B_1DK = \omega_1$  setzt

$$\sphericalangle B = CED - \omega = K + \omega_1 - \omega.$$

Ebenso findet man

$$\sphericalangle B_1 = K + \omega - \omega_1,$$

also

$$B + B_1 = 2K.$$

Ein Kreisbogen ist seinem Centriwinkel und dem Radius proportional, also wird der Centriwinkel gemessen durch den Quotienten aus dem Bogen und dem Radius, folglich ist

$$\frac{CC_1}{BC} + \frac{DD_1}{B_1D} = \frac{2CD}{KC}.$$

Aber  $CC_1 = DD_1 = CD \cdot \cos \omega$  für den Fall, dass  $C$  und  $D$  zusammenfallen, wo  $\omega = \sphericalangle C_1CD$ ; setzt man noch

$$BC = \varrho, B_1C = \varrho_1, KC = r,$$



so wird 
$$\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{\varrho_1} = \frac{2}{r \cos \omega}$$

die Gleichung zur Bestimmung des Krümmungsradius  $r$ .

Fällt man von  $B$  und  $B_1$  die Perpendikel  $p$  und  $p_1$  auf die Tangente in  $C$ , so ist

$$p = \varrho \cdot \cos \omega, \quad p_1 = \varrho_1 \cdot \cos \omega, \quad p \cdot p_1 = \varrho \cdot \varrho_1 \cdot \cos^2 \omega = b^2.$$

In Fig. 125. ist  $q = a_1 \cdot \sin \varphi$ , also  $q \cdot b_1 = a_1 \cdot b_1 \sin \varphi = a \cdot b$  (280a) und  $q = \frac{a \cdot b}{b_1}$ ; ferner  $q = \frac{1}{2} (p + p_1) = \frac{1}{2} (\varrho + \varrho_1) \cdot \cos \omega = a \cdot \cos \omega$ , daher:

$$\cos \omega = \frac{b}{b_1}, \quad \varrho \cdot \varrho_1 = \frac{b^2}{\cos^2 \omega} = b_1^2, \quad \text{mithin da } \varrho + \varrho_1 = 2a$$

$$\frac{\varrho + \varrho_1}{\varrho \cdot \varrho_1} = \frac{2b_1}{r \cdot b} = \frac{2a}{b_1^2}$$

und

$$r = \frac{b_1^3}{a \cdot b}.$$

Bezeichnet man die Strecke  $CO$  der Normale mit  $n$ , ist also  $n = \frac{b \cdot b_1}{a}$  (289a und d.), so wird

$$r = \frac{b \cdot b_1}{a} \cdot \frac{b_1^2}{b^2} = \frac{n}{\cos^2 \omega}.$$

Aus dieser Formel folgt die Newton'sche Konstruktion des Krümmungsradius. Man errichtet in  $O$  auf  $CO$  die Senkrechte  $OE$  und in  $E$  auf  $CE$  die Senkrechte  $EK$ .

344. Eine andere Konstruktion ergibt sich aus dem Satze 288 oder 341. Schneidet der Krümmungskreis außer in  $C$  den Kegelschnitt noch in  $C_1$ , so sind die Tangente in  $C$




Fig. 125.



und die Sehne  $CC_1$  die gemeinschaftlichen Sehnen des Krümmungskreises und des Kegelschnittes und bilden also mit den Axen gleiche Winkel. Zieht man daher durch  $C$  eine Parallele zu einer Axe, so findet man  $CC_1$  leicht, da diese Parallele den Winkel zwischen  $CC_1$  und der Tangente in  $C$  halbiert; der Kreis durch  $C_1$ , welcher diese Tangente in  $C$  berührt, ist der Krümmungskreis.

345. Eine dritte Konstruktion des Krümmungsradius findet man bei Salmon: Analytische Geometrie der Kegelschnitte übersetzt von Fiedler. IV. Auflage. S. 320. Hier werde noch eine von Steiner herrührende Konstruktion desselben mitgeteilt. Cf. Steiner-Schröter, Theorie der Kegelschnitte. II. Auflage. S. 208.

Die Normalen  $n$  und  $n'$  in den Punkten  $C$  und  $C'$  und die beiden Axen bestimmen als Tangenten eine Parabel; wenn  $n$  und  $n'$  die Axen in  $ON$  und  $O'N'$  schneiden (Fig. 125), so ist

$$CO : CN = C'O' : C'N' = b^2 : a^2$$

also teilen die beiden Axen und die Gerade  $CC'$  die beiden Parabeltangenten  $n$  und  $n'$  nach gleichen Verhältnissen und daher ist auch  $CC'$  eine Tangente dieser Parabel. 287.

Wenn  $C$  und  $C'$  einander unendlich nahe rücken, so wird ihr Schnittpunkt  $K$  der Krümmungsmittelpunkt. Die Parabel berührt in diesem Falle Normale und Tangente des Punktes  $C$  und die beiden Axen, hat also in den Punkten  $C$  und  $M$  rechtwinklige Tangenten. Daher liegen diese Punkte auf der Leitlinie der Parabel. In dem von den vier Tangenten gebildeten Vierseite ist der Schnittpunkt zweier Diagonalen der Pol der dritten, also ist die Leitlinie als eine Diagonale die Polare des Schnittpunktes  $\mathfrak{B}$  der anderen Diagonalen  $ON_1$  und  $O_1N$ , folglich ist  $\mathfrak{B}$  der Brennpunkt der Parabel. Der Schnittpunkt  $K$  der beiden unendlich nahen Tangenten  $n$  und  $n'$  ist der Berührungspunkt der Parabel mit  $n$ . Man findet ihn nach einer bekannten Konstruktion, indem man  $C$  mit  $\mathfrak{B}$  verbindet und  $\mathfrak{B}K \perp \mathfrak{B}C$  errichtet.

346. Aus dieser Konstruktion ergibt sich auch der vorher gefundene Wert für den Krümmungsradius. Im Dreiecke  $NN_1O_1$  ist  $O$  der Höhenpunkt, also ist



$$\sphericalangle \mathfrak{B}CN = MCN, \sphericalangle C\mathfrak{B}O = OO_1C = CNM,$$

daher sind die Dreiecke  $\mathfrak{B}CO$  und  $CMN$  ähnlich. Daraus folgt

$$CO : C\mathfrak{B} = CM : CN \text{ oder } CO \cdot CN = C\mathfrak{B} \cdot CM.$$

Den Halbmesser  $CM$  bezeichne man mit  $a_1$  und den zu ihm konjugierten, der Tangente parallelen mit  $b_1$ , dann ist

$$CO \cdot CN = b_1^2$$

also

$$C\mathfrak{B} = \frac{b_1^2}{a_1}.$$

Da  $\sphericalangle \mathfrak{B}CK = MCK$ , so muß auch  $\sphericalangle CK\mathfrak{B} = MCN_1 = \varphi$  sein, wenn man den Winkel zwischen den beiden konjugierten Halbmessern  $\varphi$  nennt, daher

$$C\mathfrak{B} = r \cdot \sin \varphi = \frac{b_1^2}{a_1}.$$

Nach 280a. ist aber  $a_1 \cdot b_1 \cdot \sin \varphi = a \cdot b$ , also wird

$$r = \frac{b_1^3}{a \cdot b}.$$

Übereinstimmend mit 317. folgen hieraus für die Krümmungshalbmesser in den Scheiteln der Haupt- und Nebenaxe die Werte  $\frac{b^2}{a}$  und  $\frac{a^2}{b}$ .

347. Eine weitere Eigenschaft des Krümmungsradius hat Steiner aus der anderen Beziehung konjugierter Durchmesser




Fig. 126.



abgeleitet, daß nämlich  $a_1^2 + b_1^2 = a^2 + b^2$  ist. \*) Setzt man hierin den vorher für  $b_1^2$  erhaltenen Wert, so wird

$$a_1^2 + a_1 \cdot r \cdot \sin \varphi = a^2 + b^2 = a_1^2 - 2a_1 \cdot \frac{r}{2} \cdot \cos (90^\circ + \varphi).$$

Macht man also  $CD = \frac{r}{2}$ , so wird

$$a^2 + b^2 + \frac{r^2}{4} = a_1^2 + \frac{r^2}{4} - 2a_1 \cdot \frac{r}{2} \cdot \cos (90^\circ + \varphi) = MD^2.$$

Beschreibt man um  $M$  den Kreis  $\mathfrak{R}$ , dessen Radius  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ist, also den Ortskreis der Scheitel der um die Ellipse beschriebenen rechten Winkel und schneidet dieser  $MD$  in  $E$ , so ist

$$\frac{r^2}{4} = MD^2 - ME^2 = DT^2$$

wenn  $DT$  die von  $D$  an diesen Ortskreis gezogene Tangente ist. Der um  $D$  mit  $\frac{r}{2}$  beschriebene Kreis geht also durch  $T$

und berührt die Ellipse in  $C$ . Man findet also  $D$ , indem man einen Kreis beschreibt, der die Gerade  $O_1 N_1$ , d. i. die Tangente in  $C$  berührt und den Ortskreis rechtwinklig schneidet. Da aber der Durchmesser  $CC'$  durch den Ortskreis  $\mathfrak{R}$  harmonisch geteilt wird (27c.), so kann man  $C'$  finden und hat  $r = CC'$ .

Man hat daher folgende Konstruktion des Krümmungskreises in einem Punkte  $C$ :

*Man schneide die Normale in  $C$  mit dem Ortskreise  $\mathfrak{R}$  in  $F$  und  $F'$ , mache  $FF'CC'$  harmonisch, schneide auf der Normale  $CK = CC'$  ab und beschreibe mit  $KC$  um  $K$  den Krümmungskreis.*

Für den Fall der Parabel geht der Ortskreis  $\mathfrak{R}$  in die Leitlinie über; deshalb ergibt sich folgende Konstruktion für den Krümmungsmittelpunkt:

*Man schneide die Normalen eines Punktes  $C$  mit der Leitlinie in  $F$ , schneide auf  $n$  die Strecke  $CK = 2CF$  ab, so daß  $K$  und  $F$  auf verschiedenen Seiten von  $C$  liegen, so ist  $K$  der Krümmungsmittelpunkt.*

---

\*) Steiner-Schroeter II. T. II. Aufl. S. 211. — Steiner: „Über eine Eigenschaft der Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte“, Crelles Journal. Bd. XXX. S. 271.



348. Da die Konstruktion des Krümmungskreises bei Ellipse und Hyperbel auf der Eigenschaft der Normale beruht, daß das Verhältnis ihrer Abschnitte durch die Axen konstant bleibt, diese Eigenschaft aber bei der Parabel fortfällt, so wird eine andere Begründung jener Konstruktion für die Parabel notwendig. Diese fließt unmittelbar aus der Erzeugung der Parabel.

$B$  und  $l$  seien Brennpunkt und Leitlinie einer Parabel,  $A$  sei ihr Scheitel,  $D$  und  $D_1$  seien zwei beliebige Punkte




Fig. 127.

$DE$  und  $D_1E_1$  senkrecht zur Axe,  $DG$  und  $D_1G_1$  die Normalen in  $D$  und  $D_1$ ;  $J$  sei der Schnittpunkt von  $DD_1$  mit der Axe.

Unmittelbar aus der Parabelerzeugung folgt, daß die Normalen  $DG$  und  $D_1G_1$  den Geraden  $BL$  und  $BL_1$  parallel sind: also ist

$$BG = DL, BG_1 = D_1L_1, GG_1 = EE_1.$$

Ferner  $DL = CE = BG$ ,

also auch  $CB = EG = E_1G_1$ , d. h.

*Die Normale eines Parabelpunktes und die von ihm auf die*







mit  $DG$  zum Durchschnitte bringt. Demnach gestaltet sich die Konstruktion des Krümmungskreises in einem Punkte  $D$  einer Parabel auf folgende Art, da  $DJ$  in Fig. 127 in diesem Falle Tangente und  $BJ = BG$  wird:

*Man ziehe die Normale  $DG$ , errichte in  $G$  auf derselben die Senkrechte und bringe sie in  $F$  mit  $DB$  zum Durchschnitte, verlängere  $FG$  über  $G$  hinaus um sich selbst bis  $P$ , fälle vom Endpunkte  $P$  der Verlängerung die Senkrechte auf die Axe und bringe sie in  $K$  zum Durchschnitte mit  $DG$ , so ist  $K$  der Krümmungsmittelpunkt.*

351. Da hier  $BD = BF$  ist, so liegt  $P$  auf der Parallelen durch  $D$  zur Axe, also ist  $PK \perp PD$ ; da ferner  $PK = FK$  und  $PD = FD$ , so ist  $\triangle DPK \cong DFK$  und  $\sphericalangle DFK = DPK = 90^\circ$ . Man findet daher den Krümmungsmittelpunkt auch durch folgende Konstruktion:

*Man verlängere  $BD$  um sich selbst bis  $F$ , errichte in  $F$  auf  $DF$  die Senkrechte und schneide mit ihr die Normale des Punktes  $D$  im Krümmungsmittelpunkte  $K$ .*

351a. Schneidet man die Leitlinie mit der Normale in  $Q$  und zieht  $BR \parallel FK$ , so ist  $DR = KR$ , ferner  $DB = DL$ .  $\sphericalangle \alpha = \beta = \gamma$ , also  $\triangle DBR \cong DLQ$  und

$$DQ = DR = RK, \text{ d. h.}$$

*Das Stück in der Normale zwischen einem Parabelpunkte und der Leitlinie ist halb so groß wie der Krümmungsradius dieses Punktes.*

Dies ist der Satz 347. in anderer Fassung.

352. Der Satz von Townsend.\*)

*Die Brennpunktsschne des Krümmungskreises in einem beliebigen Punkte eines Kegelschnittes ist derjenigen Brennpunktsschne des Kegelschnittes gleich, welche der Tangente in jenem Punkte parallel ist.*

Es seien  $CDE$  drei Schnittpunkte eines Kreises mit einem Kegelschnitte;  $HJ \parallel DE$ , dann ist (290, 304, 284)

$$CK.GK : DK.EK = CB.BG : HB.BJ.$$

---

\*) Analytische Geometrie der Kegelschnitte von Salmon-Fiedler. IV. Auflage. S. 319.



Aber:

$$DK \cdot EK = CK \cdot FK, \quad CB \cdot BG = p \cdot CG, \quad HB \cdot BJ = p \cdot HJ \quad (172)$$

also

$$GK : FK = CG : HJ.$$




Fig. 129.

Nimmt man die drei Punkte  $CDE$  unendlich benachbart, so fällt auch  $K$  mit  $C$  zusammen, der Kreis geht in den Krümmungskreis über und die letzte Proportion heißt dann

$$GC : FC = GC : HJ,$$

woraus folgt

$$FC = HJ.$$

### 353. Ausdrücke für den Krümmungsradius.

Die Brennpunktsehne des Krümmungskreises (Fig. 125) sei  $CF$ , der Durchmesser desselben  $CG$ . Verlängert man  $MD$  bis zum Durchschnitte mit  $CF$  und  $CG$  in  $F_1$  und  $G_1$ , so ist

$$CF : CG = CG_1 : CF_1.$$

Setzt man  $CF$  gleich der zur Tangente in  $C$  parallelen Brennpunktsehne  $s$ , so ist (352. 332.)

$$CG = \frac{s \cdot CF_1}{CG_1} = \frac{s \cdot a}{CG_1}.$$

Man erhält hieraus bekannte Ausdrücke für den Krümmungsdurchmesser, wenn man für  $s$  andere Werte sucht.

Die Sehne  $s$  schneide den Kegelschnitt in  $S$  und  $S_1$ , dann ist

$$BS \cdot BS_1 = \frac{1}{2} p \cdot s \quad (172)$$

$$BS \cdot BS_1 : p^2 = MD^2 : b^2 = MD^2 : p \cdot a$$

also

$$\text{I. } s = \frac{2 MD^2}{a} = \frac{2 b_1^2}{a}.$$

Aus  $CO \cdot CN = MD^2$  und  $CO : CN = b^2 : a^2$  folgt  $CO = \frac{a}{b} \cdot MD$  und  $CO = n$  gesetzt,

$$\text{II. } s = \frac{2 CO^2}{p} = \frac{2 n^2}{p}.$$

I. In einem Centralkegelschnitte ist das Produkt der halben Hauptaxe und einer Brennpunktsehne gleich dem doppelten Quadrate des parallelen Halbmessers.



II. *In einem Centralkegelschnitte ist das doppelte Quadrat der Strecke einer Normale zwischen dem Kegelschnitte und der Hauptaxe gleich dem Produkte aus der zur Normale senkrechten Brennpunktssehne und dem Parameter.*

Wenn der Kegelschnitt eine Parabel ist, so fälle man  $ST$  und  $S_1T_1$  senkrecht auf die Leitlinie, errichte im Brennpunkte  $B$  die Senkrechte auf  $SS_1$ , welche die Leitlinie in  $U$  schneidet, so ist  $TU = T_1U$  (Cf. Fig. 76), ziehe durch  $U$  die Parallele zu  $ST$ , welche  $SS_1$  in  $U_1$  schneidet, so ist

$$UU_1 = \frac{1}{2} (ST + S_1T_1) = \frac{1}{2} (BS + B_1S_1) = \frac{1}{2} SS_1.$$

Die Gerade  $UU_1$  trifft die Parabel im Punkte  $C$ , in welchem sie von der zu  $SS_1$  parallelen Tangente berührt wird und daher ist  $CU = CB = CU_1$  da  $\sphericalangle UBU_1 = 90^\circ$  ist,

und  $BC = CU = CU_1 = \frac{1}{2} UU_1 = \frac{1}{4} SS_1$

und daher

$$\text{III. } SS_1 = s = 4 BC.$$

III. *In einer Parabel ist die vierfache Brennpunktsentfernung eines Parabelpunktes gleich derjenigen Brennpunktssehne, welche der Tangente jenes Punktes parallel ist.*

Bezeichnet man die Strecke  $CG_1$  der Normale oder, was Fig. 125. dasselbe ist, das vom Mittelpunkte  $M$  auf die Tangente gefällte Lot mit  $q$ , und den Krümmungsdurchmesser  $CG$  mit  $2r$  und  $MD$  mit  $b_1$ , so ist

$$\text{IV. } r = \frac{1}{2} \cdot \frac{s \cdot a}{q}.$$

oder

$$\text{V. } r = \frac{b_1^2}{q}.$$

Setzt man hierin  $q = a_1 \cdot \sin \varphi$  und  $a_1 \cdot b_1 \cdot \sin \varphi = a \cdot b$ ,

so ist 
$$\text{VI. } r = \frac{b_1^3}{a \cdot b}.$$

Wenn man den Wert von  $s$  aus der Gleichung II. benutzt, so wird

$$\text{VII. } r = \frac{n^2 \cdot a}{p \cdot q}.$$

Aus den Gleichungen I. und II. folgt  $b_1 = n \cdot \sqrt{\frac{a}{p}}$ . Setzt man diesen Wert in die Gleichung VI, so erhält man mit Berücksichtigung, daß  $a \cdot p = b^2$  ist,



$$\text{VIII. } r = \frac{n^3}{p^2}.$$

Um den Krümmungsradius bei der Parabel zu erhalten, fälle man vom Brennpunkte  $B$  die Senkrechte  $\varrho$  auf die Tangente, dann ist (Fig. 125)

$$CG : CF = CB : \varrho,$$

also 
$$CG = 2r = s \cdot \frac{CB}{\varrho},$$

daher mit Hilfe von III.

$$\text{IX. } r = \frac{2 BC^2}{\varrho}.$$

## § 21.

### Konstruktion von Kegelschnitten.

354. *Konstruktion von Kegelschnitten, wenn unter den gegebenen Stücken Hauptelemente, d. i. Brennpunkte, Leitlinien, Mittelpunkt, Axen vorkommen.*

I. *Von einem Kegelschnitte kennt man eine Axe der Lage nach und drei Punkte  $PQR$ .*

Man schneide die Axe mit  $PQ$  in  $D$  und mit  $PR$  in  $E$  mache  $PQDD_1$  und  $PREE_1$  harmonisch, so daß  $DD_1$  und  $EE_1$  zugeordnet sind, fälle  $D_1F$  und  $E_1G$  senkrecht auf die Axe, so sind die Punkte  $AA_1$ , welche  $DF$  und  $EG$  harmonisch teilen, die Endpunkte der Axe.

II. *Von einem Kegelschnitte kennt man die beiden Leitlinien  $l$  und  $l_1$ , einen Punkt  $P$  und die Hauptaxe der Lage nach.*

Man fälle  $PD$  und  $PD_1$  senkrecht auf die Leitlinien, konstruiere denjenigen Punkt  $P_1$ , welcher in Bezug auf  $P$  symmetrisch zu den Leitlinien liegt, theile  $PP_1$  durch  $DE$  harmonisch, so liegt auf dem Halbkreise über  $DE$  der Brennpunkt  $B$  von  $l$ .

Denn die Gerade, welche auf  $DB$  in  $B$  senkrecht steht, theilt die Sehne  $PP_1$  harmonisch.

III. *Von einem Kegelschnitte kennt man den Scheitellkreis und zwei Gerade durch die Brennpunkte.*

Man lege durch den Mittelpunkt  $M$  des Scheitellkreises



eine solche Strecke zwischen die gegebenen Geraden, daß sie in  $M$  halbiert wird; ihre Endpunkte sind die Brennpunkte.

IV. *Von einem Kegelschnitte kennt man den Scheitellkreis und zwei Punkte der Leitlinien.*

Da die Brennpunkte die Pole der Leitlinien in Bezug auf den Scheitellkreis sind, so konstruiere man die Polaren der gegebenen Punkte bezüglich des Scheitellkreises und lege zwischen sie eine solche Strecke, daß der Mittelpunkt  $M$  des Kreises ihr Halbierungspunkt wird, so sind die Endpunkte derselben die Brennpunkte.

V. *Von einem Kegelschnitte kennt man den Scheitellkreis und zwei Punkte.*

Die gegebenen Punkte seien  $P$  und  $Q$ ; man schneide mit  $PQ$  den Scheitellkreis in  $P_1Q_1$ , so ist jeder der beiden Punkte  $R$  und  $S$ , welche die Strecken  $PQ$  und  $P_1Q_1$  harmonisch teilen, ein Punkt der Hauptaxe des Kegelschnittes. Es giebt also zwei Kegelschnitte, welche der Aufgabe genügen; ihre Hauptaxen sind, wenn man mit  $M$  den Mittelpunkt des Scheitellkreises bezeichnet,  $RM$  und  $SM$ .

VI. *Von einem Kegelschnitte kennt man die Lage einer Axe, den Mittelpunkt und zwei Punkte.*

Es sei  $M$  der Mittelpunkt;  $P$  und  $Q$  seien die gegebenen Punkte. Man schneide die Axe mit  $PQ$  in  $D$ , mache  $PQDE$  harmonisch, so daß  $D$  und  $E$  zugeordnet sind, fälle  $EF$  senkrecht auf die Axe und konstruiere die Länge der halben Axe aus der Gleichung  $x^2 = MD \cdot MF$ .

VII. *In einem durch den Mittelpunkt  $M$  und drei Punkte  $PQR$  gegebenen Kegelschnitte den zu  $PM$  konjugierten Durchmesser zu ziehen.*

Man schneide  $PM$  mit  $QR$  in  $D$ , mache  $QRDE$  harmonisch, schneide auf  $MP$  die Strecke  $MP_1 = MP$  ab, mache  $PP_1DF$  harmonisch, ziehe  $EF$  und durch  $M$  eine Parallele zu  $EF$ , so ist sie der zu  $MP$  konjugierte Durchmesser.

VIII. *Gegeben sind die Axen; man soll auf einer durch den Mittelpunkt  $M$  gelegten Geraden  $g$  die Schnittpunkte konstruieren.*

In dem Endpunkte  $A$  der einen Axe ziehe man die Tangente, welche  $g$  in  $D$  schneiden mag, fälle von  $D$  auf



die andere Axe die senkrechte Sehne  $EF$ , mache  $EFDG$  harmonisch, so daß  $DG$  zugeordnet sind, schneide  $g$  mit  $AG$  in  $H$ , so ist die Länge des Halbmessers auf  $g$  gegeben durch die Gleichung  $x^2 = MD \cdot MH$ .

IX. *Die Schnittpunkte einer Geraden  $g$  mit einem durch die Axen bestimmten Kegelschnitte zu konstruieren.*

Die Endpunkte der einen Axe seien  $A$  und  $A_1$ ; in ihnen errichte man die Senkrechten und schneide mit denselben  $g$  in  $D$  und  $D_1$ . Von  $D$  und  $D_1$  fälle man auf die andere Axe die senkrechten Sehnen  $EF$  und  $E_1F_1$ , mache  $EFDG$  und  $E_1F_1D_1G_1$ , so daß  $DG$  und  $D_1G_1$  harmonisch sind, schneide  $g$  mit  $AG$  in  $H$  und mit  $A_1G_1$  in  $H_1$ , so sind die beiden Punkte, welche die Strecken  $DH$  und  $D_1H_1$  harmonisch teilen, die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

X. *Ein Kegelschnitt ist durch die beiden Brennpunkte  $BB_1$  und einen Punkt  $P$  gegeben; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden  $g$  konstruieren.*

$\alpha$ . Da  $BP \perp B_1P$  die Länge der Hauptaxe ist, so kennt man deren Endpunkte und folglich die Leitlinien  $l$  und  $l_1$ . Diese mögen  $g$  in  $D$  und  $D_1$  treffen; man ziehe  $DB$  und  $D_1B_1$ , errichte in  $B$  und  $B_1$  auf diesen Verbindungslinien die Senkrechten, welche  $g$  in  $E$  und  $E_1$  schneiden, so sind diejenigen beiden Punkte, welche die Strecken  $DE$  und  $D_1E_1$  harmonisch teilen, die gesuchten Schnittpunkte.

$\beta$ . Man konstruiere um  $B_1$  mit der Summe oder Differenz  $BP \pm B_1P$  einen Kreis, fälle von  $B$  auf  $g$  die Senkrechte  $BD$ , verlängere sie über  $D$  um sich selbst bis  $E$ , so sind die Mittelpunkte derjenigen beiden Kreise, welche durch  $B$  und  $E$  gehen und den um  $B_1$  gezeichneten Kreis berühren, die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

XI. *Von einem Kegelschnitte kennt man drei Tangenten und einen Brennpunkt.*

Die Fußpunkte der Senkrechten aus dem Brennpunkte auf die Tangenten liegen auf dem Scheitelkreise.

XII. *Von einem Kegelschnitte kennt man drei Punkte und eine Leitlinie.*

Die gegebenen Punkte seien  $PQR$ , die gegebene Leit-



linie  $l$ . Man ziehe  $PQ$  bis zum Durchschnitte  $R_1$  mit  $l$ , mache  $PQR_1R_2$  harmonisch, so daß  $R_1R_2$  zugeordnet sind, so liegt der Brennpunkt  $B$  von  $l$  auf einem Kreise über  $R_1R_2$ . Schneidet man ferner  $l$  mit  $QR$  in  $P_1$  und mit  $RP$  in  $Q_1$ , macht  $QRP_1P_2$  und  $RPQ_1Q_2$  harmonisch, so liegt derselbe Brennpunkt  $B$  auch in den über  $P_1P_2$  und  $Q_1Q_2$  beschriebenen Kreisen.

XIII. *Von einem Kegelschnitte kennt man drei Punkte und einen Brennpunkt.*

$\alpha$ . Die gegebenen Punkte  $PQR$  verbinde man mit dem gegebenen Brennpunkte  $B$ . Man konstruiere die Halbierungslinien der Winkel  $PBQ$ ,  $QBR$ ,  $RBP$  und ihrer Nebenwinkel durch die Geraden  $r_1r_2$ ,  $p_1p_2$ ,  $q_1q_2$ , welche die Geraden

$$\begin{array}{ccc} PQ, & QR, & RP \\ \text{in} & R_1R_2, & P_1P_2, & Q_1Q_2 \end{array}$$

schneiden. Jeder dieser Punkte ist ein Punkt einer Leitlinie des Kegelschnittes. Diese sechs Punkte liegen daher viermal zu je drei in einer Geraden:

$$P_1Q_1R_1, P_1Q_2R_2, P_2Q_1R_2, P_2Q_2R_1$$

und diese vier Geraden bilden ein vollständiges Vierseit, dessen Diagonaldreieck  $PQR$  ist und dessen drei Diagonalen die Strecken

$$P_1P_2, Q_1Q_2, R_1R_2$$

sind. Da der Brennpunkt  $B$  auf jedem über einer dieser Diagonalen beschriebenen Kreise liegt, so folgt der schon früher bewiesene Satz:

*Die Kreise über den Diagonalen eines vollständigen Vierseits schneiden sich in einem Punkte.*

$\beta$ . Eine andere Auflösung beruht auf dem Satze, daß ein Kreis über der Verbindungslinie des Brennpunktes mit einem Punkte des Kegelschnittes den Scheitelkreis berührt. Man verbinde also  $B$  mit  $PQR$  und beschreibe über  $BP$ ,  $BQ$ ,  $BR$  Kreise, so ist derjenige Kreis, welcher alle drei Kreise berührt, der Scheitelkreis. Solcher Berührungskreise giebt es vier, also hat die Aufgabe, wie auch die vorige Lösung ergab, vier Auflösungen.



XIV. *Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, einen Punkt und zwei Tangenten.*

$\alpha$ . Den gegebenen Brennpunkt  $B$  verbinde man mit dem gegebenen Punkte  $P$  und beschreibe über  $BP$  einen Kreis, fälle dann auf die gegebenen Tangenten  $q$  und  $r$  die Senkrechten  $BQ$  und  $BR$ , so sind diejenigen Kreise, welche den über  $BP$  beschriebenen Kreis und die Punkte  $Q$  und  $R$  berühren, Scheitelkreise der gesuchten Kegelschnitte.

$\beta$ . Die Tangenten  $q$  und  $r$  mögen den gesuchten Kegelschnitt in  $D$  und  $E$  berühren und sich in  $F$  schneiden. Der




Fig. 130.

Pol von  $BF$  muß auf der Polare  $DE$  von  $F$  und auch auf dem in  $B$  auf  $BF$  errichteten Lote liegen, da je zwei senkrechte Strahlen im Brennpunkte konjugiert sind. Also ist der Schnittpunkt  $G$  beider Geraden der Pol von  $BF$ . Dieser liegt aber, da  $F(DEBG)$  harmonische Strahlen

sind, auf der Leitlinie  $l$  des Brennpunktes  $B$  und ist somit ein fester Punkt. Also:

*Die Berührungssehnen aller konfokalen Kegelschnitte mit zwei festen Tangenten gehen durch einen festen Punkt auf der Leitlinie des gemeinschaftlichen Brennpunktes.*

Verbindet man  $G$  mit  $P$ , so ist derjenige Punkt  $P_1$ , welcher  $P$  von  $G$  und seiner Polare  $BF$  harmonisch trennt, ein Punkt des Kegelschnittes.

Ist  $B_1$  der zweite Brennpunkt des Kegelschnittes, so ist

$$\sphericalangle DFB = \sphericalangle EFB_1.$$

Ferner ist  $BP \pm B_1P = BP_1 \pm B_1P_1$

jenachdem der Kegelschnitt Ellipse oder Hyperbel ist, also

$$BP - BP_1 = \mp (B_1P - B_1P_1).$$

Beschreibt man mit dieser bekannten Differenz um  $P$  einen Kreis, so ist  $B_1$  der Mittelpunkt eines Kreises, welcher



den vorigen berührt, durch  $P_1$  geht und dessen Mittelpunkt auf dem freien Schenkel des Winkels  $EFB_1$  liegt.

XV. *Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, zwei Punkte und eine Tangente.*

$\alpha$ . Sind  $B$  der Brennpunkt,  $P$  und  $P_1$  die gegebenen Punkte,  $r$  die gegebene Tangente, so beschreibe man über  $BP$  und  $BP_1$  Kreise, fälle auf  $r$  die Senkrechte  $BR$ , so sind diejenigen Kreise, welche die vorhin beschriebenen Kreise und den Punkt  $R$  berühren, Scheitelkreise der gesuchten Kegelschnitte.

$\beta$ . Da (Fig. 130)  $\sphericalangle FBG = 90^\circ$  ist, so sind  $BJ$  und  $BG$  Halbierungslinien des Winkels  $PBP_1$  und seines Nebenwinkels, also sind die Punkte  $G$  und  $J$  bekannt; ferner ist der Schnittpunkt  $F$  der Tangente  $r$  mit der Winkelhalbierenden  $BJ$  bekannt, also läßt sich die Tangente  $q$  konstruieren, welche  $r$  von  $FB$  und  $FG$  harmonisch trennt. Man hat also wieder die vorige Aufgabe.

XVI. *Einen Kegelschnitt zu konstruieren, wenn gegeben sind:*

- a. *ein Brennpunkt, zwei Punkte und die Lage der Hauptaxe.*
- b. *Ein Brennpunkt, zwei Punkte und die Länge der Hauptaxe.*
- c. *Ein Brennpunkt, ein Punkt, eine Tangente und die Länge oder Lage der Hauptaxe.*
- d. *Ein Brennpunkt, zwei Tangenten und die Länge oder Lage der Hauptaxe.*

Die Auflösung ist ähnlich wie bei den vorhergehenden Aufgaben.

XVII. *Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt  $B$ , die Länge der Nebenaxe und*

- a. *zwei Punkte*
- b. *einen Punkt und eine Tangente*
- c. *zwei Tangenten.*

Fällt man vom Brennpunkte auf die zur Hauptaxe parallelen Tangenten die Senkrechten, so liegen ihre Fußpunkte auf dem Scheitelkreise. Die Senkrechte ist aber gleich der Nebenaxe und der um  $B$  mit ihrer Hälfte beschriebene Kreis wird vom Scheitelkreise unter dem Durchmesser geschnitten.

Sind  $P$  und  $Q$  die gegebenen Punkte, so berührt der



Scheitelkreis die über  $BP$  und  $BQ$  beschriebenen Kreise, also ist die Aufgabe a. auf folgende zurückgeführt:

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei andere berührt und einen dritten unter dem Durchmesser schneidet.

Analog löst man b. und c.

XVIII. *Aus zwei der Grösse und Lage nach gegebenen konjugierten Durchmessern die Axen der Lage und Grösse nach zu konstruieren.*

Sind  $AB$  und  $CD$  die konjugierten Durchmesser, so ziehe man in den Endpunkten die parallelen Tangenten; die Diagonalen des von ihnen gebildeten Parallelogramms schneiden sich im Mittelpunkte  $M$  des Kegelschnittes und sind auch konjugierte Durchmesser. Beide Paare konjugierter Durchmesser bestimmen eine Involution, in welcher das rechtwinklige Strahlenpaar die Axen des Kegelschnittes bildet. Mit der Tangente in  $A$  schneide man die eine Axe in  $E$ , ziehe  $EF$  parallel zu  $AB$  bis zum Durchschnitte mit  $CD$  in  $F$ , mache  $CDFG$  harmonisch, sodafs  $F$  und  $G$  zugeordnet sind, so ist  $AG$  die Polare von  $E$ . Sie schneide die Axe  $ME$  in  $H$ ; aus der Gleichung  $a^2 = ME \cdot MH$  bestimmt man die Länge der Halbaxe.

XIX. *Aus drei Punkten  $PQR$  und einem der Lage und seinem der Richtung nach gegebenen konjugierten Durchmesser die Grösse des ersten zu bestimmen.*

Die Sehnen  $PQ$  und  $PR$  schneiden einen Durchmesser in  $R_1$  und  $Q_1$ ; man mache  $PQR_1R_2$  und  $PRQ_1Q_2$  harmonisch, so dafs  $R_1R_2$  und  $Q_1Q_2$  zugeordnet sind, ziehe durch  $R_2$  und  $Q_2$  Parallelen zur Richtung des zweiten Durchmessers, bis sie den ersten in  $R_1'$  und  $Q_1'$  treffen und konstruiere dasjenige Punktpaar, welches die Strecken  $R_1R_1'$  und  $Q_1Q_1'$  harmonisch teilt.

XX. *Von einem Kegelschnitte kennt man den Mittelpunkt und drei Tangenten; man soll die Berührungspunkte des letzteren konstruieren.*

Die Tangenten bilden das Dreieck  $ABC$ , die Berührungspunkte seien  $A_1B_1C_1$ , der Mittelpunkt sei  $M$ . Die Gerade  $A_1B_1$  ist die Polare von  $C$  und wird also von dem durch



$C$  gehenden Durchmesser  $CM$  in  $D$  halbiert. Da aber alle Strecken zwischen den Tangenten  $AC$  und  $BC$ , welche durch  $CM$  halbiert werden, dieselbe Richtung haben, so ist  $A_1B_1$  und ebenso  $A_1C_1$  und  $B_1C_1$  der Richtung nach bekannt. Man hat also in das Dreieck  $ABC$  ein anderes zu zeichnen, dessen




Fig. 131.

Seiten eine bestimmte Richtung haben. VII.

Die Hilfsaufgabe löst man leicht auf folgende Art. Man zeichnet ein beliebiges Dreieck  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1$  mit den gegebenen Seitenrichtungen und legt durch seine Ecken Parallelen zu den Seiten von  $ABC$ , welche sich in  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  treffen, so müssen sich  $A\mathfrak{A}$ ,  $B\mathfrak{B}$ ,  $C\mathfrak{C}$  in einem Punkte  $P$  schneiden. Mit  $\mathfrak{A}_1P$ ,  $\mathfrak{B}_1P$ ,  $\mathfrak{C}_1P$  schneidet man die Seiten  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$  in den gesuchten Punkten  $A_1B_1C_1$ .

XXI. Von einem Kegelschnitte kennt man den Mittelpunkt und ein Poldreieck.




Fig. 132.

Der Mittelpunkt sei  $M$ , das Poldreieck  $ABC$ . Man schneide die Seiten desselben mit  $AM$ ,  $BM$ ,  $CM$  in  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ , so werden die Durchmesser  $A_1A_2$ ,  $B_1B_2$ ,  $C_1C_2$  durch  $A\mathfrak{A}$ ,  $B\mathfrak{B}$ ,  $C\mathfrak{C}$  harmonisch geteilt, also ist

$$MA_1^2 = MA \cdot M\mathfrak{A}.$$

XXII. Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt und ein Poldreieck.

Der Brennpunkt sei  $F$ , das Poldreieck  $ABC$ . Sind  $D$  und  $E$  die Schnittpunkte der Leitlinie des Brennpunktes  $F$  mit  $BC$  und  $AB$ , so sind  $AF$  und  $CF$  die Polaren von  $D$  und  $E$ . Denn die Polare eines Punktes der Leitlinie geht



durch den Brennpunkt und  $D$  liegt auf der Polare  $BC$  von  $A$ ,  $E$  auf derjenigen  $AB$  von  $C$ . Man kennt also die Leitlinie.




Fig. 133.

Die Gerade  $AF$  schneide  $BC$  in  $G$ ; sind dann  $H$  und  $J$  die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte, so trennen sie sowohl  $B$  und  $C$  als  $D$  und  $G$  harmonisch und sind dadurch bestimmt.

XXIII. Von einem Kegelschnitte kennt man eine Leitlinie und ein Poldreieck. Fig. 133.

Gegeben sei die Leitlinie  $l$  und das Poldreieck  $ABC$ . Da  $D$  und  $E$  bekannt und  $\sphericalangle AFD = CFE = 90^\circ$  ist, so findet man den Brennpunkt  $F$ .

Wenn man noch  $l$  mit  $AC$  in  $K$  schneidet, so ist auch  $\sphericalangle KFB = 90^\circ$ . Die vier Geraden  $l$ ,  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$  bilden ein vollständiges Vierseit, in welchem  $AD$ ,  $CE$ ,  $BK$  die Diagonalen sind. Die Kreise über diesen schneiden sich in  $F$ . Daraus aber folgt der Satz:

„Wenn man über den Diagonalen eines vollständigen Vierseits Kreise zeichnet, so schneiden sich dieselben in einem Punkte, dem Brennpunkte eines Kegelschnittes, welcher die eine Seite als Leitlinie und die drei anderen als Poldreiseit hat.“

XXIV. Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, einen Punkt und ein Paar Pol und Polare.

Der Brennpunkt sei  $B$ , der gegebene Punkt  $P$ , und das Paar Pol und Polare seien  $A$  und  $a$ . Verbindet man  $A$  mit



$B$ , so muß der Pol von  $AB$  sowol auf  $a$ , als auf der Senkrechten in  $B$  auf  $BA$  liegen; der Schnittpunkt beider sei  $C$ . Konstruiert man dann auf  $CP$  denjenigen Punkt  $Q$ , welcher  $P$




Fig. 134.

von  $C$  und seiner Polare  $AB$  und ebenso auf  $AP$  denjenigen Punkt  $R$ , welcher  $P$  von  $A$  und  $a$  harmonisch trennt, so sind  $Q$  und  $R$  Punkte des Kegelschnittes.

XXV. Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, eine Tangente und ein Paar Pol und Polare. Fig. 134.

Brennpunkt und Tangente seien  $B$  und  $p$ , Pol und Polare  $A$  und  $a$ . Man bestimmt zuerst, wie in der vorigen Aufgabe, den Punkt  $C$  als Durchschnitt von  $a$  mit der in  $B$  auf  $AB$  errichteten Senkrechten. Die Tangente  $p$  schneide  $a$  in  $D$ ; man findet die zweite Tangente durch  $D$  als diejenige Gerade, welche  $p$  von  $a$  und  $A$  harmonisch trennt; man schneide ferner  $p$  mit  $AB$  in  $E$ , dann ist  $CP$  die Polare von  $E$  und diejenige Gerade, welche  $p$  von  $CE$  und  $AE$  harmonisch trennt, ist die andere Tangente durch  $E$ . Also kennt man vom Kegelschnitte einen Brennpunkt und drei Tangenten.

XXVI. Von einem Kegelschnitte kennt man eine Leitlinie, eine Tangente mit ihrem Berührungspunkte und einen Punkt.

Die Leitlinie sei  $l$ , die Tangente mit ihrem Berührungspunkte  $p$  und  $P$ , der Punkt  $Q$ . Schneidet man die Leitlinie



mit  $p$  in  $A$ , so muß der Brennpunkt auf einem Kreise über  $AP$  liegen.




Fig. 135.

Wenn  $PQ$  die Leitlinie in  $C$  trifft, so ist die Polare von  $C$  diejenige Gerade, welche im Brennpunkte  $B$  auf  $CB$  senkrecht steht; sie treffe  $PQ$  in  $D$ , dann sind  $CDPQ$  harmonisch, und da

$$\sphericalangle CBD = 90^\circ,$$

so ist

$$\sphericalangle DBP = \sphericalangle DBQ$$

und

$CP : DP = BP : BQ = p : q$   
wenn  $p$  und  $q$  die von  $P$  und  $Q$  auf  $l$  gefällten Senkrechten sind. Man kann demnach den Punkt  $D$  konstruieren und hat

als zweiten Ort für den Brennpunkt  $B$  den Kreis über  $CD$  als Durchmesser.

XXVII. Von einem Kegelschnitte kennt man den Mittelpunkt, eine Leitlinie und einen Punkt. Fig. 135.

Mittelpunkt, Leitlinie und Punkt seien  $M$ ,  $l$ ,  $P$ . Man ziehe  $MP$ , mache darauf  $MP_1 = MP$ , so ist  $P_1$  ein zweiter Punkt des Kegelschnittes, schneide  $l$  mit  $MP$  in  $E$ , so trifft die Polare von  $E$ , die Gerade  $MP$  in demjenigen Punkte  $F$ , welcher  $E$  von  $P$  und  $P_1$  harmonisch trennt. Diese Polare steht in  $B$  auf  $EB$  senkrecht, also liegt  $B$  auf einem Kreise über  $EF$  als Durchmesser, welcher die Axe im Brennpunkte trifft.

XXVIII. Von einem Kegelschnitte kennt man eine Leitlinie  $l$ , einen Punkt  $P$  und ein Paar Pol und Polare  $A$  und  $a$ . Fig. zu XXIV.

$C$  sei der Schnittpunkt von  $l$  und  $a$ ; dann ist  $\sphericalangle ABC = 90^\circ$ , wenn  $B$  den Brennpunkt bezeichnet, also hat man im Kreise über  $AC$  als Durchmesser einen Ort für den Brennpunkt. Da  $AB$  die Polare von  $C$  ist, so findet man auf  $CP$  den



zweiten Schnittpunkt  $Q$  mit dem Kegelschnitte, wenn man  $C$  und  $AB$  durch  $P$  und  $Q$  harmonisch trennt. Weiter verhalten sich  $PB$  und  $QB$ , wie die Entfernungen der Punkte  $P$  und  $Q$  von der Leitlinie, also kennt man einen zweiten Ort für den Brennpunkt.

XXIX. *Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, seine Leitlinie und zwei konjugierte Punkte.*

Brennpunkt und Leitlinie seien  $B$  und  $l$ ; die beiden konjugierten Punkte seien  $P$  und  $P_1$ . Man schneide  $l$  mit  $PP_1$  in  $Q$ , konstruiere die Polare von  $Q$ , indem man in  $B$  auf  $BQ$  die Senkrechte errichtet, und schneide mit ihr  $PP_1$  in  $Q_1$ , so sind auch  $QQ_1$  konjugierte Punkte. Dadurch aber ist die Involution konjugierter Punkte auf der Geraden  $PQ$  gegeben.

Wenn diese Involution Doppelpunkte hat, so sind es Punkte des Kegelschnittes.




Fig. 136.

Im anderen Falle ziehe man  $BP$  und senkrecht darauf  $BR$ , dann ist der Schnittpunkt  $G$  von  $BQ_1$  und  $RP_1$  der Pol von  $g$ . Man schneide nun  $l$  mit  $BG$  in  $A$ , dann liegt das Punktpaar  $CD$ , welches die Strecken  $AB$  und  $GQ_1$  harmonisch teilt, auf dem Kegelschnitte.

XXX. *Von einem Kegelschnitte kennt man die Lage der beiden Axen und auf einer Geraden  $g$  die Involution konjugierter Punkte.*

Man schneide die beiden Axen, die sich in  $M$  schneiden, mit  $g$  in  $P$  in  $Q$ , bestimme auf  $g$  die involutorisch zugeordneten Punkte  $P_1$  und  $Q_1$ , fälle von  $P_1$  und  $Q_1$  auf  $PM$  und  $QM$  die Senkrechten,  $P_1P_2$  und  $Q_1Q_2$ , so findet man die Endpunkte  $AA_1$  und  $BB_1$  der Axen, welche durch  $PP_2$  und  $QQ_2$  harmonisch getrennt werden, aus den Gleichungen  $MA^2 = MA_1^2 = MP \cdot MP_2$  und  $MB^2 = MB_1^2 = MQ \cdot MQ_2$ .

XXXI. *Von einem Kegelschnitte kennt man die Lage der beiden Axen und ein Paar Pol und Polare.*



Der Mittelpunkt des Kegelschnittes sei  $M$ , das Paar Pol und Polare sei  $A$  und  $a$ . Man schneide die eine Axe mit  $a$  in  $P$ , so muß die Polare von  $P$  durch  $A$  gehen und auf derselben Axe senkrecht stehen; daher fälle man die Senkrechte  $AQ$  auf diese Axe und bestimme die Länge der Halbaxe aus der Gleichung

$$x^2 = MP \cdot MQ.$$

XXXII. *Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, seine Leitlinie und ein Paar Pol und Polare.*

Auflösung wie in XXXI.

XXXIII. *Von einem Kegelschnitte kennt man zwei Paare konjugierter Durchmesser und zwei konjugierte Punkte.*

Der Mittelpunkt sei  $M$ ; die beiden konjugierten Punkte seien  $A$  und  $A_1$ . Durch zwei Paare konjugierter Durchmesser sind alle Paare bestimmt; man schneide die Gerade  $AA_1$  mit dem zur Richtung von  $AA_1$  konjugierten Durchmesser in  $Q$ , so ist  $Q$  der Centralpunkt der Involution konjugierter Punkte auf  $AA_1$ ; dadurch und durch  $AA_1$  ist diese Involution aber bestimmt.

Wenn  $AA_1$  den Kegelschnitt schneidet, also  $A$  und  $A_1$  auf derselben Seite des Centralpunktes liegen, so bestimmt man die Länge der durch  $Q$  gehenden Sehne aus der Gleichung

$$x^2 = QA \cdot QA_1.$$

XXXIV. *Gegeben sind von einem Kegelschnitte ein Durchmesser der Größe und Lage nach, die zu ihm konjugierte Richtung und ein Paar konjugierter Punkte.*

Die Endpunkte des Durchmessers seien  $A$  und  $\mathfrak{A}$ , der Mittelpunkt sei  $M$ ; die konjugierte Richtung ist durch die Gerade  $l$  bestimmt. Ferner seien  $B$  und  $B_1$  zwei konjugierte Punkte. Die Gerade  $BB_1$  schneide den Durchmesser in  $C$ ; man mache  $A\mathfrak{A}C\mathfrak{C}$  harmonisch, so ist die Parallele durch  $\mathfrak{C}$  zu  $l$  die Polare von  $C$ ; sie schneide die Gerade  $BB_1$  in  $\mathfrak{C}_1$ , dann sind  $C\mathfrak{C}_1$  auch zwei konjugierte Punkte.

Wenn  $BB_1$  den Kegelschnitt trifft, so sind diejenigen Punkte, welche  $BB_1$  und  $C\mathfrak{C}_1$  harmonisch teilen, Punkte des Kegelschnittes.

Wenn  $BB_1$  den Kegelschnitt nicht trifft, so konstruiere



man auf ihr den Centralpunkt  $Q$  der Involution, dann liegt auf  $MQ$  der Pol  $P$  von  $BB_1$ . Dieser liegt auch auf der Polare von  $C$ , also kann man ihn finden und bestimmt dann auf dem Durchmesser  $MP$  die Länge  $x$  des Halbmessers aus der Gleichung

$$x^2 = MP \cdot MQ.$$

XXXV. Gegeben ist der Mittelpunkt  $M$ , ein Paar Pol und Polare  $A$  und  $a$  und ein Paar konjugierter Punkte  $P$  und  $P_1$ .

Die Gerade  $a$  ist die zum Durchmesser  $AM$  konjugierte Richtung; ist  $B$  der Schnittpunkt beider, so ist die Länge  $x$  des Halbmessers gegeben durch die Gleichung  $x^2 = MA \cdot MB$ . Dadurch aber ist die Aufgabe auf die vorige zurückgeführt.

XXXVI. Gegeben ist ein Poldreieck, eine Axe und die Diagonale eines umgeschriebenen Rechtecks.

Man konstruiere um das Poldreieck den Kreis und einen anderen mit der gegebenen Diagonale als Radius, welcher jenen rechtwinklig schneidet und dessen Mittelpunkt auf der Axe liegt, so ist letzterer auch der Mittelpunkt des Kegelschnittes.

XXXVII. Von einem Kegelschnitte kennt man die Lage einer Axe und zwei Paare Pol und Polare.

Es seien  $A$  und  $a$ ,  $B$  und  $b$  die beiden Paare Pol und Polare. Man schneide die Axe mit  $a$  und  $b$  in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$ , fälle senkrecht auf die Axe  $A\mathfrak{A}_1$  und  $B\mathfrak{B}_1$  und konstruiere das Punktpaar, welches  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  harmonisch trennt, so liegt es auf dem Kegelschnitte.

XXXVIII. Von einem Kegelschnitte kennt man eine Axe der Lage nach, ein Paar Pol und Polare und zwei konjugierte Punkte.

Es sei  $B$  der Brennpunkt,  $A$  und  $a$  das Paar Pol und Polare. Letztere schneide die Axe in  $C$ ; man fälle  $c$  von  $A$  aus senkrecht auf die Axe, so ist  $c$  die Polare von  $C$ . Schneidet man noch  $a$  mit  $c$  in  $D$ , so ist  $AC$  die Polare von  $D$ . Fig. 137.

Sind  $P$  und  $P_1$  die gegebenen konjugierten Punkte, so schneide man  $c$  mit  $PP_1$  in  $R$ ; auf  $c$  ist durch die beiden konjugierten Punkte  $A$  und  $D$  und durch den Centralpunkt  $Q$ , den Schnittpunkt mit der Axe, die Involution konjugierter Punkte bestimmt. Ist  $\mathfrak{R}$  der zu  $R$  konjugierte Punkt, so ist  $C\mathfrak{R}$  die Polare von  $R$ ; sie schneidet  $PP_1$  in dem zu  $R$  konjugierten Punkte  $R_1$ .



Giebt es ein Punktpaar, welches die Strecken  $PP_1$  und  $RR_1$  harmonisch teilt, so gehört es dem Kegelschnitt an.




Fig. 137.

paar, welches beide harmonisch trennt, liegt auf dem Kegelschnitte.

XXXIX. Von einer Parabel kennt man den Brennpunkt und ein Paar Pol und Polare.

Der Brennpunkt sei  $B$ , das Paar Pol und Polare sei  $A$




Fig. 138.

Leitlinie gefällt, dann liegt der Pol von  $AD$  im Unendlichen

Wenn es kein solches Punktpaar giebt, so schneide man  $PP_1$  mit  $a$  in  $S$ , konstruiere zu  $S$  auf  $PP_1$  den involutorisch zugeordneten Punkt  $S_1$ , so ist  $AS_1$  die Polare von  $S$  und schneidet  $RR_1$  im Pole  $G$  von  $PP_1$ . Man verbindet  $G$  mit der innerhalb des Kegelschnittes liegenden Ecke des Pol-dreiecks  $ACD$  und erhält auf der Verbindungslinie zwei Paare konjugierter Punkte. Dasjenige Punkt-

und  $a$ . Errichtet man in  $B$  auf  $AB$  die Senkrechte, so trifft sie die Polare  $a$  in einem Punkte  $C$  der Leitlinie, denn der Pol von  $AB$  muß sowohl auf der in  $B$  errichteten Senkrechten, als auf  $a$ , als auf der Leitlinie liegen. Man kennt somit einen Punkt der Leitlinie  $l$ . Um einen zweiten Punkt derselben zu erhalten, denke man sich  $AD$  senkrecht auf die



auf  $a$  und auf der Polare  $d$  von  $D$ , welche im Brennpunkte  $B$  auf  $DB$  senkrecht steht. Diese muß daher zu  $a$  parallel sein, also ist

$$BD \perp a.$$

Man findet also  $D$ , indem man von  $B$  die Senkrechte auf  $a$  fällt und mit dem Halbkreise über  $AC$  als Durchmesser zum Durchschnitt bringt.

XXXX. Von einer Parabel kennt man die Leitlinie und ein Paar Pol und Polare. Fig. 138.

Die Leitlinie sei  $l$ , Pol und Polare seien  $A$  und  $a$ .

Der Brennpunkt  $B$  muß auf einem Kreise über  $AC$  als Durchmesser und auf der Geraden liegen, welche man senkrecht von  $D$  auf  $a$  fällt.

XXXI. Von einer Parabel kennt man die Scheiteltangente und ein Paar Pol und Polare.

Die Scheiteltangente sei  $s$ , Pol und Polare seien  $A$  und  $a$ .

Fällt man  $AC$  senkrecht auf  $s$ , und ist  $D$  der Schnittpunkt von  $AC$  mit  $a$ , so ist die Mitte  $E$  von  $AD$  ein Punkt der Parabel und die Parallele durch  $E$  zu  $a$  ist eine Tangente der Parabel. Sie schneide  $s$  in  $F$ . — Ist  $B$  der gesuchte Brennpunkt, so muß  $BF$  auf  $EF$  senkrecht stehen und zieht man  $BG$  senkrecht




Fig. 139.

auf  $s$  bis zum Durchschnitte mit  $EF$ , so ist

$$FG = FE.$$

XXXII. Von einer Parabel kennt man die Lage der Axe und ein Paar Pol und Polare.

Die Gerade  $g$  sei die Axe,  $A$  und  $a$  seien Pol und Polare.

Man schneide  $g$  mit  $a$  in  $C$ , fälle  $AD$  senkrecht auf  $g$ ,



so ist der Scheitel  $S$  der Parabel derjenige Punkt, welcher  $CD$  halbiert. Damit ist die Aufgabe auf XXXI. zurückgeführt.

XXXIII. *Von einer Parabel kennt man zwei Punkte und die Lage der Axe.*

Die Punkte seien  $A$  und  $B$ , die Lage der Axe sei durch die Gerade  $g$  bestimmt.

Man schneide  $g$  mit  $AB$  in  $C$ , mache  $ABCD$  harmonisch, so daß  $C$  und  $D$  zugeordnet sind, fälle  $DE$  senkrecht auf  $g$  und halbiere  $CE$  in  $S$ , so ist  $S$  der Scheitel der Parabel.

XXXIV. *Von einer Parabel kennt man zwei Tangenten und die Lage der Axe.*

Die beiden Tangenten  $a$  und  $b$  mögen sich in  $P$  schneiden; durch  $P$  ziehe man die Gerade  $c$  parallel zur Axe und eine zweite Gerade  $d$  so, daß

$$\sphericalangle(ac) = (bd)$$

dann trifft  $d$  die Axe im Brennpunkte.

XXXV. *Von einer Parabel kennt man drei Punkte und die Richtung der Axe.*

Die gegebenen Punkte seien  $ABC$ , die Axe soll einer Geraden  $g$  parallel laufen.

Halbiert man  $AB$  in  $D$  und fällt  $DE$  senkrecht auf die




Fig. 140.

Leitlinie, schneidet mit  $DE$  die Parabel in  $G$ , so ist die Verbindungslinie von  $E$  mit dem Brennpunkte  $F$  senkrecht auf der in  $G$  gezogenen Tangente und daher auch senkrecht auf der Sehne  $AB$ .

Aus der Mitte  $D_1$  von  $AC$  fälle man  $D_1E_1$  senkrecht auf die Leitlinie, so muß auch  $E_1F$  senkrecht auf  $AC$  stehen.

Wenn man auf den Geraden  $DE$  und  $D_1E_1$  irgend zwei Punkte  $X$  und  $X_1$  nimmt, deren Verbindungsgerade senkrecht zur Axe steht, so müssen die

Senkrechten aus ihnen auf die Sehnen  $AB$  und  $AC$  sich stets in einem Punkte  $Y$  der Axe schneiden. Man kann daher einen Punkt der Axe finden und die Parallele durch ihn zu  $g$  giebt dann die Axe selbst. Dadurch ist die Aufgabe auf XXXIII. zurückgeführt.



XXXXVI. *Von einer Parabel kennt man drei Tangenten und die Richtung der Axe.*

Die gegebenen Tangenten seien  $abc$ , die Axe soll einer Geraden  $g$  parallel sein.

Die Schnittpunkte der Tangenten  $a$  und  $b$ ,  $b$  und  $c$ ,  $c$  und  $a$  mögen mit  $C$ ,  $A$ ,  $B$  bezeichnet werden. Zieht man durch diese Parallelen zur Axe, so halbieren sie die Berührungssehnen. Da aber die Parallelen bekannt sind, so kennt man auch die Richtung der Berührungssehnen. Zeichnet man demnach in das Dreieck  $ABC$  ein anderes, dessen Seiten die bekannten Richtungen der Berührungssehnen haben, so sind seine Ecken die Berührungspunkte. Den Brennpunkt findet man, wenn man in  $A$  und  $B$  die Parallelen  $a_1$  und  $b_1$  zur Axe zieht und durch dieselben Punkte andere Gerade  $a_2$  und  $b_2$  zieht, so daß

$$\sphericalangle (AC, a_1) = (AB, a_2) \text{ und } \sphericalangle (BC, b_1) = (BA, b_2)$$

ist und die Geraden  $a_2$  und  $b_2$  zum Durchschnitte bringt.

XXXXVII. *Von einer Parabel kennt man ein Poldreieck und die Richtung der Axe.*

Das Poldreieck sei  $ABC$ , die Axe sei der Geraden  $g$  parallel.

Zieht man durch  $A$  die Parallele zur Axe, welche  $BC$  in  $A_1$  schneiden mag, so muß die Polare von  $A_1$  durch  $A$  gehen, also ist die Mitte  $A_2$  von  $AA_1$  ein Punkt der Parabel und die Parallele  $a$  durch  $A_2$  eine Tangente derselben. In analoger Weise erhält man noch zwei Punkte der Parabel mit ihren Tangenten.

XXXXVIII. *Von einer Parabel kennt man Brennpunkt und Leitlinie; man soll ihre Schnittpunkte mit einer Geraden  $g$  konstruieren.*

Brennpunkt und Leitlinie seien  $B$  und  $l$ , die gegebene Fig. 141. Gerade sei  $g$ .

$\alpha$ . Man kann zunächst die zu  $g$  parallele Tangente und ihren Berührungspunkt konstruieren. Dazu fälle man  $BA$  senkrecht auf die Leitlinie, halbiere  $AB$  in  $C$ , errichte in  $C$  die Scheiteltangente  $c$ , und schneide sie mit der aus  $B$  auf  $g$  gefällten Senkrechten in  $D$ , so ist die durch  $D$  zu  $g$  gezogene



Parallele Tangente der Parabel. Um den Berührungspunkt zu finden, verlängere man  $BD$  bis zum Durchschnitte  $E$  mit




Fig. 141.

der Leitlinie, so trifft die durch  $E$  zur Axe parallel gezogene Gerade die Tangente im Berührungspunkte  $F$  und die Gerade  $g$  im Halbierungspunkte  $G$  der auf ihr abgeschnittenen Parabelsehne.

Schneidet man ferner die Leitlinie  $l$  mit  $g$  in  $H$ , zieht  $HB$  und in  $B$  darauf die Senkrechte, welche  $g$  in  $J$  treffen mag, so wird die Parabelsehne durch  $H$  und  $J$  harmonisch geteilt. Die Hälfte  $x$  dieser Sehne wird daher

bestimmt durch die Gleichung

$$x^2 = GH \cdot GJ.$$

$\beta$ . Sind  $K$  und  $L$  die gesuchten Schnittpunkte,  $KK_1$  und  $LL_1$  senkrecht zur Leitlinie, so ist

$$KB = KK_1 \text{ und } LB = LL_1.$$

Daher sind  $L$  und  $L_1$  die Mittelpunkte zweier Kreise, welche  $B$  und  $l$  berühren. Man findet leicht einen zweiten Punkt  $B_1$ , durch den diese Kreise gehen müssen, nämlich den Gegenpunkt von  $B$  in Bezug auf  $g$ .

XXXXIX. Von einem Kegelschnitte kennt man einen Brennpunkt, seine Leitlinie und einen Punkt; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden bestimmen.

Brennpunkt und Leitlinie seien  $B$  und  $l$ , der gegebene Punkt sei  $P$ , die gegebene Gerade  $g$ .

$\alpha$ . Man fälle  $BA$  und  $PD$  senkrecht auf  $l$ , teile  $AB$  in Verhältnisse  $PD : PB$  in den Punkten  $C$  und  $C_1$ , so sind diese Punkte die Endpunkte der Hauptaxe. Man kann daher leicht den zweiten Brennpunkt  $B_1$  und die zweite Leitlinie  $l_1$  konstruieren.

Die gegebene Gerade  $g$  schneide  $l$  und  $l_1$  in  $G$  und  $G_1$ ; man konstruiere die Polaren dieser Punkte, indem man in  $B$  und  $B_1$  auf  $GB$  und  $G_1B_1$  die Senkrechten errichtet. Diese



mögen  $g$  in  $H$  und  $H_1$  treffen, dann sind die Punkte, welche  $GH$  und  $G_1H_1$  harmonisch teilen, die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

$\beta$ . Nachdem man die Hauptaxe  $CC_1$  und den zweiten Brennpunkt  $B_1$  konstruiert hat, beschreibe man um  $B_1$  mit  $CC_1$  den Leitkreis von  $B$ , bestimme den Gegenpunkt  $B'$  von  $B$ , so sind die Mittelpunkte derjenigen Kreise, welche  $BB'$  und den Leitkreis von  $B$  berühren, die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte.

XXXXX. Von zwei confocalen Kegelschnitten  $K$  und  $K_1$  kennt man den gemeinschaftlichen Brennpunkt und je drei Punkte; man soll die Schnittpunkte konstruieren.

Der Brennpunkt sei  $B$ , die drei Punkte  $PQR$  und  $P_1Q_1R_1$ .

Ist  $S$  ein gemeinschaftlicher Punkt und denkt man sich  $B$  mit  $S$  verbunden und über der Verbindungsstrecke als Durchmesser einen Kreis beschrieben, so berührt dieser die Scheitelkreise beider Kegelschnitte.

Man hat also die Scheitelkreise zu konstruieren und die Mittelpunkte derjenigen Kreise zu bestimmen, welche diese berühren und durch den gemeinschaftlichen Brennpunkt gehen.

354a. Aufgaben.

I. Ein Kegelschnitt ist durch fünf Punkte gegeben; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden konstruieren.




Fig. 142.

$\alpha$ . Die gegebenen Punkte seien  $ABCDE$ , die gegebene Gerade  $g$ . Man konstruiere die drei Diagonalepunkte  $PQR$  des



vollständigen Vierecks  $ABCD$ , so daß  $P$  der Schnittpunkt von  $AB$  und  $CD$ ,  $Q$  derjenige von  $AC$  und  $BD$  und endlich  $R$  derjenige von  $AD$  und  $BC$  ist. Dann ist  $RQ$  die Polare von  $P$ . Auf  $PE$  konstruiere man den Punkt  $F$ , welcher  $E$  von  $P$  und  $QR$  harmonisch trennt, so liegt er auf dem Kegelschnitte. Die Schnittpunkte  $S$ ,  $T$  von  $CE$  und  $DF$ ,  $CF$  und  $DE$  liegen auch auf der Polare  $QR$  von  $P$ . Auf dieser sind diejenigen Punkte  $M$  und  $N$ , welche die Strecken  $QR$  und  $ST$  harmonisch teilen, Punkte des Kegelschnittes.

In gleicher Weise bestimme man die Diagonalepunkte  $P_1Q_1R_1$  des vollständigen Vierecks  $ACFD$  und auf der Polare  $Q_1R_1$  von  $P_1$  die Schnittpunkte  $M_1N_1$  mit dem Kegelschnitte.

Es mag die Gerade  $g$  die Polaren  $MN$  und  $M_1N_1$  von  $P$  und  $P_1$  in  $G$  und  $G_1$  schneiden; man mache  $MNGH$  und  $MNG_1H_1$  harmonisch, so daß  $H$  und  $H_1$  die den Punkten  $G$  und  $G_1$  zugeordneten Punkte sind, so sind  $PH$  und  $P_1H_1$  die Polaren von  $G$  und  $G_1$ . Bezeichnet man die Schnittpunkte dieser Polaren und der Geraden  $g$  mit  $J$  und  $J_1$ , so sind diejenigen Punkte, welche die Strecken  $GJ$  und  $G_1J_1$  harmonisch teilen, die Schnittpunkte der Geraden  $g$  mit dem Kegelschnitte.

$\beta$ . Wenn die Gerade  $g$  durch einen der gegebenen Punkte z. B.  $A$  geht, so vereinfacht sich die Konstruktion, da man den Punkt  $P_1$  und dessen Polare nicht mehr braucht. Man konstruiert nur wie vorhin den Schnittpunkt  $G$  von  $g$  und  $QR$ , macht wieder  $MNGH$  harmonisch, bestimmt den Schnittpunkt  $J$  von  $g$  und  $PH$  und denjenigen Punkt  $A_1$ , welcher  $A$  von  $G$  und  $J$  harmonisch trennt.

Eine andere Konstruktion der letzten Aufgabe ergibt sich aus dem Pascal'schen Lehrsatz. Cf. 158. II.

II. *Ein Kegelschnitt ist durch fünf Punkte gegeben; man soll in einem von ihnen die Tangente ziehen.*

$\alpha$ . Sind  $ABCDE$  die fünf gegebenen Punkte und soll man in  $A$  die Tangente ziehen, so konstruiere man wie vorhin die Diagonalepunkte  $PQR$  des vollständigen Vierecks  $ABCD$ , die Schnittpunkte  $M$  und  $N$  von  $QR$  mit dem Kegelschnitte und denjenigen Punkt  $L$ , welcher die Gerade  $AP$  harmonisch von  $M$  und  $N$  trennt, so ist  $AL$  eine Tangente des Kegelschnittes.



$\beta$ . Eine zweite Konstruktion liefert der Pascal'sche Lehrsatz.

Man bestimme die Schnittpunkte  $M$  von  $AB$  und  $DE$ ,




Fig. 143.

$N$  von  $AE$  und  $BC$ ,  $O$  von  $MN$  und  $CD$ , so soll  $AO$  Tangente des Kegelschnittes sein. Cf. 105. 157c.

III. An einen durch fünf Punkte gegebenen Kegelschnitt von einem gegebenen Punkte  $U$  die Tangenten zu ziehen.

Die fünf gegebenen Punkte seien  $ABCDE$ . Man konstruiere wieder die drei Diagonalepunkte  $PQR$  des vollständigen Vierecks  $ABCD$  und auf  $QR$  die Schnittpunkte  $M$  und  $N$  mit dem Kegelschnitte, darauf mit Hülfe der Aufgabe 354a. I  $\beta$ . die Schnittpunkte  $A_1$  und  $B_1$  der Geraden  $UA$  und  $UB$  mit dem Kegelschnitte und endlich die Schnittpunkte  $V$  und  $W$  der Geraden  $AB$  und  $A_1B_1$ ,  $AB_1$  und  $A_1B$ , so ist  $VW$  die Polare von  $U$ . Auf dieser konstruiere man die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte, so sind dieselben die Berührungspunkte der Tangenten durch  $U$ .

IV. An einen durch fünf Tangenten gegebenen Kegelschnitt von einem gegebenen Punkte  $U$  die Tangenten zu ziehen.

$\alpha$ . Die gegebenen Tangenten seien  $abcde$ ; die Verbindungslinien der Gegeneckenpaare  $ab$  und  $cd$ ,  $ac$  und  $bd$ ,  $ad$  und  $bc$  bezeichne man mit  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , dann ist der Punkt  $qr$  der Pol von  $p$ . Im Schnittpunkte  $pe$  konstruiere man denjenigen Strahl  $f$ , welcher  $e$  von  $p$  und  $qr$  harmonisch trennt, so berührt er den Kegelschnitt. Die Geraden  $s$ ,  $t$ , welche die



Schnittpunkte von  $ce$  und  $df$ ,  $de$  und  $cf$  verbinden, müssen auch durch den Punkt  $qr$  gehen. In diesem sind diejenigen

Geraden  $m$  und  $n$ , welche die Strahlen  $q$  und  $r$ , sowie  $s$  und  $t$  harmonisch trennen, Tangenten des Kegelschnittes.

In gleicher Weise bestimme man im vollständigen Vierseite  $acfd$  die Seiten  $p_1$ ,  $q_1$ ,  $r_1$  des Diagonaldreiecks und im Punkte  $q_1r_1$  die Tangenten  $m_1$  und  $n_1$  an den Kegelschnitt.

Man verbinde  $U$  mit den Punkten  $mn$  und  $m_1n_1$  durch die Geraden  $u$  und  $u_1$ , mache

$mnuv$  und  $m_1n_1u_1v_1$  harmonisch, so daß  $v$  und  $v_1$  den Geraden  $u$  und  $u_1$  bezüglich zugeordnet sind, so sind die Punkte  $pv$  und  $p_1v_1$  die Pole von  $u$  und  $u_1$ . Die Verbindungslinien dieser Pole mit  $U$  und  $U_1$  seien  $w$  und  $w_1$ , so sind diejenigen Strahlen  $u_0v_0$ , welche  $u$  und  $w$ , sowie  $u_1$  und  $w_1$  harmonisch trennen, die Tangenten durch  $U$  an den Kegelschnitt.

$\beta$ . Wenn der Punkt auf einer der gegebenen Tangenten z. B.  $a$  liegt, so vereinfacht sich die Konstruktion, da man das zweite Diagonaldreieck nicht mehr braucht. Man konstruiert nur, wie vorhin die Verbindungsgerade  $u$  von  $U$  mit dem Punkte  $mn$ , macht wieder  $mnuv$  harmonisch, bestimmt die Gerade  $w$ , welche  $U$  mit dem Pole  $pv$  von  $u$  verbindet und konstruiert endlich denjenigen Strahl, welcher  $a$  von  $u$  und  $w$  harmonisch trennt.

Eine andere Konstruktion des letzten Teiles der Aufgabe ergibt sich aus dem Lehrsatz von Brianchon. Cf. 159. II.

V. Ein Kegelschnitt ist durch fünf Tangenten gegeben; man soll auf einer von ihnen den Berührungspunkt konstruieren.

$\alpha$ . Sind  $abcde$  die fünf gegebenen Tangenten und soll




Fig. 144.



man auf  $a$  den Berührungspunkt konstruieren, so bestimme man zunächst das Diagonaldreiseit  $pqr$  des vollständigen Vierseits  $abcd$ , die Tangenten  $m$  und  $n$  durch  $qr$  an den Kegelschnitt und diejenige Gerade  $l$ , welche den Punkt  $ap$  von  $m$  und  $n$  harmonisch trennt, so ist  $al$  der Berührungspunkt auf  $a$ .




Fig. 145.

$\beta$ . Der Satz von Brianchon giebt die folgende Konstruktion.

Man bestimme die Verbindungsgeraden  $m$  der Punkte  $ab$  und  $de$ ,  $n$

der Punkte  $ae$  und  $bc$ ,  $o$  der Punkte  $mn$  und  $cd$ , so soll der Schnittpunkt  $ao$  ein Punkt des Kegelschnittes sein.

VI. Von einem Kegelschnitte kennt man fünf Tangenten  $abcde$ ; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden  $g$  konstruieren.

$\alpha$ . Man konstruiere das Diagonaldreiseit  $pqr$  des vollständigen Vierseits  $abcd$  und im Punkte  $qr$  die Tangenten  $m$  und  $n$  an den Kegelschnitt, darauf mit Hilfe von IV  $\beta$ . die Tangenten  $a_1$  und  $b_1$  von den Punkten  $ag$  und  $bg$  an den Kegelschnitt, und endlich die Geraden  $v$  und  $w$ , welche die Punkte  $ab$  und  $a_1b_1$ ,  $ab_1$  und  $a_1b$  verbinden, so ist der Punkt  $vw$  der Pol von  $g$ . Durch diesen konstruiere man die Tangenten an den Kegelschnitt nach IV  $\alpha$ . und auf ihnen nach V. die Berührungspunkte, so sind es die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

$\beta$ . Wenn man mit Hilfe von V. auf jeder der Tangenten den Berührungspunkt bestimmt, so ist die Aufgabe auf I. zurückgeführt.

VIII. Ein Kegelschnitt ist durch vier Punkte  $ABCD$  und die Tangente  $a$  in  $A$  gegeben; man soll seine Schnittpunkte mit einer gegebenen Geraden  $g$  konstruieren.

$\alpha$ . Zunächst bestimme man das Diagonaldreieck  $PQR$  des vollständigen Vierseits  $ABCD$ , schneide  $QR$  mit  $AB$  in  $S$



und mit  $a$  in  $T$ , so sind diejenigen Punkte,  $M$  und  $N$ , welche  $Q$  und  $R$ , sowie  $S$  und  $T$  harmonisch trennen, Punkte des Kegelschnittes.

In gleicher Weise schneide man  $PQ$  mit  $AD$  in  $S_1$  und




Fig. 146.

mit  $a$  in  $T_1$  und konstruiere diejenigen Punkte  $M_1$  und  $N_1$ , welche  $P$  und  $Q$ , sowie  $S_1$  und  $T_1$  harmonisch trennen.

Darauf schneide man  $MN$  und  $M_1N_1$  mit  $g$  in  $G$  und  $G_1$ , mache  $MNGH$  und  $M_1N_1G_1H_1$  harmonisch, schneide  $g$  mit  $HP$  und  $H_1R$  in  $J$  und  $J_1$ , so sind die Punkte  $E$  und  $F$ , welche  $GJ$  sowie  $G_1J_1$  harmonisch teilen, die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

$\beta$ . Die Gerade  $g$  gehe durch einen der gegebenen Punkte, etwa durch  $B$ .

Man konstruiere wie in  $\alpha$ . das Diagonaldreieck  $PQR$  und auf  $QR$  die Schnittpunkte  $M$  und  $N$  mit dem Kegelschnitte, schneide  $QR$  mit  $g$  in  $G$ , mache  $MNGH$  harmonisch, so ist  $PH$  die Polare von  $G$ , schneide  $g$  mit  $PH$  in  $J$  und mache  $GJBB_1$  harmonisch, so daß  $B$  und  $B_1$  zugeordnet sind, so ist  $B_1$  der zweite Schnittpunkt von  $g$  mit den Kegelschnitte.

Eine andere Konstruktion folgt auch hier aus dem Pascalschen Satze.

Man schneide  $AD$  mit  $g$  in  $U$ ,  $a$  mit  $PU$  in  $V$  und  $g$  mit  $CV$  in  $B_1$ , so ist  $B_1$  der zweite Schnittpunkt von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

VIII. Ein Kegelschnitt ist durch vier Punkte  $ABCD$  und







ziehe durch  $qr$  die Gerade  $g$  nach  $G$ , mache  $mng$  harmonisch, so daß  $g$  und  $h$  zugeordnete Strahlen sind, verbinde  $G$




Fig. 148.

mit dem Schnittpunkte  $hp$  durch die Gerade  $i$ , so ist derjenige Strahl, welcher  $g$  und  $i$  harmonisch von  $a$  trennt, die zweite Tangente von  $G$  an den Kegelschnitt.

X. Ein Kegelschnitt ist durch vier Tangenten  $abcd$  und den Berührungspunkt  $A$  auf  $a$  gegeben; man soll die Berührungspunkte auf den übrigen Tangenten konstruieren.

Man bestimme zunächst das Poldreiseit  $pqr$  von  $abcd$ , verbinde die Ecke  $qr$  mit  $A$  durch die Gerade  $e$ , so ist der Schnittpunkt  $be$  der Berührungspunkt auf  $b$ ; denn der Punkt  $ap$  ist der Pol von  $e$ .

In gleicher Art findet man den Berührungspunkt auf  $c$ ,



indem man den Punkt  $pq$  mit  $A$  durch die Gerade  $f$  verbindet und  $c$  mit  $f$  schneidet.




Fig. 149.

Den Berührungspunkt auf  $d$  endlich erhält man, indem man die Ecke  $pr$  mit  $A$  durch die Gerade  $g$  verbindet und  $g$  mit  $d$  zum Durchschnitte bringt.

XI. Von einem Kegelschnitte kennt man vier Punkte  $ABCD$  und die Tangente  $a$  durch  $A$ ; man soll von einem Punkte  $G$  an den Kegelschnitt die Tangenten ziehen.

Dazu konstruiere man nach VIII. die Tangenten  $bcd$  in den Punkten  $BCD$  und verfare nach IX.

XII. Von einem Kegelschnitte kennt man vier Tangenten  $abcd$  und den Berührungspunkt  $A$  auf  $a$ ; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden bestimmen.

Zu dem Zwecke konstruiere man nach X. die Berührungspunkte  $BCD$  auf  $bcd$  und verfare nach VII.

XIII. Von einem Kegelschnitte kennt man drei Punkte  $ABC$  und die Tangenten  $a$  und  $b$  in  $A$  und  $B$ ; man soll seine Schnittpunkte mit einer Geraden  $g$  konstruieren.

$\alpha$ . Wenn man den Punkt  $C$  mit dem Schnittpunkte  $ab$  durch die Gerade  $c$  verbindet, so ist derjenige Punkt  $D$  dieser Geraden, welcher  $C$  von dem Punkte  $ab$  und der Geraden  $AB$  harmonisch trennt, ein Punkt des Kegelschnittes. Damit wäre die Aufgabe auf VIII. zurückgeführt.



$\beta$ . Die Konstruktion gestaltet sich aber etwas einfacher, wenn man zuerst in  $C$  die Tangente  $c$  mit Hilfe des Satzes von Pascal konstruiert. Dazu bestimme man die Schnittpunkte  $M$  von  $a$  und  $BC$ ,  $N$  von  $b$  und  $AC$ ,  $O$  von  $MN$  und  $AB$ , so ist  $OC$  die Tangente in  $C$ .

Darauf schneide man  $AB$  und  $BC$  mit  $g$  in  $G$  und  $G_1$ , mache  $ABGH$  und  $BCG_1H_1$  harmonisch, so daß  $GH$  und




Fig. 150.

$G_1H_1$  zugeordnete Punkte sind, verbinde  $H$  mit dem Schnittpunkte  $ab$  durch  $h$  und  $H_1$  mit dem Punkte  $bc$  durch  $h_1$ , schneide  $g$  mit  $h$  und  $h_1$  in  $J$  und  $J_1$  und konstruiere die beiden Punkte  $D$  und  $E$ , welche die Strecken  $GJ$  und  $G_1J_1$  harmonisch teilen, so sind es die Schnittpunkte von  $g$  mit dem Kegelschnitte.

XIV. Von einem Kegelschnitte kennt man drei Tangenten  $abc$  und die Berührungspunkte  $A$  und  $B$  auf  $a$  und  $b$ ; man soll an ihn die Tangenten von einem Punkte  $C$  legen.

$\alpha$ . Wenn man die Tangente  $c$  mit der Geraden  $AB$  in  $E$  schneidet, so ist diejenige Gerade  $d$  durch  $E$ , welche die Tangente  $c$  von der Geraden  $AB$  und derjenigen Geraden, welche  $E$  mit dem Schnittpunkte  $ab$  verbindet, eine Tangente



des Kegelschnittes. Dadurch ist die Aufgabe auf IX. zurückgeführt.




Fig 151.

β. Man gelangt schneller zum Ziele, wenn man zunächst mit Hilfe des Satzes von Brianchon den Berührungspunkt  $C$  von  $c$  konstruiert. Dies geschieht, indem man  $A$  mit dem Punkte  $bc$  durch die Gerade  $m$ ,  $B$  mit  $ac$  durch  $n$  und endlich den Punkt  $mn$  mit  $ab$  durch die Gerade  $o$  verbindet; diese trifft  $c$  im Berührungspunkte.

Darauf verbinde man  $G$  mit den Punkten  $ab$  und  $ac$  durch die Geraden  $g$  und  $g_1$  mache  $abgh$  und  $acg_1h_1$  harmonisch, so daß  $gh$  und  $g_1h_1$  zugeordnete Strahlen sind, schneide  $AB$  mit  $h$  in  $H$  und  $AC$  mit  $h_1$  in  $H_1$ , verbinde  $G$  mit  $H$  und  $H_1$  durch die Geraden  $i$  und  $i_1$ , so sind diejenigen Strahlen  $d$  und  $e$ , welche  $g$  und  $i$ , sowie  $g_1$  und  $i_1$  harmonisch trennen, die Tangenten von  $G$  an den Kegelschnitt.

Denn zunächst sind  $H$  und  $H_1$  die Pole von  $g$  und  $g_1$ , also  $g$  und  $i$  sowol wie  $g_1$  und  $i_1$  konjugierte Strahlen; daher sind die Strahlen, welche beide Strahlenpaare harmonisch trennen, Tangenten des Kegelschnittes.

XV. Wenn von einem Kegelschnitte drei Punkte  $ABC$  und die Tangenten  $a$  und  $b$  durch  $A$  und  $B$  gegeben sind, so soll man an ihn die Tangenten durch einen beliebigen Punkt legen.

Man konstruiere die Tangente  $c$  in  $C$  und führt die Aufgabe auf XIV. zurück.

XVI. Wenn von einem Kegelschnitte drei Tangenten  $abc$  und die Berührungspunkte  $A$  und  $B$  auf  $a$  und  $b$  gegeben sind, so soll man seine Schnittpunkte mit einer Geraden bestimmen.



Man konstruiere den Berührungspunkt  $C$  auf  $c$  und hat die Aufgabe auf XIII. zurückgeführt.

XVII. *Von einem Kegelschnitte kennt man zwei konjugierte Strahlen  $gg_1$  und auf jedem die Involution konjugierter Punkte.*

Die Involutionen auf  $g$  und  $g_1$  seien

$$A\mathfrak{A}, B\mathfrak{B}, C\mathfrak{C}, \dots \text{ und } A_1\mathfrak{A}_1, B_1\mathfrak{B}_1, C_1\mathfrak{C}_1, \dots$$

Ist  $G$  der Schnittpunkt von  $g$  und  $g_1$  und sind  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}_1$  die ihm involutorisch zugeordneten Punkte, so ist  $\mathfrak{G}\mathfrak{G}_1$  die Polare von  $G$ .

Ferner ist  $g$  die Polare von  $\mathfrak{G}_1$  und  $g_1$  diejenige von  $\mathfrak{G}$ .

Um zu einer beliebigen Geraden  $m$  den Pol zu konstruieren, schneide man sie mit  $g$  und  $g_1$  in  $M$  und  $M_1$ , konstruiere die involutorisch zugeordneten Punkte  $\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{M}_1$ , so sind  $\mathfrak{M}\mathfrak{G}_1$  und  $\mathfrak{M}_1\mathfrak{G}$  die Polaren von  $M$  und  $M_1$ ; sie schneiden sich im Pole  $M_0$  von  $m$ .

Einer der drei Punkte  $G\mathfrak{G}\mathfrak{G}_1$  liegt innerhalb des Kegelschnittes; es sei der Punkt  $G$ , dann muß die Gerade  $M_0G$  den Kegelschnitt schneiden. Man erhält die Schnittpunkte, wenn man  $M_0G$  mit  $\mathfrak{G}\mathfrak{G}_1$  in  $\mathfrak{G}_0$  und mit  $m$  in  $\mathfrak{M}_0$  schneidet und diejenigen Punkte konstruiert, welche  $G\mathfrak{G}_0$  und  $M_0\mathfrak{M}_0$  harmonisch teilen.

XVIII. *Von einem Kegelschnitte kennt man ein Poldreieck und auf einer Geraden die Involution konjugierter Punkte.*

Das Poldreieck sei  $PP_1P_2$ , die Involution konjugierter Punkte auf  $g$  sei  $A\mathfrak{A}, B\mathfrak{B}, C\mathfrak{C}, \dots$  die Seiten

$$PP_1, P_1P_2, P_2P$$

schneiden  $g$  in  $Q_2, Q, Q_1$ . Zu diesen Punkten seien involutorisch zugeordnet  $\mathfrak{Q}_2, \mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1$ .

Dann müssen die Polaren von  $\mathfrak{Q}_2\mathfrak{Q}\mathfrak{Q}_1$  bezüglich durch  $Q_2QQ_1$  aber auch durch  $P_2PP_1$  gehen, also sind

$$P_2Q_2, PQ, P_1Q_1 \text{ die Polaren von } \mathfrak{Q}_2, \mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1.$$

Liegt die Ecke  $P$  des Poldreiecks innerhalb des Kegelschnittes, so ziehe man  $P\mathfrak{Q}_2, P\mathfrak{Q}, P\mathfrak{Q}_1$  und erhält auf diesen



Geraden die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte als diejenigen Punkte, welche

$$P \text{ und } P_1P_2 \text{ sowie } \mathfrak{Q}_2 \text{ und } P_2Q_2$$

$$P \text{ und } P_1P_2 \text{ sowie } \mathfrak{Q} \text{ und } PQ$$

$$P \text{ und } P_1P_2 \text{ sowie } \mathfrak{Q}_1 \text{ und } P_1Q_1$$

harmonisch trennen.

XIX. *Von einem Kegelschnitte kennt man ein Poldreieck und ein Paar Pol und Polare.*

Es sei  $PP_1P_2$  das Poldreieck,  $A$  und  $a$  das Paar Pol und Polare. Man schneide  $a$  mit den Seiten

$$PP_1, P_1P_2, P_2P$$

$$\text{in} \quad Q_2, Q, Q_1$$

$$\text{dann sind} \quad AP_2, AP, AP_1$$

die Polaren dieser Punkte. Es liege  $P$  innerhalb des Kegelschnittes, dann müssen die Geraden  $PQ_1$  und  $PQ_2$  den Kegelschnitt treffen. Um auf der ersteren die Schnittpunkte mit dem Kegelschnitte zu finden, bestimme man ihre Schnittpunkte  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  mit  $AP_1$  und  $AP_2$  und konstruiere die Punkte

$$R_1 \text{ und } R_1', \text{ welche } PP_2 \text{ und } \mathfrak{P}_1Q_1$$

$$R_2 \text{ und } R_2', \text{ welche } PP_1 \text{ und } \mathfrak{P}_2Q_2$$

harmonisch teilen.

XX. *Von einem Kegelschnitte kennt man ein Poldreieck und zwei Punkte.* XVIII.

XXI. *Von einem Kegelschnitte kennt man ein Paar Pol und Polare,  $A$  und  $a$ , auf ihnen die Involutionen konjugierter Strahlen und Punkte und ein Paar konjugierter Punkte  $X$  und  $X_1$ .*

Die Gerade  $XX_1$  schneide  $a$  in  $Y$ ; zu  $Y$  sei  $Y'$  auf  $a$  der involutorisch zugeordnete Punkt, dann ist  $AY'$  die Polare von  $Y$ , diese schneidet  $XX_1$  in dem zu  $Y$  konjugierten Punkt  $Y_1$ .

Die drei Punkte  $AYY'$  bilden ein Poldreieck und da man aufer diesem noch die Involution konjugierter Punkte  $XX_1, YY_1, \dots$  kennt, so ist die Aufgabe auf XVIII. zurückgeführt.



XXII. *Von einem Kegelschnitte kennt man ein Paar konjugierter Punkte  $XX_1$  und zwei Paar Pol und Polare.*

$A$  und  $a$ , sowie  $A_1$  und  $a_1$  seien die beiden Paare Pol und Polare; die Polaren  $a$  und  $a_1$  schneiden sich in  $A_2$  und die Verbindungslinie von  $A$  und  $A_1$  ist  $a_2$ , dann sind auch  $A_2$  und  $a_2$  Pol und Polare. In  $A_2$  sind  $A_2A$  und  $a$  sowie  $A_2A_1$  und  $a_1$  je zwei konjugierte Strahlen, auf  $a_2$  sind ihre Schnittpunkte je zwei konjugierte Punkte, also ist die Aufgabe auf XXI. zurückgeführt.



## Dritter Abschnitt.

### Kegelschnittbüschel und Kegelschnittschar.

#### § 22.

Das Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten.

355. *Durch vier Punkte  $ABCD$  lassen sich einfach unendlich viele Kegelschnitte legen, d. h. so viele als es Punkte auf einer Geraden giebt. — Die Gesamtheit aller Kegelschnitte durch vier Punkte heißt ein „Kegelschnittbüschel“, mit den „Grundpunkten“  $ABCD$ . — Durch einen beliebigen Punkt geht ein einziger Kegelschnitt des Büschels.*

Nach 182. ist durch fünf Punkte ein einziger Kegelschnitt stets bestimmt, also lassen sich durch vier Punkte  $ABCD$  unendlich viele Kegelschnitte legen. Legt man durch einen der Grundpunkte z. B.  $A$  eine Gerade, so wird jeder Punkt derselben von einem Kegelschnitte des Büschels getroffen. Also hat dasselbe soviel Kegelschnitte, als die Gerade Punkte.

Man bezeichnet ein Büschel mit  $K(ABCD)$ .

356. *Die Kegelschnitte eines Büschels durch vier Punkte  $ABCD$  schneiden jede Gerade  $g$  in einer Involution, zu welcher auch die Paare von Schnittpunkten mit den Gegenseitenpaaren des Vierecks  $ABCD$  gehören. Diese sind daher als degenerierte Kegelschnitte des Büschels anzusehen.*

Ist  $K$  irgend ein Kegelschnitt des Büschels, so stelle man eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher demselben ein Kreis verwandt ist (176). Dem Vierecke  $ABCD$  ist ein Viereck  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  und der Geraden  $g$  eine Gerade  $\mathfrak{g}$  verwandt. Letztere wird von dem Kreise  $\mathfrak{K}$  und den Gegenseitenpaaren des Vierecks  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  in einer Involution geschnitten (98), also



muss  $g$  durch  $K$  und die Gegenseitenpaare von  $ABCD$  auch in einer Involution geschnitten werden (79f.). Da letztere aber durch die Schnittpunkte mit den Gegenseitenpaaren bestimmt ist, so folgt sofort, dass die Schnittpunkte von  $g$  mit einem beliebigen Kegelschnitte ihr angehören.

357. *Unter allen Kegelschnitten eines Büschels giebt es höchstens zwei, welche eine Gerade  $g$  berühren.*

Die Involution, in welcher  $g$  von den Kegelschnitten getroffen wird, hat zwei Doppelpunkte. Durch diese gehen zwei Kegelschnitte des Büschels und diese müssen  $g$  berühren.

358. *Die Polaren eines Punktes  $P$  in Bezug auf alle Kegelschnitte eines Büschels schneiden sich in einem Punkte  $Q$ ;  $P$  und  $Q$  heißen konjugierte Punkte bezüglich des Büschels.*

Die Polaren von  $P$  in Bezug auf zwei Kegelschnitte des Büschels mögen sich in einem Punkte  $Q$  schneiden; die Gerade  $PQ$  wird von allen Kegelschnitten des Büschels in einer Involution getroffen, deren Doppelpunkte  $P$  und  $Q$  sind. Diese Punkte werden also durch jeden Kegelschnitt und durch die Gegenseitenpaare des Vierecks der Grundpunkte harmonisch getrennt (36g), also treffen sich sämtliche Polaren von  $P$  in  $Q$ .

359. *Die Schnittpunkte der Gegenseitenpaare des Vierecks der Grundpunkte bilden ein Poldreieck für alle Kegelschnitte.*  
128. 358.

360. *Die Pole einer Geraden  $g$  bezüglich der Kegelschnitte eines Büschels liegen auf einem Kegelschnitte, dem „Polarkegelschnitte“ der Geraden. Dieser geht durch die Ecken des gemeinschaftlichen Poldreiecks und enthält die konjugierten Punkte aller Punkte der Geraden.*

Auf  $g$  seien  $HJKL$  vier harmonische Punkte; die Polaren derselben in Bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt  $K$  des Büschels sind vier harmonische Strahlen, die sich im Pole  $P$  von  $g$  bezüglich  $K$  treffen. Die Polaren eines jeden dieser Punkte bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels schneiden sich im konjugierten Punkte. Sind  $H'J'K'L'$  die konjugierten Punkte zu  $HJKL$ , so gehen die Polaren von  $HJKL$  in Bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt des Büschels durch  $H'J'K'L'$ . Der Ort des Scheitels eines harmonischen Strahlenbüschels,



dessen Strahlen durch vier feste Punkte gehen, ist aber ein Kegelschnitt (188); mithin liegen die Pole von  $g$  bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ .




Fig. 152.

Sind  $ABCD$  die Grundpunkte,  $EFG$  die Ecken des Poldreiecks, so geht durch den Punkt  $E$  kein wirklicher Kegelschnitt des Büschels. Man hat das durch  $E$  gehende Gegenseitenpaar als einen Kegelschnitt desselben anzusehen.

*Es giebt also in einem Büschel mit vier reellen Grundpunkten drei in Geradenpaare degenerierte Kegelschnitte, deren Scheitel die Ecken des gemeinschaftlichen Poldreiecks  $EFG$  sind.*

Diese Ecken sind also bezüglich der durch sie gehenden Geradenpaare die Pole von  $g$ ; also geht der Polarkegelschnitt  $\mathfrak{K}$  von  $g$  bezüglich des Büschels durch die Ecken des gemeinschaftlichen Poldreiecks.

Dieses folgt auch daraus, daß jede Seite dieses Poldreiecks die gemeinschaftliche Polare ihrer Gegenecke bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels ist. Denn schneidet  $g$  die Seite  $FG$  in  $E_1$ , so müssen die Polaren von  $E_1$  bezüglich der Kegelschnitte des Büschels sich in  $E$  schneiden; es sind also  $E$  und  $E_1$  konjugierte Punkte in Bezug auf das Büschel und da der Polarkegelschnitt  $\mathfrak{K}$  von  $g$  der Ort der den Punkten von  $g$  bezüglich des Büschels konjugierten Punkte ist, so muß  $E$  auf  $\mathfrak{K}$  liegen. In gleicher Weise ergibt sich, daß auch  $F$  und  $G$  Punkte von  $\mathfrak{K}$  sind.

Die Gerade  $g$  schneide die Gerade  $EA$ , d. i. den einen Teil des Geradenpaares in  $E$ , welches zu den Kegelschnitten des Büschels gehört, in  $M$ ; es müssen sich die Polaren von



$M$  bezüglich der beiden anderen Geradenpaare und daher bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels in  $M'$  auf  $EA$  schneiden, so daß  $MM'AB$  harmonische Punkte sind. Somit folgt:

*Der Polarkegelschnitt von  $g$  geht durch die Punkte, welche  $g$  von den Eckenpaaren harmonisch trennen.*

361. *Die Berührungspunkte der Tangenten, welche sich aus einem Punkte  $P$  einer gemeinschaftlichen Sehne  $AB$  eines Kegelschnittbüschels  $K(ABCD)$  an die Kegelschnitte desselben ziehen lassen, liegen auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , welcher die Geraden  $PC$  und  $PD$  in  $C$  und  $D$  berührt und durch die Punkte  $E$  und  $F$  geht, in denen sich die Geraden  $AC$ ,  $BD$  und  $AD$ ,  $BC$  schneiden. — Wenn  $P$  die Sehne  $AB$  durchläuft, so durchläuft  $\mathfrak{K}$  die Kegelschnitte des Büschels  $\mathfrak{K}(CDEF)$ .*

Es sei  $K(ABCD)$  ein Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten; die drei Geradenpaare desselben schneiden sich in  $E$ ,  $F$ ,  $G$ . Die Punkte  $CDEF$  und  $ABEF$  bilden die Grundpunkte zweier Kegelschnittbüschel  $\mathfrak{K}(CDEF)$  und  $\mathfrak{K}'(ABEF)$ . Von einem Punkte  $P$  auf  $AB$  zieht man die Tangenten  $PT$  und  $PT_1$  an einen Kegelschnitt  $K$ , so sind  $C(ABTT_1)$  und  $D(BATT_1)$  je vier harmonische Strahlen. Die Strahlen  $CA$  und  $DB$ ,  $CB$  und  $DA$  schneiden sich in  $E$  und  $F$ ; also liegen  $CDEFTT_1$  auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , dem geometrischen Orte des Scheitels eines harmonischen Büschels, dessen Strahlen durch  $EFTT_1$  gehen (188). Da  $C(EFTT_1)$  vier harmonische Sehnen des Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$  und  $CE$ ,  $CF$  zugeordnet sind, so muß der Pol von  $EF$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  auf  $TT_1$  liegen; dieser Pol liegt aber auch auf  $AB$ , denn  $AB$  ist die Polare des Schnittpunktes  $H$  von  $CD$  und  $EF$ , folglich ist der Schnittpunkt  $P_1$  von  $AB$  und  $TT_1$  der Pol von  $EF$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  und daher sind  $P_1E$  und  $P_1F$  Tangenten an  $\mathfrak{K}$ . Weil  $TT_1$  die Polare von  $P$  bezüglich  $K$  ist, so sind  $PP_1AB$  harmonisch, also  $PP_1$  konjugierte Punkte für  $K$ . Deshalb müssen  $PC$  und  $PD$  Tangenten an  $\mathfrak{K}$  sein (138). Wählt man irgend einen anderen Kegelschnitt aus dem Büschel  $K(ABCD)$  und zieht an ihn von  $P$  die Tangenten, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte, welcher durch  $E$  und  $F$  geht und  $PC$  und  $PD$  in  $C$  und  $D$  berührt, also mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfällt. Deshalb liegen sämtliche Berührungspunkte der von  $P$  an die



Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$  gezogenen Tangenten auf dem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ . Wenn  $P$  die Sehne  $AB$  durchläuft, so durchläuft  $\mathfrak{K}$  die Kegelschnitte eines Büschels mit den Grundpunkten  $CDEF$ . Die beiden Büschel  $K(ABCD)$  und  $\mathfrak{K}(CDEF)$  nennt man *konjugierte Kegelschnittbüschel*.

362. Der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  steht zu den Kegelschnitten des Büschels  $K(ABCD)$  in der Beziehung, daß jede durch  $P$  gezogene Gerade  $g$  von  $\mathfrak{K}$  und einem Kegelschnitte  $K$  in solchen vier harmonischen Punkten geschnitten wird, daß die Schnittpunkte  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  mit  $\mathfrak{K}$  sowohl wie  $SS_1$  mit  $K$  zugeordnete Punkte sind. Denn die Gerade  $g$  wird in ihren Schnittpunkten mit  $\mathfrak{K}$  von zwei Kegelschnitten des Büschels  $K(ABCD)$  berührt und diese Punkte sind daher die Doppelpunkte derjenigen Involution, in welcher  $g$  von den Kegelschnitten des Büschels getroffen wird. Da  $EFTT_1$  vier harmonische Punkte von  $\mathfrak{K}$  sind, so muß der Pol  $\mathfrak{P}$  von  $TT_1$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  auf  $EF$  liegen. Zieht man aber von  $\mathfrak{P}$  auf  $EF$  die Tangenten an die Kegelschnitte des Büschels  $\mathfrak{K}(CDEF)$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $K$  des Büschels  $K(ABCD)$  und somit wird auch jede durch  $\mathfrak{P}$  gezogene Gerade von  $K$  und jedem Kegelschnitte des Büschels  $\mathfrak{K}(CDEF)$  in vier harmonischen Punkten geschnitten.

Wenn die Gerade  $g$  den Kegelschnitt  $K$  nicht trifft, so trifft sie doch andere Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$ , welche sämtlich die Punkte  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  harmonisch trennen. In Bezug auf diese müssen die Polaren von  $\mathfrak{S}$  durch  $\mathfrak{S}_1$  gehen; da aber die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle Kegelschnitte eines Büschels sich in einem Punkte schneiden, so muß auch die Polare von  $\mathfrak{S}$  in Bezug auf  $K$  durch  $\mathfrak{S}_1$  gehen und  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  sind konjugierte Punkte in Bezug auf  $K$  und alle Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$ . Also:

*Die Endpunkte jeder durch  $P$  in  $\mathfrak{K}$  gezogenen Sehne sind konjugierte Punkte in Bezug auf alle Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$ ; der Pol  $\mathfrak{P}$  einer Berührungssehne  $TT_1$  des Punktes  $P$  in Bezug auf den Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  liegt auf  $EF$  und es sind die Endpunkte jeder durch  $\mathfrak{P}$  in  $K$  gezogenen Sehne konjugierte Punkte in Bezug auf  $\mathfrak{K}$  und alle Kegelschnitte des Büschels  $\mathfrak{K}(CDEF)$ .*



Um das letzte Resultat kurz auszudrücken, soll die Beziehung, in welcher die Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $K$  stehen, als *harmonische Beziehung* bezeichnet werden; die Punkte  $P$  und  $\mathfrak{P}$  sollen *Pole* der harmonischen Beziehung heißen, sie sind die Pole der gemeinschaftlichen Sekante  $CD$  bezüglich beider Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$ .

*Es stehen also zwei Kegelschnitte in harmonischer Beziehung, wenn jede Gerade, welche durch einen der Pole der Verbindungslinie zweier reellen Schnittpunkte gezogen wird, von den Kegelschnitten in harmonischen und zwar von jedem in zugeordneten Punkten geschnitten wird.*

363. Zieht man von  $P_1$  an die Kegelschnitte des Büschels  $\mathfrak{K}(ABEF)$  die Tangenten, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte durch  $CDEF$ , der in  $E$  und  $F$  die Geraden  $EP_1$  und  $FP_1$  berührt und deshalb mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfällt.

Wenn man aber von  $P_1$  an die Kegelschnitte  $K(ABCD)$  die Tangenten zieht, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}_1$  des Büschels  $\mathfrak{K}(CDEF)$ ; dieser berührt die Geraden  $P_1C$  und  $P_1D$  in  $C$  und  $D$  und geht durch die Punkte  $E$  und  $F$ .

Durch  $P$  sei  $g$  eine beliebige Gerade; sie wird von den Kegelschnitten des Büschels  $K(ABCD)$  in einer Involution geschnitten, deren Doppelpunkte  $M$  und  $N$  die Schnittpunkte mit  $\mathfrak{K}$  sein müssen, da in ihnen  $g$  von zwei Kegelschnitten des Büschels  $K(ABCD)$  berührt wird.

Trifft  $g$  den Kegelschnitt  $\mathfrak{K}_1$  in  $M_1$  und  $N_1$ , so sind  $M_1N_1EF$  harmonisch, da  $EF$  die Polare von  $P$  bezüglich  $\mathfrak{K}_1$  ist, also sind die Büschel  $C(M_1N_1EF)$  und  $D(M_1N_1FE)$  harmonisch und die Punkte  $ABCDM_1N_1$  liegen auf einem Kegelschnitte, denn  $CE$  und  $DF$  schneiden sich in  $A$ ,  $CF$  und  $DE$  in  $B$  (188). Da dieser Kegelschnitt dem Büschel  $K(ABCD)$  angehört, so sind  $M_1N_1$  durch die Punkte  $MN$  harmonisch getrennt. Also:

*Sind  $P$  und  $P_1$  zwei konjugierte Punkte auf einer gemeinschaftlichen Sekante  $AB$  und zieht man von ihnen Tangenten an die Kegelschnitte der Büschel  $K(ABCD)$  und  $\mathfrak{K}(ABEF)$ , so liegen die Berührungspunkte auf demselben Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ . Zieht*



man aber von  $P_1$  die Tangenten an die Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem anderen Kegelschnitte  $\mathfrak{K}_1$ . Die Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  stehen in der Beziehung zu einander, daß jede durch  $P$  oder  $P_1$  gelegte Gerade von beiden in vier harmonischen Punkten, und zwar von jedem in zugeordneten Punkten geschnitten wird.

364. Wenn drei Kegelschnitte sich in denselben beiden Punkten  $A$  und  $B$  schneiden, so treffen sich ihre drei übrigen gemeinschaftlichen Sekanten in einem Punkte. Zieht man von diesem die Tangenten, so liegen die sechs Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte, der durch  $A$  und  $B$  geht.

Die drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  schneiden sich in den beiden Punkten  $A$  und  $B$ ; es seien ferner  $D_3E_3$  die Schnittpunkte von  $C_1C_2$ ,  $D_2E_2$  diejenigen von  $C_1C_3$ ,  $D_1E_1$  diejenigen von  $C_2C_3$ . Von dem Schnittpunkte  $P$  der Sekanten  $D_1E_1$  und  $D_2E_2$  ziehe man Tangenten an  $C_1C_2C_3$ , deren Berührungspunkte  $B_1B_1'$ ,  $B_2B_2'$ ,  $B_3B_3'$  sein mögen. Nach 362. liegen  $B_2B_2'B_3B_3'$  und  $B_1B_1'B_3B_3'$  je auf einem Kegelschnitte, welcher die Geraden  $PA$  und  $PB$  in  $A$  und  $B$  berührt; deshalb fallen beide Kegelschnitte in einen  $\pi$  zusammen. Jede Gerade  $g$  durch  $P$  wird von  $\pi$  in zwei Punkten geschnitten, welche durch jeden der Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  harmonisch getrennt werden (362), also auch die Gerade, welche  $P$  mit einem der Schnittpunkte  $D_3E_3$  z. B.  $D_3$  von  $C_1C_2$  verbindet. Diese werde von  $\pi$  in  $Q$  und  $R$ , von  $C_1$  in  $D_3$  und  $S_1$ , von  $C_2$  in  $D_3$  und  $S_2$  geschnitten; da nun  $QRD_3S_1$  und  $QRD_3S_2$  harmonisch sind, so müssen  $S_1$  und  $S_2$  mit  $E_3$  zusammenfallen, also liegt  $P$  auch auf  $D_3E_3$ .

### § 23.

#### Die Kegelschnittschar mit vier reellen Tangenten.

365. An vier Gerade lassen sich einfach unendlich viele Berührungskegelschnitte legen, d. h. soviel, als es Strahlen durch einen Punkt giebt. — Die Gesamtheit aller Kegelschnitte mit vier gemeinschaftlichen Tangenten heißt eine Kegelschnittschar. — Eine beliebige Gerade wird von einem einzigen Kegelschnitte der Schar berührt.

Nach 183. ist durch fünf Tangenten ein einziger Kegel-



schnitt bestimmt, also lassen sich an vier Tangenten  $abcd$  unendlich viele Kegelschnitte legen, deren Gesamtheit „Kegelschnittschar“ heißt. Zieht man durch einen beliebigen Punkt einer Tangente die Geraden eines Büschels, so wird jede Gerade von einem Kegelschnitte der Schar berührt.

366. *Die Tangenten von einem Punkte  $P$  an die Kegelschnitte einer Schar mit vier gemeinschaftlichen Tangenten  $abcd$  und die Geraden, welche  $P$  mit den Gegeneckenpaaren des vollständigen Vierseits  $abcd$  verbinden, bilden eine Involution.*

Ist  $K$  irgend ein Kegelschnitt der Schar, so stelle man eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher demselben ein Kreis  $\mathfrak{K}$  verwandt ist (176). Dem Vierseite  $abcd$  ist ein anderes  $a'b'c'd'$  und dem Punkte  $P$  ein anderer  $\mathfrak{P}$  verwandt. Die Tangenten von  $\mathfrak{P}$  an  $\mathfrak{K}$  und die Geraden, welche  $\mathfrak{P}$  mit den Gegeneckenpaaren des vollständigen Vierseits  $abcd$  verbinden, sind nach 98a. Strahlenpaare einer Involution, also sind auch nach den Gesetzen der Verwandtschaft (79f) die Tangenten von  $P$  an  $K$  und die Geraden, welche  $P$  mit den Gegeneckenpaaren des vollständigen Vierseits  $abcd$  verbinden, in Involution. Diese wird aber schon durch die Verbindungslinien mit den Gegeneckenpaaren bestimmt; ihr gehören also die Tangenten von  $P$  an einen beliebigen Kegelschnitt der Schar an.

367. *Durch einen beliebigen Punkt  $P$  gehen höchstens zwei Kegelschnitte der Schar.*

Die Tangenteninvolution des Punktes  $P$  hat zwei Doppelstrahlen. In jedem fallen zwei Tangenten von  $P$  an einen Kegelschnitt der Schar zusammen; dieser geht also durch  $P$ .

368. *Die Pole einer Geraden  $p$  in Bezug auf die Kegelschnitte einer Schar liegen auf einer Geraden  $q$ ;  $p$  und  $q$  heißen konjugierte Gerade bezüglich der Schar.*

Die Pole von  $p$  bezüglich zweier Kegelschnitte der Schar mögen auf der Geraden  $q$  liegen; die Tangenten durch den Schnittpunkt  $pq$  bilden eine Involution, deren Doppelstrahlen  $p$  und  $q$  sind. Sie werden also durch jeden Kegelschnitt und die Gegeneckenpaare des Vierseits der gemeinschaftlichen Tangenten harmonisch getrennt, also liegen sämtliche Pole von  $p$  auf  $q$ .



369. *Die Mittelpunkte aller Kegelschnitte einer Schar liegen auf einer Geraden.*

Denn sie sind die Pole der unendlich fernen Geraden. 368.

370. *Die Verbindungsgeraden der Gegeneckenpaare des Vierecks der gemeinschaftlichen Tangenten bilden ein Poldreiseit für alle Kegelschnitte.* 368.

371. *Die Polaren eines Punktes  $P$  bezüglich der Kegelschnitte einer Schar umhüllen einen Kegelschnitt, den „Polarkegelschnitt“ des Punktes  $P$ . Dieser berührt die Seiten des gemeinschaftlichen Poldreiseits und hat die konjugierten Geraden aller Geraden durch  $P$  zu Tangenten.*

Durch  $P$  seien  $hikl$  vier harmonische Strahlen, die Pole derselben in Bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt  $K$  des Büschels sind vier harmonische Punkte, welche auf der Polare  $g$  von  $P$  bezüglich  $K$  liegen. Die Pole einer jeden dieser vier Geraden bezüglich aller Kegelschnitte der Schar liegen auf der konjugierten Geraden. Sind  $h'ik'l'$  die vier konjugierten Geraden zu  $hikl$  bezüglich der Schar, so liegen die Pole von  $hikl$  in Bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt der Schar auf  $h'ik'l'$ . Alle Geraden aber, welche vier feste Gerade in harmonischen Punkten schneiden, umhüllen einen Kegelschnitt (189); mithin sind alle den Geraden durch  $P$  konjugierte Gerade Tangenten eines Kegelschnittes.

Sind  $abcd$  die vier gemeinschaftlichen Tangenten,  $efg$  die Seiten des Poldreiseits, so berührt die Gerade  $e$  kein wirklicher Kegelschnitt der Schar. Man hat das aufliegende Gegeneckenpaar als einen Kegelschnitt anzusehen.

*Es giebt also in einer Schar mit vier gemeinschaftlichen Tangenten drei in Punktpaare degenerierte Kegelschnitte, deren Verbindungslinien die Seiten des gemeinschaftlichen Poldreiseits sind.*

Diese Seiten sind also bezüglich der auf ihnen liegenden Punktpaare die Polaren von  $P$ , also berührt der Polarkegelschnitt von  $P$  die Seiten des gemeinschaftlichen Poldreiseits.

Letzteres folgt auch daraus, daß jede Ecke dieses Poldreiseits der gemeinschaftliche Pol ihrer Gegenseite bezüglich aller Kegelschnitte der Schar ist. Denn ist  $e_1$  die Verbindungsgerade des Punktes  $fg$  mit  $P$ , so müssen die Pole von  $e_1$  bezüglich der Kegelschnitte der Schar auf  $e$  liegen; es sind also



$e$  und  $e_1$  konjugierte Gerade in Bezug auf die Schar und da der Polarkegelschnitt  $\mathfrak{K}$  von  $P$  der Ort der den Strahlen von  $P$  bezüglich der Schar konjugierten Geraden ist, so muß  $e$  eine Tangente von  $\mathfrak{K}$  sein. In gleicher Weise ergibt sich, daß auch  $f$  und  $g$  Tangenten dieses Kegelschnittes sind.

372. Zieht man durch einen Schnittpunkt zweier gemeinschaftlichen Tangenten  $a$  und  $b$  einer Schar eine Gerade  $p$ , so umhüllen die Tangenten in ihren Schnittpunkten mit den Kegelschnitten der Schar einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ , welcher die gemeinschaftlichen Tangenten  $c$  und  $d$  in ihren Schnittpunkten mit  $p$  berührt und die Geraden  $e$  und  $f$  zu Tangenten hat, welche die Schnittpunkte  $ac$ ,  $bd$  und  $ad$ ,  $bc$  verbinden. — Wenn  $p$  sich um  $ab$  dreht, so durchläuft  $\mathfrak{K}$  die Kegelschnitte der Schar  $\mathfrak{K}(cdef)$ .

Es sei  $K(abcd)$  eine Kegelschnittschar mit vier gemeinschaftlichen Tangenten  $abcd$ ; die drei Punktpaare derselben liegen auf den Seiten  $efg$  des gemeinschaftlichen Poldreiecks. Die Geraden  $cdef$  und  $abef$  konstituieren zwei neue Kegelschnittscharen  $\mathfrak{K}(cdef)$  und  $\mathfrak{K}'(abef)$ . Einen Kegelschnitt  $K$  der Schar  $K(abcd)$  schneide man mit einer Geraden  $p$ , welche durch  $ab$  geht, und ziehe in den Schnittpunkten die Tangenten  $t$  und  $t_1$ , so sind  $c(abtt_1)$  und  $d(batt_1)$  je vier harmonische Punkte. Die Punkte  $ca$  und  $db$ ,  $cb$  und  $da$  liegen auf  $e$  und  $f$ , also sind  $cdeftt_1$  Tangenten eines Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$ , welcher der Ort derjenigen Geraden ist, die von  $eftt_1$  harmonisch geschnitten werden (189). Da  $c(eftt_1)$  vier harmonische Punkte einer Tangente von  $\mathfrak{K}$  und  $ce$ ,  $cf$  einander zugeordnet sind, so muß die Polare von  $ef$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  durch  $tt_1$  gehen; dieselbe geht aber auch durch  $ab$ , denn  $ab$  ist der Pol der Geraden  $h$ , welche die Punkte  $cd$  und  $ef$  verbindet, folglich ist die Gerade  $p_1$ , welche  $ab$  und  $tt_1$  verbindet, die Polare von  $ef$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  und daher sind  $p_1e$  und  $p_1f$  Punkte von  $\mathfrak{K}$ . Weil  $tt_1$  der Pol von  $p$  bezüglich  $K$  ist, so sind  $pp_1ab$  harmonisch, also  $pp_1$  konjugierte Strahlen für  $K$ . Deshalb müssen  $pc$  und  $pd$  Punkte von  $\mathfrak{K}$  sein (139).

Wählt man irgend einen anderen Kegelschnitt aus der Schar  $K(abcd)$  und zieht in seinen Schnittpunkten mit  $p$  die Tangenten an ihn, so berühren diese einen Kegelschnitt,



welcher  $e$  und  $f$  zu Tangenten hat und die Geraden  $c$  und  $d$  in den Punkten  $pc$  und  $pd$  berührt, also mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfällt.

Deshalb berühren die Tangenten in allen Schnittpunkten von  $p$  mit den Kegelschnitten der Schar  $K(abcd)$  den Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ .

373. Zieht man von einem beliebigen Punkte  $G$  von  $p$  Tangenten  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  an  $\mathfrak{K}$  und  $ss_1$  an einen Kegelschnitt der Schar  $K(abcd)$ , so sind  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  und  $ss_1$  je zwei zugeordnete Strahlen eines harmonischen Büschels. Denn durch den Punkt  $G$  gehen diejenigen beiden Kegelschnitte der Schar, welche in ihm die Tangenten  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  berühren, also sind diese die Doppelstrahlen der Tangenteninvolution durch  $G$ . Da  $eftt_1$  vier harmonische Tangenten von  $\mathfrak{K}$  sind, so muß die Polare  $p$  von  $tt_1$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  durch  $ef$  gehen. Schneidet man aber mit  $p$  die Kegelschnitte der Schar  $\mathfrak{K}(cdef)$ , so berühren die Tangenten in den Schnittpunkten einen Kegelschnitt der Schar  $K(abcd)$  und somit sind auch die Tangenten von einem beliebigen Punkte von  $p$  an  $K$  und irgend einen Kegelschnitt der Schar  $\mathfrak{K}(cdef)$  harmonisch.

Wenn  $G$  innerhalb des Kegelschnittes  $K$  liegt und sich von ihm also keine Tangenten an  $K$  ziehen lassen, so lassen sich doch an andere Kegelschnitte der Schar  $K(abcd)$  Tangenten ziehen, welche sämtlich durch  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  harmonisch getrennt werden. In Bezug auf diese Kegelschnitte müssen die Pole von  $\mathfrak{s}$  auf  $\mathfrak{s}_1$  liegen; da aber die Pole einer Geraden in Bezug auf alle Kegelschnitte einer Schar auf einer Geraden liegen, so muß auch der Pol von  $\mathfrak{s}$  bezüglich  $K$  auf  $\mathfrak{s}_1$  liegen und es sind  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  konjugierte Gerade in Bezug auf  $K$  und alle Kegelschnitte der Schar  $K(abcd)$ . Also:

*Zieht man von irgend einem Punkte  $G$  der Geraden  $p$  Tangenten  $\mathfrak{s}\mathfrak{s}_1$  an  $\mathfrak{K}$ , so sind dieselben konjugiert in Bezug auf alle Kegelschnitte der Schar  $K(abcd)$ ; die Polare  $p$  des Schnittpunktes  $tt_1$  zweier Tangenten eines Kegelschnittes  $K$  in denjenigen Punkten, in denen  $K$  von  $p$  getroffen wird, bezüglich  $\mathfrak{K}$  geht durch  $ef$  und es sind die Tangenten von irgend einem Punkte der Geraden  $p$  an den Kegelschnitt  $K$  konjugierte Strahlen in Bezug auf  $\mathfrak{K}$  und alle Kegelschnitte der Schar  $\mathfrak{K}(cdef)$ .*



Die Beziehung zwischen den Kegelschnitten  $K$  und  $\mathfrak{K}$  heie harmonische Beziehung; die Geraden  $p$  und  $p_1$  seien zugeordnete Gerade in derselben; sie sind die Polaren eines Schnittpunktes gemeinschaftlicher Tangenten von  $K$  und  $\mathfrak{K}$ .

*Zwei Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$  stehen also in harmonischer Beziehung, wenn die Tangenten an einen von einem Punkte einer Polare eines Schnittpunktes gemeinschaftlicher Tangenten durch die Tangenten an den anderen harmonisch getrennt werden.*

374. Schneidet man die Kegelschnitte der Schar  $\mathfrak{K}'(abef)$  mit  $p_1$ , so umhllen die Tangenten in den Schnittpunkten einen Kegelschnitt, welcher die Geraden  $cdef$  berhrt und durch die Punkte  $cp_1$  und  $fp_1$  geht und daher mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfllt.

Wenn man aber mit  $p_1$  die Kegelschnitte der Schar  $K(abcd)$  schneidet und in den Schnittpunkten die Tangenten zieht, so berhren sie einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}_1$  der Schar  $\mathfrak{K}(adef)$ ; dieser berhrt  $c$  und  $d$  in den Punkten  $cp_1$  und  $dp_1$ , und berhrt  $e$  und  $f$ .

Auf  $p$  sei  $G$  ein beliebiger Punkt, dessen Tangenten an die Kegelschnitte der Schar  $K(abcd)$  eine Involution bilden. Die Doppelstrahlen  $m$  und  $n$  der letzteren sind Tangenten von  $\mathfrak{K}$ , da sie in  $G$  von zwei Kegelschnitten der Schar berhrt werden.

Sind  $m_1$  und  $n_1$  die Tangenten von  $G$  an  $\mathfrak{K}_1$ , so sind  $m_1n_1ef$  harmonisch, da  $ef$  der Pol von  $p$  bezglich  $\mathfrak{K}_1$  ist, also sind die Punktreihen  $c(m_1n_1ef)$  und  $d(m_1n_1ef)$  harmonisch und die Geraden  $abcdn_1m_1$  umhllen einen Kegelschnitt. Denn die Punkte  $ce$  und  $df$  liegen auf  $a$ ,  $cf$  und  $de$  auf  $b$  (189.). Da dieser Kegelschnitt der Schar  $K(abcd)$  angehrt, so sind  $m_1n_1$  durch  $mn$  harmonisch getrennt. Also:

*Sind  $p$  und  $p_1$  zwei konjugierte Strahlen durch einen Schnittpunkt  $ab$  zweier gemeinschaftlichen Tangenten der Schar  $K(abcd)$  und schneidet man sie mit den Kegelschnitten der Scharen  $K(abcd)$  und  $\mathfrak{K}'(abef)$ , so umhllen die Tangenten in den Schnittpunkten denselben Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ . Zieht man aber in den Schnittpunkten von  $p_1$  mit den Kegelschnitten der Schar  $K(abcd)$  Tangenten, so umhllen dieselben einen anderen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}_1$ . Die Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  stehen in der Beziehung zu einander, da die von einem Punkte auf  $p$  oder  $p_1$  an  $\mathfrak{K}$  gelegten Tangenten durch die an  $\mathfrak{K}_1$  gelegten harmonisch getrennt werden.*



375. Wenn drei Kegelschnitte dieselben beiden Tangenten  $a$  und  $b$  haben und demselben Winkel eingeschrieben sind, so liegen die drei übrigen Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten auf einer Geraden. Zieht man in ihren Schnittpunkten mit dem Kegelschnitte Tangenten, so umhüllen sie einen Kegelschnitt, der auch  $a$  und  $b$  berührt.

Die drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  berühren in demselben Winkel die Geraden  $a$  und  $b$ ; es seien  $d_3e_3$ ,  $d_2e_2$ ,  $d_1e_1$  die gemeinschaftlichen Tangenten von  $C_1C_2$ ,  $C_1C_3$ ,  $C_2C_3$ . Mit der Verbindungslinie  $p$  der Punkte  $d_1e_1$  und  $d_2e_2$  schneide man die drei Kegelschnitte und ziehe in ihnen die Tangenten  $b_1b'_1$ ,  $b_2b'_2$ ,  $b_3b'_3$ . Nach 372. liegen  $b_2b'_2b_3b'_3$  und  $b_1b'_1b_3b'_3$  je auf einem Kegelschnitte, welcher  $a$  und  $b$  in  $pa$  und  $pb$  berührt; deshalb fallen beide Kegelschnitte in einen  $\pi$  zusammen. Von jedem Punkte  $G$  auf  $p$  lassen sich an  $\pi$  zwei Tangenten ziehen, welche durch jeden der Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  harmonisch getrennt werden (373.), also auch von dem Punkte, in welchen  $p$  von einer der Geraden  $d_3e_3$  z. B.  $d_3$  geschnitten wird. Die Tangenten von ihm an  $\pi$  seien  $q$  und  $r$ , an  $C_1$  und  $C_2$  seien sie bezüglich  $d_3$  und  $s_1$ ,  $d_3$  und  $s_2$ . Da nun  $qrd_3s_1$  und  $qrd_3s_2$  harmonisch sind, so müssen  $s_1$  und  $s_2$  mit  $e_3$  zusammenfallen, also geht  $p$  durch  $d_3e_3$ .

## § 24.

### Gemeinschaftliche Punkte und Tangenten.

376. Wenn drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  durch dieselben beiden Punkte  $A$  und  $B$  gehen, so liegen viermal drei der Durchschnittspunkte ihrer gemeinschaftlichen Tangenten je auf einer Geraden.

Die Tangenten in  $A$  und  $B$  an  $C_1C_2C_3$  schneiden sich in  $B_1B_2B_3$ ; die Verbindungslinien dieser Punkte seien  $x_1 = B_2B_3$ ,  $x_2 = B_1B_3$ ,  $x_3 = B_1B_2$ . Ferner seien  $r_1s_1t_1u_1$  die gemeinschaftlichen Tangenten von  $C_2C_3$ ,  $r_2s_2t_2u_2$  diejenigen von  $C_1C_3$  und endlich  $r_3s_3t_3u_3$  diejenigen von  $C_1C_2$ , dann sind die Punkte  $x_1(x_2x_3r_1t_1)$ ,  $x_2(x_1x_3r_2t_2)$  und  $x_3(x_1x_2r_3t_3)$  harmonisch. Denn  $x_1$  ist eine Seite des Poldreiecks von  $C_2C_3$ ; auf ihr liegen zwei Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten,  $G_{23}G'_{23}$ ; daher sind  $A(B_2B_3G_{23}G'_{23})$  harmonisch. 366. 36 g. Die Verbindungslinien der Punkte  $(x_3r_3)$  und  $(x_3t_3)$  mit  $(r_2s_2)$  seien



$\beta$  und  $\beta'$ , diejenigen von  $(x_1 r_1)$  und  $(x_1 t_1)$  mit  $(r_2 s_2)$  seien  $\gamma$  und  $\gamma'$  und die Tangenten von  $(r_2 s_2)$  an  $C_2$  seien  $vv'$ , dann sind die Geraden  $\beta\beta'vv'r_2s_2$  und  $\gamma\gamma'vv'r_2s_2$  in Involution, weil die Tangenten von einem Punkte an zwei Kegelschnitte und seine Verbindungslinien mit zwei Durchschnitten gemeinsamer Tangenten in Involution sind, wenn diese Durchschnitte ein Punktpaar derjenigen Kegelschnittschar bilden, welche durch die beiden Kegelschnitte bestimmt ist. Ist  $\pi$  die Verbindungslinie von  $(r_2 s_2)$  mit  $(x_1 x_3)$ , so sind wegen der vorher angeführten harmonischen Punkte  $\beta\beta'x_2\pi$  und  $\gamma\gamma'x_2\pi$  je vier harmonische Strahlen. Die Strahlenpaare  $\beta\beta'$  und  $\gamma\gamma'$  sind also sowohl in Involution mit  $vv'r_2s_2$ , als harmonisch mit  $x_2\pi$  und müssen daher zusammenfallen, denn es giebt nur ein Strahlenpaar einer Involution, welches mit einem gegebenen Punktpaare harmonisch liegt. 42a.

Nachdem so gezeigt ist, daß die Schnittpunkte  $u_1 t_1$ ,  $r_2 s_2$ ,  $r_3 s_3$  und  $r_1 s_1$ ,  $r_2 s_2$ ,  $u_3 t_3$  gemeinschaftlicher Tangenten auf zwei Geraden  $\beta$  und  $\beta'$  liegen, kann man leicht erkennen, daß es noch zwei andere Gerade giebt, auf denen drei Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten liegen. In den harmonischen Punktreihen  $x_1(x_2 x_3 r_1 t_1)$  und  $x_2(x_1 x_3 r_2 t_2)$  fallen die Punkte  $(x_1 x_2)$  und  $(x_2 x_1)$  zusammen; die Verbindungslinien der drei anderen Punktpaare schneiden sich also in einem Punkte, der auf  $x_3$  liegt. Nun liegen  $(x_1 r_1)$  und  $(x_2 r_2)$  auf  $\beta'$ , welche Gerade durch  $(x_3 t_3)$  geht, also muß auch die Verbindungslinie von  $(x_1 t_1)$  und  $(x_2 t_2)$  durch  $(x_3 t_3)$  gehen, d. h. die Tangentendurchschnitte  $(x_1 t_1)$ ,  $(x_2 t_2)$ ,  $(x_3 t_3)$  liegen in einer Geraden und ebenso folgt, daß  $(x_1 r_1)$ ,  $(x_2 t_2)$ ,  $(x_3 r_3)$  auch auf einer Geraden liegen.

377. *Zieht man von irgend einem Punkte  $P$  einer gemeinschaftlichen Sekante  $AB$  zweier Kegelschnitte  $KK_1$ , die sich in vier Punkten  $ABCD$  schneiden, zwei Gerade, so liegen die vier Schnittpunkte, in denen die eine  $K$ , die andere  $K_1$  schneidet, auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , welcher durch  $C$  und  $D$  geht.*

Die Schnittpunkte von  $K$  mit der einen und von  $K_1$  mit der anderen Geraden seien  $HJ$  und  $H_1J_1$ ; durch  $CDHJ$  lassen sich unendlich viele Kegelschnitte legen, welche  $K_1$  wegen 364.



in solchen Sehnen schneiden, die sich in  $P$  treffen; einer von ihnen muß auch durch  $H_1 J_1$  gehen.

Fallen  $HJ$  und  $H_1 J_1$  je in einen Punkt  $H$  und  $H_1$  zusammen, so nimmt der Satz die Fassung an:

*Zieht man von irgend einem Punkte  $P$  einer gemeinschaftlichen Sekante  $AB$  zweier Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  Tangenten  $PH$  an  $K$  und  $PH_1$  an  $K_1$ , so läßt sich durch die beiden anderen Schnittpunkte  $C$  und  $D$  von  $K$  und  $K_1$  ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  legen, welcher  $K$  in  $H$  und  $K_1$  in  $H_1$  berührt.*

Die Berührungspunkte  $H$  und  $H_1$  können als die Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten von  $K\mathfrak{K}$  und  $K_1\mathfrak{K}$  angesehen werden und liegen deshalb mit einem Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten von  $K$  und  $K_1$  in einer Geraden (376.), also:

*Legt man durch zwei Schnittpunkte zweier Kegelschnitte einen dritten, welcher beide berührt, so liegen die Berührungspunkte mit einem Schnittpunkte gemeinsamer Tangenten von  $K$  und  $K_1$  in einer Geraden.*

378. Zwei Kegelschnitte  $K_1 K_2$  schneiden sich in  $A_3 B_3 C_3 D_3$ ; es sei  $E_3 F_3 G_3$  das gemeinschaftliche Poldreieck und zwar treffen sich  $A_3 B_3$  und  $C_3 D_3$  in  $G_3$ ,  $A_3 C_3$  und  $B_3 D_3$  in  $F_3$ ,  $B_3 C_3$  und  $A_3 D_3$  in  $E_3$ . Auf den Seiten dieses Poldreiecks liegen zu je zwei die Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten und zwar auf  $g_3$  oder  $E_3 F_3$  die Punkte  $G_{12}$  und  $G'_{12}$ , auf  $f_3$  oder  $E_3 G_3$  die Punkte  $F_{12}$  und  $F'_{12}$ , auf  $e_3$  oder  $F_3 G_3$  die Punkte  $E_{12}$  und  $E'_{12}$ . Durch einen von ihnen,  $G_{12}$ , ziehe man zwei Gerade  $ll'$ , welche  $K_1$  in  $A_2 B_2 C_2 D_2$  und  $K_2$  in  $A_1 B_1 C_1 D_1$  treffen. Die gemeinschaftlichen Tangenten von  $G_{12}$  seien  $t$  und  $t'$  und die beiden Strahlen, welche  $ll'$  und  $tt'$  harmonisch trennen, seien  $b_3$  und  $b'_3$ . Die Berührungssehnen  $b_1$  und  $b_2$  der gemeinschaftlichen Tangenten mit  $K_1$  und  $K_2$  treffen sich in  $G_3$  und die Gerade  $b_3$  in  $G_1$  und  $G_2$ . Dann sind die Büschel  $G_1(G_2 G_3 A_1 D_1)$ ,  $G_2(G_1 G_3 A_2 D_2)$ ,  $G_3(G_1 G_2 A_3 D_3)$  harmonisch. Denn die Schnittpunkte  $(A_1 D_1, B_1 C_1)$  und  $(A_2 D_2, B_2 C_2)$  liegen sowohl auf  $b_2$  und  $b_1$ , als auf  $b'_3$ . Die Sehne  $B_2 D_2$  werde von  $G_3 A_3$  und  $G_3 D_3$  in  $\beta$  und  $\beta'$ , von  $G_1 A_1$  und  $G_1 D_1$  in  $\gamma$  und  $\gamma'$  und von  $K_2$  in  $v$  und  $v'$  geschnitten; da zwei Kegelschnitte und ihre gemeinschaftlichen Sehnen jede Gerade



in einer Involution schneiden, so sind  $B_2D_2\beta\beta'vv'$  und  $B_2D_2\gamma\gamma'vv'$  in Involution und  $\beta\beta'$  müssen mit  $\gamma\gamma'$  zusammenfallen; denn ist  $\pi$  der Schnittpunkt von  $B_2D_2$  mit  $G_1G_3$ , so sind  $\beta\beta'G_2\pi$  und  $\gamma\gamma'G_2\pi$  je vier harmonische Punkte und  $\beta\beta'$  und  $\gamma\gamma'$  müssen also gleichzeitig der Involution  $A_2B_2vv'$  angehören und  $G_2\pi$  harmonisch trennen.

In  $\beta$  und  $\beta'$  schneiden sich  $A_3B_3$ ,  $B_2D_2$ ,  $B_1D_1$  und  $C_3D_3$ ,  $A_2B_2$ ,  $C_1D_1$ . Daraus folgt leicht (cf. 376), daß noch  $A_2C_2$  und  $A_1C_1$ ,  $C_2D_2$  und  $C_1D_1$ ,  $A_2B_2$  und  $A_1B_1$  sich auf  $A_3B_3$ ,  $C_2D_2$  und  $A_1B_1$ ,  $B_2D_2$  und  $A_1C_1$ ,  $A_2C_2$  und  $B_1D_1$  sich auf  $C_3D_3$  schneiden. Es schneiden sich also auf jeder der durch  $G_3$  gehenden gemeinschaftlichen Sehnen  $A_3B_3$  und  $C_3D_3$  viermal je zwei Verbindungslinien der acht Schnittpunkte, in denen  $K_1$  und  $K_2$  von dem Geradenpaar ( $ll'$ ) getroffen wird und achtmal liegen vier dieser Schnittpunkte auf einem Kegelschnitte, der entweder durch  $A_3B_3$  oder  $C_3D_3$  geht. Mit  $A_3B_3$  liegen auf einem Kegelschnitte die Punkte  $A_1B_1C_2D_2$ ,  $A_2B_2C_1D_1$ ,  $A_1C_1B_2D_2$ ,  $A_2C_2B_1D_1$ ; mit  $C_3D_3$  die Punkte  $A_1B_1A_2B_2$ ,  $C_1D_1C_2D_2$ ,  $A_1C_1A_2C_2$ ,  $B_1D_1B_2D_2$ .

Läßt man die Geraden  $ll'$  sich um  $G_{12}$  drehen, so ändern sich diese Kegelschnitte, treffen sich aber entweder in  $A_3B_3$  oder  $C_3D_3$ . Hält man die Gerade  $l$  und die Schnittpunkte  $A_1A_2$  fest, dreht aber  $l'$ , so erhält man ein Büschel von Kegelschnitten  $k(A_1A_2C_3D_3)$ . Zieht man an die Kegelschnitte desselben die Tangenten von  $G_{12}$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\gamma_{12}$ , welche in  $C_3$  und  $D_3$  die Geraden  $G_{12}C_3$  und  $G_{12}D_3$  berührt. Einer der Kegelschnitte  $k$  schneidet die Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$  in den Punkten  $B_1$  und  $B_2$ , die mit  $G_{12}$  in einer Geraden liegen und diese Punkte bestimmen in gleicher Weise ein Büschel  $(B_1B_2C_3D_3)$ . Die Berührungspunkte der von  $G_{12}$  an die Kegelschnitte desselben gezogenen Tangenten liegen auf einem Kegelschnitte, der mit  $\gamma_{12}$  zusammenfallen muß, denn er berührt auch  $G_{12}C_3$  und  $G_{12}D_3$  und geht durch die Berührungspunkte auf demjenigen Kegelschnitte  $(A_1B_1A_2B_2C_3D_3)$ , welcher beiden Büscheln gemeinsam ist. Wenn man demnach  $l$  und  $l'$  sich beliebig drehen läßt, so erhält man eine doppelt unendliche Mannigfaltigkeit von Kegelschnitten, zu denen auch diejenigen Kegelschnitte



durch  $C_3D_3$  gehören, welche  $K_1$  und  $K_2$  berühren. Zu allen diesen Kegelschnitten steht  $\gamma_{12}$  in harmonischer Beziehung.

Umgekehrt läßt sich nun zeigen, daß jeder Kegelschnitt durch  $C_3D_3$ , welcher zu  $\gamma_{12}$  in harmonischer Beziehung steht, zu jenen Kegelschnitten  $k \dots$  gehört, d. h. daß er  $K_1$  und  $K_2$  in solchen vier Punkten schneidet, daß zwei ihrer Verbindungslinien durch  $G_{12}$  gehen. Ist  $\pi$  ein Kegelschnitt durch  $C_3D_3$ , welcher mit  $\gamma_{12}$  in harmonischer Beziehung steht, und schneidet er  $\gamma_{12}$  in  $P$  und  $Q$ , so müssen die Tangenten in  $P$  und  $Q$  an  $\pi$  sich in  $G_{12}$  treffen, also zwei Gerade  $l$  und  $l'$  sein. Ein Kegelschnitt aus der Reihe  $k \dots$  ist aber dadurch bestimmt, daß er durch  $C_3D_3$  geht und zwei beliebige Gerade  $l$  und  $l'$  durch  $G_{12}$  in ihren Schnittpunkten mit  $\gamma_{12}$  berührt. Also gehört  $\pi$  zu den Kegelschnitten  $k \dots$ . Zusammenfassend:

*Wenn zwei Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$  sich in vier reellen Punkten schneiden und man zieht durch irgend einen Durchschnittspunkt  $G_{12}$  gemeinschaftlicher Tangenten zwei Gerade  $l$  und  $l'$ , so schneiden sich von den Verbindungslinien der acht Schnittpunkte viermal je zwei auf der einen und viermal auf der anderen derjenigen beiden gemeinschaftlichen Sekanten  $s$  und  $s'$ , die sich im Pol derjenigen Seite des gemeinschaftlichen Poldreiecks treffen, auf welcher  $G_{12}$  liegt. Achtmal liegen je vier jener Schnittpunkte mit den beiden auf  $s$  oder  $s'$  liegenden Schnittpunkten  $A_3B_3$  oder  $C_3D_3$  von  $K_1$  und  $K_2$  auf einem Kegelschnitte  $k$ . Drehen sich  $l$  und  $l'$  um  $G_{12}$ , so durchläuft  $k$  eine Reihe von Kegelschnitten von doppelt unendlicher Mächtigkeit. Zu diesen gehören alle Kegelschnitte durch  $A_3B_3$  oder  $C_3D_3$ , welche  $K_1$  und  $K_2$  berühren oder zu ihnen in harmonischer Beziehung stehen. Zieht man von  $G_{12}$  an alle diese Kegelschnitte, welche durch  $C_3D_3$  gehen, Tangenten, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\gamma_{12}$ , welcher  $G_{12}C_3$  und  $G_{12}D_3$  in  $C_3$  und  $D_3$  berührt und zu allen Kegelschnitten  $k \dots$  in harmonischer Beziehung steht. In gleicher Weise geben die durch  $A_3B_3$  gehenden Kegelschnitte  $k \dots$  zu einem Kegelschnitte  $\delta_{12}$  Veranlassung, der  $G_{12}A_3$  und  $G_{12}B_3$  in  $A_3$  und  $B_3$  berührt und zu allen in harmonischer Beziehung steht.*

379. Drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  haben zwei gemeinschaftliche



Punkte  $A$  und  $B$ ; die Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten  $G_{12}G'_{12}G_{23}G'_{23}G_{13}G'_{13}$  sind die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits (376), dessen Seiten  $G_{12}G_{23}G_{13}$ ,  $G_{12}G'_{13}G'_{23}$ ,  $G_{23}G'_{13}G'_{12}$ ,  $G_{13}G'_{23}G'_{12}$  sein mögen. Diejenigen drei gemeinschaftlichen Sekanten von  $C_1C_2C_3$ , welche nicht durch  $A$  oder  $B$  gehen, schneiden sich (364) in einem Punkte  $P$ ; zieht man von ihm die Tangenten an die Kegelschnitte, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\pi$ , der zu  $C_1C_2C_3$  in harmonischer Beziehung steht und durch  $A$  und  $B$  geht. Es giebt drei Büschel von Kegelschnitten durch  $A$  und  $B$ , welche zu  $C_1C_2$ ,  $C_2C_3$ ,  $C_3C_1$  in harmonischer Beziehung stehen; zieht man an die Kegelschnitte derselben von  $G_{12}$ ,  $G_{23}$ ,  $G_{13}$  Tangenten, so liegen die Berührungspunkte auf drei Kegelschnitten  $\gamma_{12}$ ,  $\gamma_{23}$ ,  $\gamma_{13}$  durch  $AB$ , welche zu jenen Büscheln und also auch zu dem allen drei angehörenden Kegelschnitte  $\pi$  in harmonischer Beziehung stehen. Ist  $C$  der Pol von  $AB$  bezüglich  $\pi$ , sind  $D_{12}E_{12}$ ,  $D_{23}E_{23}$ ,  $D_{13}E_{13}$  die Berührungspunkte der von  $G_{12}$ ,  $G_{23}$ ,  $G_{13}$  an  $\pi$  gezogenen Tangenten, so sind  $G_{12}D_{12}$  und  $G_{12}E_{12}$  Tangenten von  $\gamma_{12}$  in  $D_{12}E_{12}$ ,  $G_{23}D_{23}$  und  $G_{23}E_{23}$  Tangenten von  $\gamma_{23}$  in  $D_{23}E_{23}$ ,  $G_{13}D_{13}$  und  $G_{13}E_{13}$  Tangenten von  $\gamma_{13}$  in  $D_{13}E_{13}$ . Da die drei Geraden  $D_{12}E_{12}$ ,  $D_{23}E_{23}$ ,  $D_{13}E_{13}$  sich in einem Punkte  $D$ , dem Pole der Geraden  $G_{12}G_{23}G_{13}$  bezüglich  $\pi$ , schneiden, so sind  $C$  und  $D$  konjugierte Punkte bezüglich  $\gamma_{12}\gamma_{23}\gamma_{13}$ . Die Gerade  $CD$  treffe  $\pi$  noch in  $C'D'$ ; da nun für die drei Kegelschnitte  $\gamma_{12}\gamma_{23}\gamma_{13}$  sowohl  $C$  und  $D$ , wie  $C'$  und  $D'$  konjugierte Punkte sind, so treffen sie sich in denselben beiden (reellen oder imaginären) Punkten auf  $CD$  und gehören einem Büschel an. Zu den Punkten von  $CD$  gehören demnach Kegelschnitte eines Büschels, welche zu  $\gamma_{12}\gamma_{23}\gamma_{13}$  in harmonischer Beziehung stehen, durch  $A$  und  $B$  gehen und deshalb (cf. 378) die Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  in solchen Punkten schneiden, daß zwei Verbindungslinien der Schnittpunkte auf  $C_1C_2$  durch  $G_{12}$ , auf  $C_2C_3$  durch  $G_{23}$ , auf  $C_1C_3$  durch  $G_{13}$  gehen. Jede der drei Geraden  $G_{12}G'_{13}G'_{23}$ ,  $G_{23}G'_{13}G'_{12}$ ,  $G_{13}G'_{23}G'_{12}$  giebt zu einem analogen Fall Veranlassung.

Kommt zu den drei Kegelschnitten  $C_1C_2C_3$  noch ein vierter  $C_4$ , so hat dieser mit jenen noch sechs Durchschnitte gemein-



samer Tangenten,  $G_{14} G'_{14} G_{24} G'_{24} G_{34} G'_{34}$ . Sie bilden mit den ersten folgende Gruppen von Ecken vollständiger Vierseite

$$\begin{aligned} & G_{12} G_{23} G_{13} G_{14} G_{24} G_{34}, \quad G_{12} G_{23} G_{13} G'_{14} G'_{24} G'_{34}, \\ & G_{12} G'_{13} G'_{23} G_{14} G_{24} G'_{34}, \quad G_{12} G'_{13} G'_{23} G'_{14} G'_{24} G_{34}, \\ & G_{23} G'_{13} G'_{12} G_{24} G_{34} G'_{14}, \quad G_{23} G'_{13} G'_{12} G'_{24} G'_{34} G_{14}, \\ & G_{13} G'_{23} G'_{12} G_{14} G_{34} G'_{24}, \quad G_{13} G'_{23} G'_{12} G'_{14} G'_{34} G_{24}. \end{aligned}$$

Nimmt man die vier Geraden  $G_{12} G_{23} G_{13}$ ,  $G_{12} G_{24} G_{14}$ ,  $G_{23} G_{24} G_{34}$ ,  $G_{13} G_{14} G_{34}$  und denkt sich die zu jeder Geraden gehörenden Kegelschnittbüschel konstruiert, welche zu den Kegelschnitten  $\gamma_{12} \gamma_{23} \gamma_{13}$ ,  $\gamma_{12} \gamma_{24} \gamma_{14}$ ,  $\gamma_{23} \gamma_{24} \gamma_{34}$ ,  $\gamma_{13} \gamma_{14} \gamma_{34}$  in harmonischer Beziehung stehen, wenn  $\gamma_{14} \gamma_{24} \gamma_{34}$  auf dieselbe Art wie  $\gamma_{12} \gamma_{13} \gamma_{23}$  konstruiert sind, so müssen sich diejenigen vier gemeinschaftlichen Sekanten jener Büschel, welche nicht durch  $A$  und  $B$  gehen, in einem Punkte treffen. Sind  $CD$  und  $C_1 D_1$  die gemeinschaftlichen Sekanten der beiden Büschel  $\gamma_{12} \gamma_{23} \gamma_{14}$  und  $\gamma_{12} \gamma_{24} \gamma_{14}$  und zieht man von ihrem Schnittpunkte  $R$  Tangenten an die fünf Kegelschnitte  $\gamma_{12} \gamma_{23} \gamma_{13} \gamma_{24} \gamma_{14}$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\varrho$ , welcher zu jenen in harmonischer Beziehung steht. Da er also zu  $\gamma_{23} \gamma_{24}$  und  $\gamma_{13} \gamma_{14}$  in harmonischer Beziehung steht,  $\gamma_{23} \gamma_{24} \gamma_{34}$  und  $\gamma_{13} \gamma_{14} \gamma_{34}$  aber ein Büschel bilden, so liegt  $R$  auf denjenigen gemeinschaftlichen Sekanten dieser Büschel, welche nicht durch  $A$  oder  $B$  gehen. Der Kegelschnitt  $\varrho$  steht also zu allen sechs Kegelschnitten  $\gamma_{12} \gamma_{23} \gamma_{13} \gamma_{14} \gamma_{24} \gamma_{34}$  in harmonischer Beziehung und schneidet daher jeden der Kegelschnitte  $C_1 C_2 C_3 C_4$  noch in solchen zwei Punkten, daß die Verbindungslinien der auf  $C_1 C_2$ ,  $C_2 C_3$ ,  $C_1 C_3$ ,  $C_1 C_4$ ,  $C_2 C_4$ ,  $C_3 C_4$  befindlichen Punkte sich zu zwei bezüglich in  $G_{12}$ ,  $G_{23}$ ,  $G_{13}$ ,  $G_{14}$ ,  $G_{24}$ ,  $G_{34}$  schneiden. Da die Punkte  $G$  sich auf acht vollständige Vierseite verteilen, so giebt es im Ganzen acht Kegelschnitte  $\varrho$  und somit acht Auflösungen der Aufgabe:

*Einen Kegelschnitt zu konstruieren, der vier gegebene Kegelschnitte  $C_1 C_2 C_3 C_4$ , welche zwei gemeinschaftliche Punkte  $A$  und  $B$  haben, in diesen und außerdem in solchen Punkten schneidet, daß die Verbindungslinien der auf  $C_1 C_2$ ,  $C_2 C_3$ ,  $C_1 C_3$ ,  $C_1 C_4$ ,  $C_2 C_4$ ,  $C_3 C_4$  befindlichen Schnittpunkte zu zwei bezüglich durch solche Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten dieser Kegelschnitt-*



*paare gehen, welche die sechs Ecken eines vollständigen Vierseits bilden.*

380. Die Kegelschnitte  $C_1$  und  $C_2$  schneiden sich in  $ABCD$ ; die gemeinschaftlichen Sekanten  $AB$  oder  $s$  und  $CD$  oder  $t$  treffen sich in  $P$ . Auf der für beide Kegelschnitte gemeinsamen Polare  $p$  von  $P$  liegen die Tangentendurchschnitte  $G_{12}$  und  $G'_{12}$ . Diese sind mit den Punkten, in denen  $p$  von  $C_1$  und  $C_2$  geschnitten werden, in Involution, also läßt sich durch  $G_{12}G'_{12}$  ein Kegelschnitt  $C_{12}$  des Büschels ( $ABCD$ ) legen. Die Tangente durch  $G_{12}$  berühre  $C_1$  in  $B_1$ ,  $C_2$  in  $B_2$  und schneide  $C_{12}$  noch in  $B_3$ ; auf der Geraden  $p$  seien  $S_1$  und  $S_2$  die Pole von  $s$ ,  $T_1$  und  $T_2$  diejenigen von  $t$  bezüglich  $C_1$  und  $C_2$ . Die Geraden  $B_1T_1$ ,  $B_2T_2$  sind konjugiert zur Tangente  $B_1B_2$  bezüglich  $C_1$ ,  $C_2$ ; daher schneiden  $B_1T_1$  und  $B_2T_2$  die Sekante  $t$  in demselben Punkte  $Q$ , welcher dem Schnittpunkte  $R$  von  $B_1B_2$  und  $t$  bezüglich des Kegelschnittbüschels konjugiert ist. Da die Geraden  $B_3B_2B_1G_{12}$  und  $B_3G'_{12}$  die Sekante  $t$  in konjugierten Punkten bezüglich  $C_{12}$  schneiden und der eine Schnittpunkt  $Q$  ist, so muß der andere  $R$  sein. Auf der gemeinschaftlichen Tangente  $B_1B_2$  bestimmen die Kegelschnitte des Büschels ( $ABCD$ ) eine Involution, deren Doppelpunkte  $B_1$  und  $B_2$  sind. Daher sind  $B_1B_2B_3G_{12}$  harmonische Punkte,  $Q(B_1B_2B_3G_{12})$  harmonische Strahlen und  $T_1T_2G'_{12}G_{12}$  harmonische Punkte. In gleicher Weise folgt, daß  $S_1S_2G'_{12}G_{12}$  harmonische Punkte sind.

*Wenn sich zwei Kegelschnitte  $C_1$  und  $C_2$  in vier reellen Punkten schneiden, so liegen zwei solche Durchschnitte  $G_{12}G'_{12}$  gemeinsamer Tangenten, die auf einer Seite des gemeinschaftlichen Poldreiecks liegen, auf einem Kegelschnitte des durch  $C_1$  und  $C_2$  bestimmten Büschels und werden harmonisch getrennt durch die Pole von jeder der beiden gemeinschaftlichen Sekanten, welche sich in der Ecke des Poldreiecks schneiden, die der Seite  $G_{12}G'_{12}$  gegenüberliegt.*

## § 25.

### Das Kegelschnittbüschel mit zwei und vier imaginären Grundpunkten.

381. Die Gesamtheit aller Kegelschnitte, welche den Kreisen eines Kreisbüschels harmonisch verwandt sind, bildet



ein „Kegelschnittbüschel“. Daraus folgt: die Gesamtheit aller Kegelschnitte, welche die Punktpaare zweier Involutionen als Paare konjugierter Punkte haben, bildet ein Kegelschnittbüschel.

382. Zwei Kegelschnitte, die sich in zwei reellen Punkten schneiden, lassen sich durch harmonische Verwandtschaft in zwei Kreise verwandeln.

Es seien  $A$  und  $B$  die beiden reellen Schnittpunkte zweier Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ ,  $CDEF$  vier harmonische Punkte von  $K$ , also  $A(CDEF)$  und  $B(CDEF)$  harmonische Büschel. Diese treffen  $K_1$  in  $C_1D_1E_1F_1$  und  $C'_1D'_1E'_1F'_1$ ; dann sind auch  $C_1(C'_1D'_1E'_1F'_1)$  und  $C'_1(C_1D_1E_1F_1)$  harmonische Büschel und da diese den Strahl  $C_1C'_1$  gemeinsam haben, so liegen




Fig. 153.

die Schnittpunkte der übrigen Strahlenpaare auf einer Geraden  $g$ . Man stelle nun eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem Kegelschnitte  $K_1$  ein Kreis  $\mathfrak{K}_1$  und der Geraden  $g$  die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$  verwandt ist. Bezeichnet man die verwandten Punkte mit deutschen Buchstaben, so sind auf

$\mathfrak{K}_1$  die Bogen  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}'_1$ ,  $\mathfrak{D}_1\mathfrak{D}'_1$ ,  $\mathfrak{E}_1\mathfrak{E}'_1$ ,  $\mathfrak{F}_1\mathfrak{F}'_1$  einander gleich, weil die Geraden  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}'_1$  und  $\mathfrak{C}'_1\mathfrak{D}_1$ ,  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{E}'_1$  und  $\mathfrak{C}'_1\mathfrak{E}_1$ ,  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{F}'_1$  und  $\mathfrak{C}'_1\mathfrak{F}_1$  sich auf  $g_\infty$  schneiden und daher parallel sind. Deshalb müssen die Winkel  $\mathfrak{ACB}$ ,  $\mathfrak{ADB}$ ,  $\mathfrak{ECB}$ ,  $\mathfrak{FEB}$  einander gleich sein, nämlich gleich der Hälfte der Summe der Bogen  $\mathfrak{AB}$  und  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}'_1$ . Folglich liegen die sechs Punkte  $\mathfrak{ABCDEF}$  auf einem Kreise  $\mathfrak{K}$ , welcher dem Kegelschnitte  $K$  verwandt ist.

*Anderer Beweis.* Von den Kegelschnitten  $K$  und  $K_1$  soll der leichteren Anschauung wegen angenommen werden, daß sie Ellipsen sind; denn irgend zwei Kegelschnitte, die keine Ellipsen sind, kann man durch harmonische Verwandtschaft stets in Ellipsen verwandeln. Man hat die Mittellinie



der Verwandtschaft nur so zu wählen, daß sie keinen der Kegelschnitte schneidet.

Denkt man sich eine Gerade, welche  $K$  berührt und ganz im äußeren Gebiete von  $K_1$  liegt, so bewegt, daß sie stets Tangente von  $K$  bleibt, so wird sie zunächst das äußere Gebiet von  $K_1$  durchlaufen, um dann auch in das innere Ge-




Fig. 154.

biet von  $K_1$  einzutreten und schließlich auch wieder aus demselben auszutreten. Sie muß daher zweimal  $K_1$  berühren. Demnach haben  $K$  und  $K_1$  zwei gemeinschaftliche Tangenten, welche in  $C$  und  $C_1$ ,  $D$  und  $D_1$  berühren und sich in  $E$  schneiden mögen.

Die Geraden  $CD$  und  $C_1D_1$ , die Polaren von  $E$  in Bezug auf  $K$  und  $K_1$ , mögen sich in  $P$  schneiden; es hat dann  $P$  bezüglich beider Kegelschnitte dieselbe Polare  $p$ , welche auch durch  $E$  gehen muß.

Daraus schließt man weiter, daß auch die gemeinschaftliche Sekante  $AB$  durch  $P$  geht. Denn zieht man  $PA$  und



träfe diese Gerade  $K$  in  $F$ ,  $K_1$  in  $F_1$ , so würden  $P$  und  $p$  sowol durch  $A$  und  $F$ , als  $A$  und  $F_1$  harmonisch getrennt.

Zu  $PC$ ,  $PC_1$ ,  $PA$  sei  $g$  der vierte harmonische, dem letzten zugeordnete Strahl. Man konstruiere eine solche harmonische Verwandschaft, daß dem Kegelschnitte  $K_1$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und der Geraden  $g$  die unendlich entfernte Gerade  $g_\infty$  verwandt ist. Die zu  $PC$ ,  $PC_1$ ,  $PA$  verwandten Geraden  $\mathfrak{P}_\infty \mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{P}_\infty \mathfrak{C}_1$ ,  $\mathfrak{P}_\infty \mathfrak{A}$  werden parallel und weil  $\mathfrak{C}_1 \mathfrak{D}_1$  auf  $p$ , der zu  $p$  verwandten Geraden senkrecht steht, denn  $p$  geht durch den Mittelpunkt des Kreises  $\mathfrak{K}_1$ , so müssen auch  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  auf  $p$  senkrecht stehen und zwar liegt  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  in der Mitte von  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{C}_1 \mathfrak{D}_1$ . Die Punkte  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  liegen symmetrisch zu  $p$ , also läßt sich durch dieselben ein Kreis  $\mathfrak{K}$  legen, welcher  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  berührt. Geschieht dies in  $\mathfrak{C}'$  und  $\mathfrak{D}'$ , so liegt  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  in der Mitte von  $\mathfrak{C}_1 \mathfrak{D}_1$  und  $\mathfrak{C}' \mathfrak{D}'$ , denn es ist die Potenzlinie von  $\mathfrak{K}_1$  und  $\mathfrak{K}'$ . Daher muß der Kreis  $\mathfrak{K}'$  mit dem Kreise zusammenfallen, welcher dem Kegelschnitte  $K$  verwandt ist.

Somit sind den Kegelschnitten  $K$  und  $K_1$  die Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  verwandt.

383. Aus der Verwandtschaft zweier Kegelschnitte, die sich in zwei reellen Punkten schneiden, mit zwei Kreisen, ergeben sich unmittelbar die folgenden Sätze:

a. Wenn zwei Kegelschnitte nur zwei reelle Schnittpunkte haben, so haben sie auch nur zwei reelle gemeinschaftliche Tangenten.

b. Zwei Kegelschnitte mit zwei reellen Schnittpunkten bestimmen ein Büschel.

c. Außer der Geraden  $AB$ , welche die Schnittpunkte beider Kegelschnitte verbindet und für beide dieselbe Involution konjugierter Punkte hat, giebt es noch eine zweite Gerade  $g$  von derselben Eigenschaft. Die imaginären Doppelpunkte der Involution konjugierter Punkte auf  $g$  sind die imaginären Schnittpunkte der beiden Kegelschnitte. Man nennt  $g$  die ideelle gemeinschaftliche Sekante.

d. Die Kegelschnitte des Büschels schneiden jede Gerade in den Punktpaaren einer Involution. (36 c.)

e. Von allen Kegelschnitten des Büschels berühren höchstens zwei eine Gerade. (36 g.)



f. Von allen Kegelschnitten des Büschels geht nur einer durch einen bestimmten Punkt.

g. Das aus der reellen und ideellen gemeinschaftlichen Sekante bestehende Geradenpaar ist ein Kegelschnitt des Büschels, denn durch keinen Punkt desselben kann ein anderer Kegelschnitt des Büschels gehen.

h. Das gemeinschaftliche Poldreieck hat eine reelle Ecke ( $P$ ) und zwei imaginäre, die imaginären Doppelpunkte der Involution, in welcher die Polare  $p$  von  $P$  von den Kegelschnitten getroffen wird.

i. Die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle Kegelschnitte eines Büschels schneiden sich in einem Punkte, dem konjugierten Punkte bezüglich des Büschels. (34.)

k. Die Pole einer Geraden in Bezug auf die Kegelschnitte des Büschels liegen auf einem Kegelschnitte, welcher auch durch die reelle Ecke des gemeinschaftlichen Poldreiecks geht. Auf ihm liegen auch die konjugierten Punkte aller Punkte der Geraden. Beweis wie in 360.

l. Zieht man durch den Schnittpunkt gemeinschaftlicher Tangenten, welcher auf der reellen Seite des gemeinsamen Poldreiecks liegt, zwei Gerade, so schneiden sie zwei beliebige Kegelschnitte des Büschels in solchen Punkten, daß zwei Paare ihrer Verbindungslinien sich auf der reellen, die beiden andern Paare sich auf der ideellen gemeinschaftlichen Sekante schneiden.

384. Alle Kegelschnitte  $K$ , welche einen Brennpunkt  $F$  und seine Leitlinie  $f$  gemeinsam haben, bilden ein Büschel.

Man stelle eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß  $F$  das Centrum und der Geraden  $f$  die  $g_\infty$  verwandt ist. Jedem Kegelschnitte muß dann ein Kreis mit dem Mittelpunkt  $F$  verwandt sein, weil die circulare Involution konjugierter Strahlen des Brennpunktes sich selbst verwandt ist. Da aber alle konzentrischen Kreise eine Gerade in einer Involution schneiden, so müssen dies auch die Kegelschnitte  $K$  thun.

385. Alle Kegelschnitte  $K$ , welche einen Punkt  $P$  und eine Gerade  $p$  zu Pol und Polare und eine auf  $p$  liegende Involution als Involution konjugierter Punkte haben, bilden ein Büschel.



Wenn die Involution auf  $p$  Doppelpunkte,  $A$  und  $B$  hat, so müssen alle Kegelschnitte  $K$  die Geraden  $PA$  und  $PB$  in  $A$  und  $B$  berühren, haben also in  $A$  und  $B$  je zwei gemeinsame Punkte und bilden daher ein Büschel mit vier reellen Grundpunkten. 355.

Wenn die Involution auf  $p$  keine Doppelpunkte hat, so schneiden sich die Kreise über den einzelnen Punktpaaren in zwei Punkten  $F$  und  $F'$ . Man ziehe  $PF$  und konstruiere denjenigen Punkt  $O$ , welcher  $p$  von  $P$  und  $F$  harmonisch trennt und wähle  $O$  und  $p$  als Centrum und Axe einer harmonischen Verwandtschaft. In dieser sind allen Kegelschnitten, welche  $P$  und  $p$  als Pol und Polare haben, solche verwandt, welche  $F$  und  $p$  als Brennpunkt und Leitlinie haben, also folgt der Satz aus 384.

386. *Alle Kegelschnitte, welche zwei Involutionen auf den Geraden  $p$  und  $q$  als Involutionen konjugierter Punkte haben, bilden ein Büschel.*

Wenn beide Involutionen Doppelpunkte haben, so folgt der Satz aus 355.

Wenn die Involution auf  $p$  keine Doppelpunkte hat, so kann man nach 381. eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher der  $p$  die  $g_\infty$  und jedem Kegelschnitte ein Kreis verwandt ist. Alle diese Kreise haben die zu der Involution  $q$  verwandte Involution  $q$  als Involution konjugierter Punkte, also  $q$  als gemeinschaftliche reelle oder ideelle Sekante, jenachdem die Involution auf  $q$  Doppelpunkte hat oder nicht und der Satz ergibt sich aus 36c. und 381.

387. *Alle Kegelschnitte, welche durch drei Punkte  $ABC$  gehen und zwei Punkte  $EE'$  zu konjugierten Punkten haben, bilden ein Büschel.*

Es seien  $FG, F_1G_1, F_2G_2, \dots$  Punktpaare, welche  $EE'$  harmonisch teilen; durch  $ABCFG$  und  $ABCF_1G_1$  seien die Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  gelegt, die sich noch in  $D$  schneiden müssen. Denn durchläuft ein Punkt von  $A$  ab den Kegelschnitt  $K_1$  und tritt zunächst in das innere Gebiet von  $K$ , verläßt dasselbe bei  $B$ , durchläuft einen Teil von  $K_1$  im äußeren Gebiete von  $K$ , tritt wieder bei  $C$  in das innere



Gebiet von  $K$ , so muß er beim Austritt in das äußere Gebiet noch einmal  $K$  in  $D$  schneiden.  $K$  und  $K_1$  bestimmen ein Büschel und die Kegelschnitte desselben schneiden  $EE'$  in einer Involution (356), welche mit der Involution  $FG$ ,  $F_1G_1$ ,  $F_2G_2$ , ... identisch sein muß, da sie mit ihr zwei Punktpaare gemein hat. Die Kegelschnitte des Büschels ( $KK_1$ ) fallen daher mit den Kegelschnitten durch  $ABC$  zusammen, welche  $EE'$  zu konjugierten Punkten haben.

388. *Alle Kegelschnitte, welche durch zwei Punkte  $AB$  gehen und die Punkte  $CC'$  und  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, bilden ein Büschel.*

Die Punktpaare  $EF$ ,  $E_1F_1$ ,  $E_2F_2$ , ..., welche  $CC'$  und  $GH$ ,  $G_1H_1$ ,  $G_2H_2$ , ..., welche  $DD'$  harmonisch teilen, bilden zwei Involutionen. Man lege durch  $ABEF$  die Kegelschnitte eines Büschels, so schneiden sie  $DD'$  in einer Involution, welche mit der Involution  $GH$ ,  $G_1H_1$ ,  $G_2H_2$ , ... ein Punktpaar gemein hat; dieses sei  $GH$  und es liegen also  $ABEFGH$  auf einem Kegelschnitte  $K$ . Auf gleiche Weise folgt, daß es im Büschel ( $ABE_1F_1$ ) einen Kegelschnitt  $K_1$  giebt, welcher durch eines der Punktpaare auf  $DD'$ , etwa  $G_1H_1$  geht. Die beiden Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  bestimmen ein Büschel, in welchem  $A$  und  $B$  zwei reelle Grundpunkte sind. Ein Kegelschnitt desselben,  $K_0$ , muß durch den Schnittpunkt  $E_0$  von  $CC'$  und  $DD'$  gehen und diese Geraden in zwei Punktpaaren der auf ihnen liegenden Involutionen schneiden. Diese Punktpaare seien  $E_0F_0$  und  $E_0G_0$ . Durch die fünf Punkte  $ABE_0F_0G_0$  ist der Kegelschnitt  $K_0$  bestimmt und  $K_1$  ist also ein Kegelschnitt des durch  $K$  und  $K_0$  bestimmten Büschels. Legt man noch durch  $ABE_2F_2$  denjenigen Kegelschnitt  $K_2$ , welcher  $DD'$  in einem Punktpaare  $G_2H_2$  der Involution schneidet, so folgt ganz ebenso, daß  $K_2$  auch dem durch  $K$  und  $K_0$  bestimmten Büschel angehört.

389. *Alle Kegelschnitte, welche durch einen Punkt  $A$  gehen und die Punkte  $CC'$ ,  $DD'$ ,  $EE'$  zu konjugierten Punkten haben, bilden ein Büschel.*

Wenn  $P$  ein beliebiger Punkt ist, so bilden alle Kegelschnitte durch  $A$  und  $P$ , welche  $CC'$  und  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, ein Büschel. Unter den Kegelschnitten des-



selben giebt es einen  $K$ , der  $EE'$  harmonisch teilt. Daraus folgt, daß es unter allen Kegelschnitten durch  $A$ , welche  $CC'$ ,  $DD'$ ,  $EE'$  zu konjugierten Punkten haben, nur einen  $K$  giebt, welcher durch einen Punkt  $P$  und ebenso nur einen  $K_1$  giebt, welcher durch einen Punkt  $P_1$  geht. Beide müssen wenigstens noch einen Schnittpunkt  $B$  gemein haben und bestimmen daher ein Büschel. Sämtliche Kegelschnitte dieses Büschels schneiden die Geraden  $CC'$ ,  $DD'$ ,  $EE'$  in Involutionen, welche mit den Involutionen zusammenfallen müssen, deren Doppelpunkte  $CC'$ ,  $DD'$ ,  $EE'$  sind. Daher haben alle Kegelschnitte des Büschels ( $KK_1$ ) diese Punkte zu konjugierten Punkten.

390. *Von allen Kegelschnitten, welche die Punkte  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, geht nur ein einziger durch einen Punkt  $P$ .*

Alle Kegelschnitte durch  $P$ , welche  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  zu konjugierten Punkten haben, bilden ein Büschel. Unter ihnen giebt es einen, der  $DD'$  harmonisch teilt, also kann man schließen, daß es unter allen Kegelschnitten, welche  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, nur einen giebt, welcher durch  $P$  geht.

391. Die Sätze 387—390 gelten auch, wenn die konjugierten Punkte imaginär werden, also die imaginären Doppelpunkte von Involutionen sind, und lauten dann:

a. *Alle Kegelschnitte, welche durch drei Punkte  $ABC$  und die Punktpaare einer Involution gehen, bilden ein Büschel.*

b. *Alle Kegelschnitte, welche durch zwei Punkte  $A$  und  $B$  und die Punktpaare zweier Involutionen gehen, bilden ein Büschel.*

c. *Alle Kegelschnitte, welche durch einen Punkt  $A$  und die Punktpaare dreier Involutionen gehen, bilden ein Büschel.*

d. *Von allen Kegelschnitten, welche durch die Punktpaare von vier Involutionen gehen, geht nur ein einziger durch einen Punkt  $P$ .*

392. *Zwei Kegelschnitte, die keinen reellen Schnittpunkt haben, lassen sich in harmonisch verwandte Beziehung zu zwei Kreisen bringen.*

I. Fall. Der eine Kegelschnitt liegt ganz außerhalb des anderen.



Sind  $K$  und  $K_1$  die beiden Kegelschnitte, so ziehe man an  $K$  irgend eine Tangente, welche ganz in das äußere Gebiet von  $K_1$  fällt und lasse dieselbe sich auf  $K$  bewegen. Bevor sie in das innere Gebiet von  $K_1$  eintritt und wieder aus demselben austritt, muß sie  $K_1$  berührt haben, also haben  $K$  und  $K_1$  mindestens zwei gemeinsame Tangenten. Diese mögen sich in  $A$  schneiden und die Kegelschnitte in  $BC$  und  $B_1C_1$  berühren; die Sehnen  $BC$  und  $B_1C_1$  schneiden sich in




Fig. 155.

$P$ . Die Polare von  $P$  muß für beide Kegelschnitte mit derjenigen Geraden durch  $A$  zusammenfallen, welche  $PA$  von den beiden harmonisch trennt. Da  $P$  außerhalb beider Kegelschnitte liegt, so muß seine Polare beide schneiden. Es giebt daher zwei Punkte  $Q$  und  $R$ , welche die auf ihr von den Kegelschnitten ausgeschnittenen Sehnen harmonisch teilen. Die drei Punkte  $PQR$  bilden ein beiden Kegelschnitten gemeinsames Poldreieck.

Ist  $X_0$  ein beliebiger Punkt der Tangente  $BB_1$ , sind  $X$  und  $X_1$  die auf  $PX_0$  liegenden konjugierten Punkte von  $X_0$



bezüglich  $K$  und  $K_1$ , so durchlaufen  $X$  und  $X_1$  zwei Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ , wenn  $X_0$  die Tangente durchläuft. (191.) Diese berühren  $AP$  in  $P$  und haben noch zwei gemeinsame Punkte  $D$  und  $E$ , die stets reell sein müssen. Der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}_1$  geht durch  $B_1$ . Durchläuft  $X_0$  die Strecke  $B_1A$ , so durchläuft  $X_1$  den Teil des Kegelschnittes  $\mathfrak{K}_1$  von  $B_1$  bis  $P$ . Der dem Punkte  $B_1$  bezüglich  $K$  konjugierte Punkt  $B'$  der Geraden  $B_1P$  muß also innerhalb  $\mathfrak{K}_1$ ,  $B$  außerhalb liegen, also liegt ein Teil von  $\mathfrak{K}_1$  innerhalb, ein anderer außerhalb  $\mathfrak{K}$  und diese Kegelschnitte haben daher noch zwei reelle Schnittpunkte  $D$  und  $E$ .

Die Geraden  $PD$  und  $PE$  treffen die Tangente  $BB_1$  in  $D_0$  und  $E_0$ , so sind  $DD_0$  und  $EE_0$  konjugierte Punkte in Bezug auf beide Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ . Treffen dieselben Geraden die Gerade  $QR$  noch in  $D'_0$  und  $E'_0$ , so sind auch  $PD'_0$  und  $PE'_0$  konjugierte Punkte für beide Kegelschnitte und daher sind alle Punktpaare der Involutionen  $DD_0$ ,  $PD'_0$ , ... und  $EE_0$  und  $PE'_0$ , ... Paare konjugierter Punkte bezüglich beider Kegelschnitte, also die Geraden  $PD$  und  $PE$  sind ideelle gemeinschaftliche Sekanten.

Beschreibt man über  $DD_0$ ,  $PD'_0$ , ... Kreise, so treffen sich diese in zwei Punkten  $O$  und  $O'$ ; wählt man  $O$  als Centrum einer harmonischen Verwandtschaft und legt die Axe durch  $O'$  parallel zu  $DD_0$ , so sind den beiden Kegelschnitten Kreise verwandt. 176.

*Anderer Beweis.*

Sind  $FGCB$  und  $F_1G_1C_1B_1$  solche Punkte der beiden Fig. 155. Kegelschnitte, daß die Büschel  $B(FGCA)$  und  $B_1(F_1G_1C_1A)$  harmonisch sind, so haben sie den Strahl  $BA$  gemeinsam und es liegen also die Schnittpunkte  $PJH$  und  $PJ_1H_1$  der übrigen Strahlen in einer Geraden. Man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und der Geraden  $JH$  die  $g_\infty$  verwandt ist; dann muß dem Kegelschnitte  $K_1$  auch ein Kreis  $\mathfrak{K}_1$  verwandt sein. (Die verwandten Punkte erhalten deutsche Buchstaben.) Denn da  $\mathfrak{P}$  im Unendlichen liegt und  $QR$  die Polare von  $P$  für  $K$  und  $K_1$  ist, so wird die verwandte Gerade  $\mathfrak{Q}\mathfrak{R}$  die Centrale von  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  sein, auf welcher die Gerade  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und also



auch  $\mathfrak{B}_1 \mathfrak{G}_1$  senkrecht steht. Daher ist  $\mathfrak{F}_1 \mathfrak{G}_1$  eine Axe von  $\mathfrak{R}_1$ . Da ferner  $\mathfrak{B} \mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{B}_1 \mathfrak{F}_1$ ,  $\mathfrak{B} \mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{B}_1 \mathfrak{G}_1$  parallel sind,  $\angle \mathfrak{F} \mathfrak{B} \mathfrak{G} = 1 R$  ist, so muß auch  $\angle \mathfrak{F}_1 \mathfrak{B}_1 \mathfrak{G}_1 = 1 R$  und  $\mathfrak{R}_1$  ein Kreis sein.

Die Geraden  $PJ$  und  $PJ_1$  sind also ideelle gemeinschaftliche Sekanten von  $K$  und  $K_1$ , da die verwandten Geraden  $g_\infty$  und  $\mathfrak{P} \mathfrak{F}_1$  solche Sekanten der Kreise  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$  sind.

II. Fall. *Der Kegelschnitt  $K$  liegt ganz innerhalb  $K_1$ .*

Man kann annehmen, daß der Kegelschnitt  $K$  eine Ellipse ist, denn wäre er Hyperbel oder Parabel, so läßt sich stets eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher einer der beiden verwandten Kegelschnitte  $\mathfrak{R} \mathfrak{R}_1$  eine Ellipse ist.

Es seien  $ABCD$  vier beliebige Punkte, deren Polaren in Bezug auf die beiden Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  sich in  $A' B' C' D'$  schneiden, so sind  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  konjugiert bezüglich  $K$  und  $K_1$ . Nach 390. giebt es unendlich viele Kegelschnitte, welche die Punkte jener vier Paare zu konjugierten Punkten haben; von ihnen geht durch irgend einen Punkt  $P$  nur ein einziger  $K_2$  und wenn  $P$  innerhalb  $K$  liegt, so muß auch  $K_2$  ganz innerhalb  $K$  liegen. Denn läge  $K_2$  zum Teil außerhalb  $K$ , so müßten  $K$  und  $K_2$  einen gemeinsamen Punkt haben und durch diesen gingen dann zwei von den Kegelschnitten, die  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, was gegen 390. verstößt. Da aber  $K$  eine Ellipse ist, so muß auch  $K_2$  eine Ellipse sein. Letztere umschließt ein kleineres Gebiet, als die erstere.

In gleicher Weise gelangt man zu einem Kegelschnitte  $K_3$ , der innerhalb  $K_2$  liegt und wenn man sich dieses Verfahren unendlich oft wiederholt denkt, so muß man, da die Zahl der Kegelschnitte, welche  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu konjugierten Punkten haben, einfach unendlich groß ist, schließlich zu einem Kegelschnitte gelangen, der in einen Punkt degeneriert. Dieser Punkt sei  $Q$  und seine Polare bezüglich  $K$  sei  $q$ .

Die Kegelschnitte  $K$  und  $Q$ , letzterer als Punktkegelschnitt betrachtet, haben zwei ideelle gemeinschaftliche Sekanten (cf. 180a.). Ueber den Punktpaaren der Involution konjugierter Punkte auf der einen,  $s$ , dieser Sekanten denke man sich Kreise konstruiert; diese schneiden sich in zwei



Punkten  $O$  und  $O'$ . Wenn man eine harmonische Verwandtschaft mit dem Centrum  $O$  und der Mittellinie  $s$  herstellt, deren Axe also durch  $O'$  parallel der Mittellinie  $s$  läuft, so sind in derselben dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und dem Punktkegelschnitte  $Q$  ein Punktkreis  $\mathfrak{Q}$  verwandt.

Ist nämlich  $S$  der Pol von  $s$  bezüglich  $K$  und sind  $RR'$  zwei konjugierte Punkte auf  $s$ , so sind  $SR$  und  $S'R'$  zwei konjugierte Strahlen für  $K$ . Die verwandten Geraden  $\mathfrak{S}\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{R}'$  sind parallel zu  $OR$  und  $OR'$ , denn die den Punkten  $R$  und  $R'$  der Mittellinie verwandten Punkte liegen auf  $OR$  und  $OR'$  im Unendlichen; sie sind konjugiert bezüglich  $\mathfrak{K}$  im Punkte  $\mathfrak{S}$ , dem Pole der zu  $s$  verwandten Geraden  $g_\infty$ . Da  $\mathfrak{S}$  somit der Mittelpunkt von  $\mathfrak{K}$  ist und je zwei konjugierte Strahlen im Mittelpunkte, also je zwei konjugierte Durchmesser auf einander senkrecht stehen, so ist  $\mathfrak{K}$  ein Kreis.

In gleicher Art läßt sich nachweisen, daß  $\mathfrak{Q}$  ein Punktkreis ist. Denn den für  $Q$  konjugierten Strahlen  $QR$  und  $QR'$  sind die senkrechten für  $\mathfrak{Q}$  konjugierten Strahlen  $\mathfrak{Q}\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{Q}\mathfrak{R}_1$  verwandt.

Der Kreis  $\mathfrak{K}$  und der Punktkreis  $\mathfrak{Q}$  konstituieren ein Kreisbüschel, für dessen einzelne Individuen die zu  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  verwandten Punktpaare  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}'$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}'$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}'$  auch aus konjugierten Punkten bestehen. Diesen Kreisen sind in der harmonischen Verwandtschaft solche Kegelschnitte verwandt, welche  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu Paaren konjugierter Punkte haben. Da alle Kreise dieselbe Involution konjugierter Punkte auf jeder gemeinschaftlichen Sekante haben, so gilt dies auch für die verwandten Kegelschnitte; diese bilden also ein Büschel (386.), zu welchem (390.) auch  $K_1$  gehört.

*Anderer Beweis.*

Man nehme wieder an, es seien die beiden Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  Ellipsen und es liege  $K$  ganz innerhalb  $K_1$ ; es seien ferner  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  vier Paare konjugierter Punkte, so giebt es unendlich viele Kegelschnitte  $K_2 \dots$ , für welche die Punkte dieser Paare konjugierte Punkte sind. Die Gesamtheit dieser Kegelschnitte werde bezeichnet mit  $(KK_1)$ . An  $K$  ziehe man im Punkte  $A_0$ , der beliebig angenommen werde, die Tangente  $t$ ; diese muß  $K_1$  in  $A_1B_1$  schneiden.



Es bewege sich  $A_1$  in der Richtung  $A_1 A_0$  nach  $A_2$ , so muß der durch  $A_2$  gehende Kegelschnitt  $K_2$  von  $(KK_1)$  die Gerade  $t$  in einem Punkte  $B_2$  schneiden, zu welchem  $B_1$  gelangt, wenn er sich in der Richtung  $B_1 A_0$  bewegt. Ebenso ergibt sich, daß wenn  $A_1$  sich von  $A_0$  fort in der Richtung  $A_0 A_1$  bewegt, auch  $B_1$  sich von  $A_0$  fort in der Richtung  $A_0 B_1$  bewegen muß. Die Punkte  $A_1$  und  $B_1$ , d. h. die Schnittpunkte




Fig. 156.

der Kegelschnitte  $(KK_1)$  mit  $t$  bewegen sich demnach in entgegengesetzter Richtung. Bei dieser Bewegung, die von  $A_1$  aus in der Richtung  $A_1 A_0$  vor sich gehen mag, treffen also die Punkte  $A_1$  und  $B_1$  in  $A_0$  zusammen, um sich dann wieder zu trennen. Der Punkt  $A_1$  gelange ins Unendliche nach  $A_m^\infty$ , dann wird sich  $B_1$  im Allgemeinen an einer Stelle  $B_m$  im Endlichen befinden. Gelangt  $A_1$  durchs Unendliche hindurch nach  $A_n$ , so hat sich  $B_1$  nach einem Punkte  $B_n$  bewegt, dem Punkte  $A_n$  entgegen, sich ihm also genähert. Bei fortgesetzter Bewegung müssen also die Punkte  $A_1$  und  $B_1$  aufeinandertreffen, ehe sie in ihre alte Lage zurückkommen. Dies geschehe im Punkte  $A'_0$ . Durch ihn geht (390.) ein Kegelschnitt  $K'$  aus der Gesamtheit  $(KK_1)$ , welcher also auch  $t$  berührt. Somit haben die Kegelschnitte  $KK'$  eine gemeinschaftliche Tangente und da beide keinen gemeinschaftlichen Punkt haben können (390.), so liegt jeder von ihnen ganz außerhalb des anderen. Man kann also nach dem ersten Falle  $K$  und  $K'$  durch harmonische Verwandtschaft in zwei Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}'$  verwandeln, welche die Punkte der Paare  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}'$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}'$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}'$ , die den Punkten  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  verwandt sind, zu konjugierten Punkten haben. Die Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}'$  bestimmen ein Büschel  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}')$  von Kreisen, denen ein Büschel von Kegelschnitten verwandt ist, welche mit den Kegelschnitten  $(KK_1)$  zusammenfallen müssen. Denn ist  $\mathfrak{P}$  ein beliebiger Punkt, durch welchen der Kreis  $\mathfrak{K}_p$  des Büschels



$(\mathfrak{K}\mathfrak{K}')$  geht, so geht durch den verwandten Punkt  $P$  der zu  $\mathfrak{K}_p$  verwandte Kegelschnitt  $\mathfrak{K}_p$ , aber auch ein Kegelschnitt  $K_p$  aus der Gesamtheit  $(KK_1)$ . Beide haben die Punkte  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  zu konjugierten Punkten, also müssen sie nach 390. zusammenfallen. Demnach lassen sich alle Kegelschnitte der Gesamtheit  $(KK_1)$  in Kreise verwandeln und es ist  $(KK_1)$  ein Kegelschnittbüschel.

393. *Irgend zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ , die keine reellen Schnittpunkte haben, müssen sich in zwei Paaren konjugiert imaginärer Punkte schneiden.*

Denn man kann sie in harmonisch verwandte Beziehung zu zwei Kreisen  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  bringen, die sich auf ihrer Potenzlinie und auf  $g_\infty$  in zwei Paaren konjugiert imaginärer Punkte schneiden. Durch diese gehen alle Kreise des Kreisbüschels  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1)$ , die ihnen verwandten Kegelschnitte gehen durch die vier imaginären Schnittpunkte von  $K$  und  $K_1$  und bilden ein Kegelschnittbüschel mit vier imaginären Grundpunkten. Für dasselbe gelten die Eigenschaften der beiden früher besprochenen Büschel.

a. *Unter allen Kegelschnitten des Büschels giebt es nur einen durch einen bestimmten Punkt.*

b. *In dem Büschel giebt es ein Paar von Geraden, bestehend aus den ideellen Sekanten, welche die Eigenschaft haben, daß ein Paar konjugierter Punkte in Bezug auf einen Kegelschnitt des Büschels auch konjugiert ist in Bezug auf alle Kegelschnitte desselben. Diese Geraden schneiden sich in einer Ecke des allen Kegelschnitten gemeinsamen Poldreiecks.*

c. *Alle Kegelschnitte eines Büschels schneiden eine Gerade in einer Involution. (36c.)*

d. *Unter allen Kegelschnitten eines Büschels giebt es höchstens zwei, welche eine Gerade berühren. 36g.*

e. *Die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle Kegelschnitte eines Büschels schneiden sich in einem Punkte, dem konjugierten Punkte bezüglich des Büschels. (34.)*

f. *Die Pole einer Geraden in Bezug auf die Kegelschnitte des Büschels liegen auf einem Kegelschnitte, welcher auch durch den Scheitel des einzigen Geradenpaares des Büschels geht. Auf*



*ihm liegen auch die konjugierten Punkte aller Punkte der Geraden.*

Beweis wie in 360.

*g. Zwei Kegelschnitte, von denen der eine ganz außerhalb des anderen liegt, haben vier reelle Tangenten.*

394. *Die Berührungspunkte aller Tangenten, die sich von einem Punkte der einen ideellen Sekante an die Kegelschnitte des Büschels ziehen lassen, liegen auf einem Kegelschnitte, welcher die andere ideelle Sekante in denjenigen beiden imaginären Punkten schneidet, welche sie mit den Kegelschnitten des Büschels gemein hat.*

Es seien  $s$  und  $s_1$  die beiden ideellen Sekanten des Büschels  $(KK_1)$  und auf  $s$  sei  $P$  ein beliebiger Punkt; man stelle eine solche involutorische Verwandtschaft her, daß der  $s_1$  die  $g_\infty$  und dem Büschel  $(KK_1)$  ein Büschel von Kreisen  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1)$  verwandt ist; die verwandte Gerade  $\mathfrak{s}$  ist die Potenzlinie des letzteren. Dem Punkte  $P$  ist ein Punkt  $\mathfrak{P}$  auf ihr verwandt. Die Berührungspunkte der von  $\mathfrak{P}$  an  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1)$  gezogenen Tangenten liegen auf einem Kreise  $\mathfrak{M}$ , also liegen die verwandten Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $M$ .

Da  $\mathfrak{P}$  und  $g_\infty$  Pol und Polare für  $\mathfrak{M}$  sind, so müssen  $P$  und  $s_1$  Pol und Polare für  $M$  sein; da ferner  $\mathfrak{M}$  die Potenzlinie in zwei Punkten schneidet, die für alle Kreise  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1)$  konjugiert sind, so muß auch  $M$  die Sekante  $s$  in zwei solchen Punkten schneiden, die für alle Kegelschnitte  $(KK_1)$  konjugiert sind.

Der Kreis  $\mathfrak{M}$  geht durch die Kreispunkte auf  $g_\infty$ , also muß  $M$  durch die verwandten Punkte auf  $s_1$  gehen; diese sind aber die Doppelpunkte der Involution konjugierter Punkte bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels  $(KK_1)$ .

395. Der Satz in 394. ist nur für den Fall eines Kegelschnittbüschels mit vier imaginären Grundpunkten bewiesen. Um ihn auch für den Fall abzuleiten, daß zwei Grundpunkte reell und zwei imaginär sind, muß man auf die Eigenschaften der Kreisbüschel zurückgehen.

Die Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ , welche keinen gemeinschaftlichen Punkt haben sollen, konstituieren ein Büschel  $(\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1)$  mit der



Potenzlinie  $p$  und der Centrale  $m$ ; die Kreise des konjugierten Büschels  $(\mathfrak{M}\mathfrak{M}_1)$  haben  $p$  zur Centrale (33) und schneiden  $m$  in denjenigen beiden Punkten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{R}$ , welche die auf  $m$  liegenden Durchmesser harmonisch teilen. Nimmt man  $\mathfrak{Q}$  zum Centrum einer harmonischen Verwandtschaft und legt die Axe  $q$  durch  $\mathfrak{R}$  parallel zu  $p$ , so sind die Kreise des Büschels  $(\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1)$  sich selbst verwandt, denn  $\mathfrak{Q}$  und  $q$  sind für alle diese Kreise Pol und Polare. Der Potenzlinie  $p$  ist  $g_\infty$  verwandt, denn  $p$  halbiert senkrecht die Strecke  $\mathfrak{Q}\mathfrak{R}$  und den Kreisen des Büschels  $(\mathfrak{M}\mathfrak{M}_1)$  sind Kegelschnitte verwandt. Der Kreis um  $\mathfrak{M}$  geht durch die Berührungspunkte der von  $\mathfrak{M}$  an die Kreise des Büschels  $(\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1)$  gezogenen Tangenten und durch die Punkte  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{R}$ , also geht der ihm verwandte Kegelschnitt  $M$  durch die Berührungspunkte der aus dem auf  $g_\infty$  liegenden und zu  $\mathfrak{M}$  verwandten Punkte  $M_\infty$  an die Kegelschnitte  $(\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1)$  gezogenen Tangenten. Da der Kreis  $\mathfrak{M}$  von  $p$  in zwei reellen Punkten geschnitten wird, so ist der verwandte Kegelschnitt  $M$  eine Hyperbel. Der Kreis  $\mathfrak{M}$  werde von  $p$  in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  geschnitten; der Pol von  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  in Bezug auf  $\mathfrak{M}$  ist der Schnittpunkt  $\mathfrak{P}_\infty$  von  $g_\infty$  mit der Centrale  $m$ ; der ihm verwandte Punkt ist der Halbierungspunkt  $O$  von  $\mathfrak{Q}\mathfrak{R}$  und da  $g_\infty$  und  $p$  oder  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  verwandte Gerade sind, so muß  $O$  der Mittelpunkt der Hyperbel  $M$  sein. Die Geraden  $\mathfrak{Q}\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{Q}\mathfrak{B}$  stehen aufeinander senkrecht; sie sind sich selbst verwandt und schneiden  $g_\infty$  in ihren beiden Schnittpunkten  $A_\infty$  und  $B_\infty$  mit  $M$ . Also sind die Geraden  $OA_\infty$  und  $OB_\infty$  die Asymptoten der Hyperbel  $M$  und weil sie aufeinander senkrecht stehen, ist die Hyperbel eine gleichseitige.

Von dem auf  $g_\infty$  liegenden Punkte  $M_\infty$  sei eine Tangente an einen Kreis des Büschels  $(\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1)$ , etwa  $\mathfrak{R}_0$  gezogen und berühre in  $\mathfrak{C}_0$ . Durch  $\mathfrak{C}_0$  geht ein Kreis des Büschels  $(\mathfrak{M}\mathfrak{M}_1)$ , etwa  $\mathfrak{M}_0$  und da  $\mathfrak{R}_0$  und  $\mathfrak{M}_0$  sich rechtwinklig schneiden, so berührt  $\mathfrak{M}_0$  in  $\mathfrak{C}_0$  die zur Tangente  $M_\infty\mathfrak{C}_0$  gezogene Senkrechte, welche  $g_\infty$  in  $M'_\infty$  schneidet. Die Gerade  $M'_\infty\mathfrak{C}_0$  ist Tangente des Kreises  $\mathfrak{M}_0$ . Daraus folgt also, daß die Berührungspunkte der von  $M_\infty$  an die Kreise des Büschels  $(\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1)$  gezogenen Tangenten mit den Berührungspunkten der von  $M'_\infty$  an die Kreise des Büschels  $(\mathfrak{M}\mathfrak{M}_1)$  gezogenen Tangenten zu-



sammenfallen. Denn alle Tangenten von  $M_\infty$  sind einander parallel und ebenso alle von  $M'_\infty$  und die Richtung der letzteren ist rechtwinklig zu derjenigen der ersteren.

Alle Kreise ( $\mathfrak{M}\mathfrak{M}_1$ ) gehen durch die beiden auf  $g_\infty$  liegenden Kreispunkte, also müssen alle verwandten Hyperbeln ( $MM_1$ ) durch die diesen verwandten Punkte auf  $p$  gehen, d. h. die Involution auf  $p$ , welche der Involution konjugierter Punkte auf  $g_\infty$  in Bezug auf irgend einen Kreis verwandt ist, als Involution konjugierter Punkte haben. Alle gleichseitigen Hyperbeln ( $MM_1$ ) bilden also ein Büschel mit zwei imaginären und zwei reellen Grundpunkten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{R}$ .

Man hat also das Resultat:

*Zieht man von einem im Unendlichen gelegenen Punkte Tangenten an die Kreise eines Büschels, so liegen die Berührungspunkte auf einer gleichseitigen Hyperbel. Durchläuft jener Punkt die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$ , so durchläuft die gleichseitige Hyperbel ein Büschel mit zwei reellen und zwei imaginären Schnittpunkten. Diese sind die Doppelpunkte der Involutionen, welche das Kreisbüschel und das ihm konjugierte Kreisbüschel auf der Centrale und Potenzlinie des ersteren bestimmen. Zieht man aus den Punkten eines Paares derjenigen Involution auf  $g_\infty$ , welche die konjugierten Punkte bezüglich irgend eines Kreises auf derselben bilden, Tangenten und zwar von dem einen Punkte an das ursprüngliche, von dem andern an das konjugierte Kreisbüschel, so liegen alle Berührungspunkte auf derselben gleichseitigen Hyperbel.*

Daraus aber ergibt sich vermittelt einer harmonischen Verwandtschaft:

*Zieht man von einem Punkte  $M$  einer der beiden gemeinschaftlichen Sekanten eines Kegelschnittbüschels ( $B$ ) mit zwei reellen und zwei imaginären Schnittpunkten Tangenten an die Kegelschnitte des Büschels, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte. Durchläuft  $M$  die gemeinsame Sekante, so durchläuft dieser Kegelschnitt ein Büschel mit zwei reellen und zwei imaginären Grundpunkten. Ist ( $S$ ) das Büschel, welches man erhält, wenn  $M$  die reelle Sekante durchläuft, und sind  $A$  und  $A'$  zwei konjugierte Punkte auf der ideellen Sekante bezüglich des Büschels ( $B$ ), so liegen die Berührungspunkte der Tangenten*



von  $A$  an die Kegelschnitte des letzteren mit denjenigen von  $A'$  an die des Büschels ( $S$ ) auf demselben Kegelschnitte.

396. Unter den Kegelschnitten eines Büschels mit vier reellen Grundpunkten, von denen keiner innerhalb des von den anderen gebildeten Dreiecks liegt, gibt es eine Gruppe von Ellipsen, zwei Parabeln und eine Gruppe von Hyperbeln, in welcher eine einzige gleichseitige Hyperbel vorkommt.

Die Gegenseitenpaare eines konvexen Vierecks  $ABCD$  mögen sich in  $E$  und  $F$  schneiden. Zieht man durch  $F$  zu




Fig. 157.

$EA$  und  $ED$  Parallelen, so liegen sie außerhalb des Winkels  $AFB$  und die Gegenseitenpaare schneiden daher jede, also auch die unendlich ferne Gerade, in zwei Punktpaaren, welche eine Involution mit reellen Doppelpunkten konstituieren. Da diese Involution mit derjenigen identisch ist, in welcher

die Kegelschnitte des Büschels  $K(ABCD)$  die unendlich ferne Gerade schneiden (356), so ergibt sich zunächst, daß es unter den Kegelschnitten des Büschels unendlich viele Hyperbeln und zwei Parabeln gibt, deren Berührungspunkte mit  $g_\infty$  die Doppelpunkte der Involution auf  $g_\infty$  sind.

Ist  $H$  der Schnittpunkt der Höhen in einem der Dreiecke, deren Ecken irgend drei von den Ecken des Vierecks sind, so geht durch ihn ein Kegelschnitt des Büschels, der nach 194. und 309. eine gleichseitige Hyperbel sein muß und daher auch durch die Höhenpunkte der anderen Dreiecke geht.

Alle diejenigen Kegelschnitte, welche  $g_\infty$  nicht treffen, sind Ellipsen.

397. Die Kegelschnitte eines Büschels mit vier reellen Grundpunkten, von denen einer innerhalb des von den anderen gebildeten Dreiecks liegt, sind lauter Hyperbeln. Unter ihnen gibt es eine gleichseitige.

Sind  $ABCD$  vier Punkte einer Ellipse oder Parabel, so liegt jeder außerhalb des von den drei anderen gebildeten



Dreiecks, da jedes einer Ellipse oder Parabel eingeschriebene Dreieck ganz innerhalb des Kegelschnittes liegt. Daher giebt es in dem Büschel, dessen Grundpunkte ein konkaves Viereck bilden, nur Hyperbeln, unter denen eine gleichseitige vorkommt (194. 309), welche durch die Höhenpunkte der vier Dreiecke geht, deren Ecken je drei von den Grundpunkten sind.

398. *Sind in einem Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten zwei gleichseitige Hyperbeln enthalten, so besteht es aus lauter gleichseitigen Hyperbeln, deren Mittelpunkte sämtlich auf einem Kreise liegen.*

Wenn  $ABCD$  die vier Grundpunkte des Büschels sind und es kommen in demselben zwei gleichseitige Hyperbeln vor, so muß nach 194. und 309. jeder der Grundpunkte der Höhenpunkt des von den drei anderen gebildeten Dreiecks sein. Jeder Kegelschnitt durch  $ABCD$  ist also eine gleichseitige Hyperbel.

Der Polarkegelschnitt der unendlich entfernten Geraden  $g_\infty$  geht (cf. 360) durch die Scheitel der drei Geradenpaare des Büschels, welche hier die Höhenfußpunkte sind, und durch die Mitten der Verbindungsstrecken, also durch die Mitten der Seiten und die Mitten derjenigen Abschnitte der Höhen, welche durch die Ecken begrenzt sind. Diese neun Punkte liegen aber auf dem Feuerbachschen Kreise, welcher somit die Mittelpunkte aller gleichseitigen Hyperbeln enthält.

399. *Ein Kegelschnittbüschel mit zwei reellen und zwei imaginären Grundpunkten enthält entweder lauter Hyperbeln oder eine Gruppe von Ellipsen zwei Parabeln und eine Gruppe von Hyperbeln, in jedem Falle aber eine gleichseitige Hyperbel.*

Ein Büschel von Kegelschnitten mit zwei reellen und zwei imaginären Grundpunkten läßt sich durch harmonische Verwandtschaft stets in ein Kreisbüschel verwandeln. Die Mittellinie  $m$  der Verwandtschaft schneidet entweder die gemeinschaftliche Sehne selbst oder ihre Verlängerung.

Im ersten Falle wird sie von allen Kreisen des Büschels getroffen und da ihr die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$  verwandt ist, so schneidet diese jeden Kegelschnitt des Büschels; also sind alle Kegelschnitte desselben Hyperbeln.



Im zweiten Falle wird  $m$  von einer Gruppe der Kreise geschnitten, von zwei Kreisen berührt, von einer andern Gruppe nicht getroffen. Diesen Gruppen sind verwandt eine Gruppe von Hyperbeln, zwei Parabeln, eine Gruppe von Ellipsen.

Verbindet man das Centrum  $S$  der Verwandtschaft mit den Schnittpunktpaaren der Kreise und der Mittellinie  $m$ , so erhält man in  $S$  eine Involution. Diese hat ein rechtwinkliges Strahlenpaar. Den Paaren zugeordneter Strahlen der Involution sind die Asymptoten der Hyperbeln parallel; da es nur ein rechtwinkliges Strahlenpaar giebt, so giebt es auch nur eine gleichseitige Hyperbel.

400. *Ein Kegelschnittbüschel mit vier imaginären Grundpunkten enthält eine Gruppe Ellipsen, zwei Parabeln und eine Gruppe Hyperbeln.*

Ein Kegelschnittbüschel mit vier imaginären Grundpunkten läßt sich durch harmonische Verwandtschaft stets in ein Kreisbüschel verwandeln. Die Mittellinie  $m$  der Verwandtschaft trifft nur einen Teil der Kreise, also wird die ihr verwandte unendlich ferne Gerade auch nur von einem Teile der Kegelschnitte des Büschels getroffen. Diese Kegelschnitte sind also Hyperbeln, welche auf  $g_\infty$  eine Involution bestimmen, die zwei reelle Doppelpunkte hat, denn  $m$  wird von den Kreisen des Büschels in einer Involution geschnitten, die stets zwei reelle Doppelpunkte hat. In den Doppelpunkten wird  $g_\infty$  von zwei Parabeln des Büschels berührt. Denjenigen Kreisen, welche  $m$  nicht treffen, sind Ellipsen des Büschels verwandt.

401. *Wenn in einem Kegelschnittbüschel ein Kreis vorkommt, so stehen die Axen der beiden Parabeln des Büschels auf einander senkrecht.*

I. Fall. Das Büschel hat vier reelle Grundpunkte  $ABCD$ . Fig. 158.

Die beiden Gegenseitenpaare  $AB$ ,  $CD$  und  $AD$ ,  $BC$  schneiden sich in  $E$  und  $F$ ; zieht man  $FG \parallel AB$  und  $FH \parallel CD$ , so ist

$$\sphericalangle CFG = CDA = 180^\circ - B$$

$$\sphericalangle DFH = B = 180^\circ - CDA,$$

also

$$\sphericalangle CFG + DFH = 180^\circ.$$



Halbiert man die Winkel  $GFH$  und  $AFB$  durch  $FJ$  und  $FK$  so folgt aus:

$$\sphericalangle GFH + 2HFD + DFC = 180^\circ$$

dafs

$$\sphericalangle JFH + HFD + DFK = 90^\circ.$$




Fig. 158.

Also sind  $F(JKGH)$  und  $F(JKCD)$  harmonisch. Die rechtwinkligen Geraden  $FJ$  und  $FK$  schneiden daher  $g_\infty$  in den Doppelpunkten derjenigen Involution, welche die Kegelschnitte des Büschels auf ihr bestimmen, und sind den Axen der beiden Parabeln parallel.

II. Fall. Das Büschel hat zwei oder vier imaginäre Grundpunkte.

Man verwandle das Büschel in ein Büschel von Kreisen durch eine harmonische Verwandtschaft mit dem Centrum  $S$  und der Axe  $s$ . Soll in dem Kegelschnittbüschel ein Kreis vorkommen, so müssen  $S$  und  $s$  für diesen Kreis Pol und Polare sein. Die Mittellinie  $m$  der Verwandtschaft wird von der Potenzlinie des Kreisbüschels in  $Q$  getroffen, dem Centralpunkte der Involution, welche die Kreise des Büschels auf  $m$  bestimmen. Um die Doppelpunkte dieser Involution zu konstruieren, ziehe man von  $Q$  an einen der Kreise des Büschels eine Tangente  $QC$  und beschreibe mit ihr um  $Q$  einen Kreis. Dieser schneidet  $m$  in den Doppelpunkten  $M$  und  $N$ .

Wenn man  $S$  als einen Punktkreis betrachtet, so konstituieren  $S$  und der Kreis  $O$  ein Kreisbüschel, dessen Mittel-



Linie  $m$  ist. Daher ist  $QC = QS$  und der vorhin mit  $QC$  um  $Q$  beschriebene Kreis geht auch durch  $S$  und es sind die Geraden  $MS$  und  $NS$  rechtwinklig zu einander.




Fig. 159.

In der harmonischen Verwandtschaft ( $Ss$ ) sind sie sich selbst verwandt und treffen  $g_\infty$  in den Doppelpunkten der Involution, welche die Kegelschnitte des Büschels auf  $g_\infty$  bestimmen; sie sind deshalb die Axen der Parabeln des Büschels.

402. Wenn in einem Kegelschnittbüschel mit imaginären Grundpunkten zwei gleichseitige Hyperbeln vorkommen, so besteht es aus lauter gleichseitigen Hyperbeln.

I. Die Hyperbeln des Büschels schneiden  $g_\infty$  in den Punktpaaren einer Involution; dieselbe Involution erhält man auch, wenn man von einem beliebigen Punkte Parallelen zu den Asymptoten zieht. Da zwei Paar solcher Parallelen rechtwinklig sind, so wird die Strahleninvolution aus lauter rechtwinkligen Paaren, das Kegelschnittbüschel aus lauter gleichseitigen Hyperbeln bestehen.

II. Um ein Büschel gleichseitiger Hyperbeln aus einem Kreisbüschel mit zwei reellen Grundpunkten durch harmonische Verwandtschaft zu erhalten, schneide man das Kreisbüschel durch eine Gerade  $m$ , welche zwischen den beiden reellen Grundpunkten hindurchgeht. Man erhält dadurch auf  $m$  eine



Involution mit imaginären Doppelpunkten und daher giebt es einen Punkt  $S$ , aus welchem die Punktpaare der Involution durch rechtwinklige Strahlenpaare projiciert werden. Nimmt man  $S$  als Centrum und  $m$  als Mittellinie der Verwandtschaft, so ist jedem Kreise eine gleichseitige Hyperbel verwandt.

III. Zwei Kreise, die keinen reellen Schnittpunkt haben, lassen sich durch harmonische Verwandtschaft nicht in gleichseitige Hyperbeln verwandeln. Denn jede Gerade wird von dem durch die beiden Kreise bestimmten Büschel in einer Involution mit reellen Doppelpunkten geschnitten, deren Punktpaare also von keinem Punkte aus durch rechtwinklige Strahlenpaare projiciert werden können. Daraus aber folgt:

*Zwei gleichseitige Hyperbeln haben mindestens zwei reelle Schnittpunkte.*

403. *Legt man durch zwei reelle oder zwei konjugiert imaginäre Grundpunkte eines Kegelschnittbüschels einen beliebigen Kegelschnitt, so treffen sich die reellen oder ideellen gemeinschaftlichen Sekanten, welche seine beiden anderen Schnittpunkte mit den Kegelschnitten des Büschels verbinden, in einem Punkte derjenigen gemeinschaftlichen Sekante des Büschels, welche durch die anderen Grundpunkte geht.*

Es seien  $K_1 K_2 K_3 \dots$  die Kegelschnitte des Büschels,  $ss'$  zwei solche gemeinschaftliche Sekanten, welche einen Kegelschnitt des Büschels bilden. Durch die beiden auf  $s$  liegenden reellen oder imaginären Grundpunkte des Büschels lege man einen Kegelschnitt  $K_0$ , welcher mit den Kegelschnitten  $K_1 K_2 K_3 \dots$  noch die reellen oder ideellen gemeinschaftlichen Sekanten  $s_{01} s_{02} s_{03} \dots$  gemein hat; so daß die Geradenpaare  $ss_{01}$ ,  $ss_{02}$ ,  $ss_{03}$ , ... Kegelschnitte der Büschel  $(K_0 K_1)$ ,  $(K_0 K_2)$ ,  $(K_0 K_3)$ , ... sind.

Die Sekante  $s_{01}$  schneide  $s'$  in  $P'$ ; durch  $P'$  lege man eine Gerade  $g$ , welche die Kegelschnitte

$K_0, K_1, K_2, K_3, \dots$  und die Sekante  $s$   
in  $Q_0 Q_0', Q_1 Q_1', Q_2 Q_2', Q_3 Q_3', \dots$  und in  $P$   
schneidet. Dann sind

$PP', Q_0 Q_0', Q_1 Q_1'; PP', Q_1 Q_1', Q_2 Q_2'; PP', Q_1 Q_1', Q_3 Q_3'; \dots$   
je drei Punktpaare einer Involution, also liegt  $P'$  auch auf  $s_{02}, s_{03}, \dots$



404. *Legt man aus zwei konjugierten Punkten  $P$  und  $P_1$  einer reellen oder ideellen gemeinschaftlichen Sekante eines Kegelschnittbüschels Tangenten an die Kegelschnitte desselben, so liegen die Berührungspunkte auf zwei Kegelschnitten  $\pi$  und  $\pi_1$ , welche jede durch  $P$  oder  $P_1$  gelegte Gerade in vier harmonischen Punkten schneiden, so daß sowohl die Schnittpunkte mit  $\pi$  als diejenigen mit  $\pi_1$  zugeordnet sind.*

I. Es seien  $P$  und  $P_1$  zwei konjugierte Punkte der ideellen Sekante  $s$  eines Kegelschnittbüschels ( $KK_1K_2\dots$ ) mit vier imaginären Grundpunkten.

Man verwandle durch harmonische Verwandtschaft das Kegelschnittbüschel in ein Kreisbüschel ( $\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1\mathfrak{K}_2\dots$ ). Den Punkten




Fig. 160.

$P$  und  $P_1$  sind die bezüglich des Kreisbüschels konjugierten Punkte  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  verwandt, welche auf einer ideellen Sekante desselben liegen müssen, entweder auf der endlichen Sekante, d. i. der Potenzlinie oder auf der unendlich fernen Geraden.

Zunächst werde angenommen, daß  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  auf der endlichen Sekante  $s$  liegen. Um  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  beschreibe man diejenigen beiden Kreise, welche die Kreise des Büschels recht-



winklig schneiden. Da nun auf einer beliebig durch  $\mathfrak{P}$  gezogenen Geraden  $\mathfrak{P}\mathfrak{A}^2 = \mathfrak{P}\mathfrak{B}^2 = \mathfrak{P}\mathfrak{C}^2 = \mathfrak{P}\mathfrak{B}_1 \cdot \mathfrak{P}\mathfrak{C}_1$ , weil die Polare von  $\mathfrak{P}_1$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  durch  $\mathfrak{P}$  und die Schnittpunkte der Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  geht, so sind  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1$  harmonische Punkte.

Wenn  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  auf  $g_\infty$  liegen, so konstruiere man auf der Centrale des Kreisbüschels diejenigen beiden Punkte  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{R}$ , welche bezüglich des Büschels konjugiert sind, wähle einen von ihnen, etwa  $\mathfrak{Q}$ , zum Centrum und die Potenzlinie  $\mathfrak{s}$  zur Mittellinie einer harmonischen Verwandtschaft, so sind die Kreise  $\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1 \dots$  sich selbst verwandt, denn Centrum und Axe der Verwandtschaft sind Pol und Polare für alle Kreise des Büschels ( $\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1$ ), sollen aber mit  $\mathfrak{K}'\mathfrak{K}_1'$  . . . bezeichnet werden. Das Büschel ( $\mathfrak{K}'\mathfrak{K}_1'$ ) hat zur Potenzlinie die der unendlich fernen Geraden verwandte Gerade  $\mathfrak{s}'$ ; den konjugierten Punkten  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$  des Büschels ( $\mathfrak{K}\mathfrak{K}'$ ) sind die konjugierten Punkte  $\mathfrak{P}'$  und  $\mathfrak{P}_1'$  des Büschels ( $\mathfrak{K}'\mathfrak{K}_1'$ ) verwandt. Zieht man um diese die rechtwinklig schneidenden Kreise, so wird jede Gerade durch  $\mathfrak{P}'$  oder  $\mathfrak{P}_1'$  von beiden Kreisen in harmonischen Punkten geschnitten. Diesen Kreisen sind gleichseitige Hyperbeln verwandt und da die harmonische Beziehung bei der harmonischen Verwandtschaft erhalten bleibt, so folgt, daß jede durch  $\mathfrak{P}$  oder  $\mathfrak{P}_1$  gezogene Gerade von den beiden gleichseitigen Hyperbeln harmonisch geteilt wird.

Hieraus folgt zunächst:

*Zieht man von zwei konjugierten Punkten eines Kreisbüschels, welches keine reellen Grundpunkte hat, Tangenten an die Kreise, so liegen die Berührungspunkte auf zwei Kreisen oder auf zwei gleichseitigen Hyperbeln von der Beschaffenheit, daß sie jede durch einen der beiden Punkte gelegte Gerade in vier harmonischen Punkten schneiden.*

Hieraus aber folgt für den Fall von vier imaginären Grundpunkten eines Kegelschnittbüschels der Satz.

II. Es seien im zweiten Falle  $P$  und  $P_1$  zwei auf der ideellen Sekante liegende konjugierte Punkte eines Kegelschnittbüschels ( $KK_1$ ) mit zwei reellen Grundpunkten  $A$  und  $B$ . Diesem sei ein Kreisbüschel ( $\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1$ ) mit den reellen Grundpunkten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  harmonisch verwandt. Zieht man aus einem



der verwandten Punkte  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{P}_1$ , die im Unendlichen liegen müssen, etwa aus  $\mathfrak{P}_1$  Tangenten an die Kreise des Büschels, so liegen die Berührungspunkte auf einer gleichseitigen Hyperbel. Man erhält diese aber auch als Ort der Berührungspunkte der an die Kreise des konjugierten Büschels  $(\mathfrak{M} \mathfrak{M}_1)$  gelegten Tangenten. Denn ist  $\mathfrak{C}$  der Berührungspunkt der Tangente  $\mathfrak{P}\mathfrak{C}$  an  $\mathfrak{K}$ , so giebt es im Büschel  $(\mathfrak{M} \mathfrak{M}_1)$  einen Kreis  $\mathfrak{M}$ , welcher  $\mathfrak{K}$  in  $\mathfrak{C}$  rechtwinklig schneidet, also  $\mathfrak{P}_1\mathfrak{C}$  zur Tangente hat. Das Büschel  $(\mathfrak{M} \mathfrak{M}_1)$  hat keine Grundpunkte, also wird jede durch  $\mathfrak{P}$  oder  $\mathfrak{P}_1$  gelegte Gerade von den beiden Hyperbeln harmonisch geschnitten.

Daraus folgt zunächst für Kreisbüschel:

*Zieht man aus zwei im Unendlichen liegenden konjugierten Punkten eines Kreisbüschels mit reellen Grundpunkten Tangenten an die Kreise, so liegen die Berührungspunkte auf zwei gleichseitigen Hyperbeln, welche jede durch einen der beiden Punkte gelegte Gerade harmonisch schneiden.*

Mittelst der harmonischen Verwandtschaft folgt hieraus der oben aufgestellte Satz für Kegelschnittbüschel mit zwei reellen und zwei imaginären Grundpunkten.

## § 26.

### Die Kegelschnittschar mit zwei und vier imaginären Tangenten.

405. *Es giebt stets zwei reelle Punkte, denen bei zwei Kegelschnitten mit zwei oder vier imaginären gemeinschaftlichen Tangenten dieselbe Involution konjugierter Strahlen angehört.*




Fig. 161.

Zwei beliebige Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$  verwandle man durch harmonische Verwandtschaft in zwei Kreise  $\mathfrak{K}_1$  und  $\mathfrak{K}_2$ . Diese haben zwei Ähnlichkeitspunkte  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{S}$ , in denen sich die reellen oder imaginären Tangenten



schneiden. Die verwandten Punkte  $A$  und  $J$  haben dieselbe Involution konjugierter Strahlen für beide Kegelschnitte.

Es sei  $g$  eine beliebige Gerade durch  $J$ ,  $g$  die verwandte Gerade durch  $\mathfrak{S}$ ; sie schneide die Kreise  $\mathfrak{K}_1$  und  $\mathfrak{K}_2$  in  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1$  und  $\mathfrak{A}_2\mathfrak{B}_2$ . Die Tangenten in diesen Punkten treffen sich in  $\mathfrak{C}_1$  und  $\mathfrak{C}_2$ . Da  $\mathfrak{S}$  ein Ähnlichkeitspunkt beider Kreise ist, so ist  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{C}_1 \parallel \mathfrak{A}_2\mathfrak{C}_2$ ,  $\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1 \parallel \mathfrak{B}_2\mathfrak{C}_2$  und deshalb sind  $\mathfrak{C}_1$  und  $\mathfrak{C}_2$  ähnlich liegende Punkte, also  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}_2\mathfrak{S}$  in einer Geraden. Diese ist aber die konjugierte Gerade  $g_1$  zu  $g$  bezüglich beider Kreise  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ . Ihr ist die zu  $g$  bezüglich beider Kegelschnitte konjugierte Gerade  $g_1$  verwandt.

406. Alle Kegelschnitte, welche in zwei festen Punkten dieselbe Involution konjugierter Strahlen haben, bilden eine *Kegelschnittschar*.

Dieselbe hat vier reelle oder zwei reelle und zwei imaginäre oder vier imaginäre gemeinschaftliche Tangenten, je nachdem die beiden Involutionen zwei oder nur eine oder keine reellen Doppelstrahlen haben.

*Zwei beliebige Kegelschnitte bestimmen eine Schar. (405.)*

407. *Zwei Kegelschnitte, welche zwei oder vier imaginäre Tangenten haben, kann man durch harmonische Verwandtschaft in konfokale Kegelschnitte mit derselben Lage der Hauptaxe verwandeln.*

Ist  $J$  ein Schnittpunkt zweier konjugiert-imaginären gemeinschaftlichen Tangenten, so hat er für beide Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  nach 405. dieselbe Involution konjugierter Strahlen. Schneidet man diese durch eine beliebige Gerade  $g$  in den Punktpaaren einer Punktinvolution und beschreibt über den Abständen je zweier Punkte eines Paares Kreise, so müssen sich diese in zwei Punkten  $S$  und  $S_1$  schneiden. Wählt man  $S$  als Centrum und  $g$  als Mittellinie der Verwandtschaft, so ist der Involution konjugierter Strahlen in  $J$  eine circulare Involution in  $\mathfrak{S}$  verwandt. Daher ist  $\mathfrak{S}$  der gemeinsame Brennpunkt der verwandten Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ .

Der Schnittpunkt der beiden anderen reellen oder imaginären Tangenten sei  $A$ ; es ist dann  $AJ$  eine Seite des gemeinschaftlichen Poldreiecks beider Kegelschnitte, deren Gegenecke  $P$  sei. Legt man die Mittellinie  $g$  der Verwandtschaft



durch  $P$ , so fällt der verwandte Punkt  $\mathfrak{P}$  ins Unendliche und weil die konjugierten Strahlen  $\mathfrak{S}\mathfrak{U}$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{P}$  aufeinander senkrecht stehen, so wird  $\mathfrak{S}\mathfrak{U}$  die gemeinschaftliche Hauptaxe von  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ .

408. Die Pole einer Geraden  $g$  in Bezug auf alle konfokalen Kegelschnitte die ihre Hauptaxen auf derselben Geraden haben, liegen auf einer Geraden  $g_1$ .

I.  $K_1$  und  $K_2$  seien zwei konfokale Kegelschnitte mit dem gemeinschaftlichen Brennpunkte  $B$  und gemeinschaftlicher




Fig. 162.

Hauptaxe. Sie mögen noch zwei reelle gemeinschaftliche Tangenten  $t$  und  $t'$  haben, die sich in  $A$  auf der Hauptaxe schneiden.

Senkrecht gegen die Hauptaxe lege man beliebig die Gerade  $l$  und nehme sie als Leitlinie eines Kegelschnittes  $K$ , der  $B$  zum Brennpunkte und  $tt'$  zu Tangenten hat. Eine dieser Tangenten  $t$  schneide  $l$  in  $C$ ; zieht man  $CB$  und in  $B$  die Senkrechte zu  $CB$ , so trifft sie  $t$  im Berührungspunkte  $D$  mit  $K$ . Den Berührungspunkt  $D'$  auf  $t'$  erhält man, wenn man  $AD' = AD$  macht.

Legt man  $l_0$  durch  $B$  senkrecht zur Hauptaxe, so fallen die Berührungspunkte  $D_0$  und  $D'_0$  mit  $A$  zusammen und der Kegelschnitt  $K_0$  degeneriert in das Punktpaar  $(AB)$ .

Es seien  $l_m$  und  $l_n$  zwei zur Hauptaxe senkrechte Leitlinien, welche die Kegelschnitte  $K_m$  und  $K_n$  bestimmen, so gewählt, daß sie  $l$  und  $l_0$  harmonisch trennen.



Eine Gerade  $g$  schneide  $l_0 l l_m l_n$  in  $P_0 P P_m P_n$  und die Berührungssehnen mit  $tt'$  in  $Q_0 Q Q_m Q_n$ , so sind  $P_0 P P_m P_n$  sowie  $Q_0 Q Q_m Q_n$  harmonisch. Zu beachten ist, daß  $Q_0$  der Schnittpunkt von  $g$  mit der in  $A$  errichteten Senkrechten ist.

Man erhält die Polaren von  $P_0 P P_m P_n$  in Bezug auf  $K_0 K K_m K_n$ , indem man diese Punkte mit  $B$  verbindet und auf den Verbindungslinien in  $B$  die Senkrechten  $p_0 p p_m p_n$  errichtet, die auch harmonisch sind und von denen  $p_0$  mit  $AB$  zusammenfällt. — Um bezüglich derselben Kegelschnitte die Polaren von  $Q_0 Q Q_m Q_n$  zu konstruieren, verbinde man diese Punkte mit  $A$  und suche zu den Verbindungslinien bezüglich  $tt'$  die harmonischen Gegenstrahlen  $q_0 q q_m q_n$ , so sind auch diese harmonisch und zwar fällt  $q_0$  mit  $AB$  zusammen. Die Schnittpunkte  $(p_0 q_0)$ ,  $(pq)$ ,  $(p_m q_m)$ ,  $(p_n q_n)$  sind die Pole von  $g$  für  $K_0$ ,  $K$ ,  $K_m$ ,  $K_n$  und müssen in einer Geraden  $g_1$  liegen, weil die beiden Strahlen  $p_0$  und  $q_0$  der harmonischen Büschel  $(p_0 p p_m p_n)$  und  $(q_0 q q_m q_n)$  in eine Gerade zusammenfallen.

Läßt man  $P_m$  und  $P_n$  die Gerade  $g$  so durchlaufen, daß sie  $P_0$  und  $P$  harmonisch trennen, so findet man andere Leitlinien  $l_m$  und  $l_n$  und andere Kegelschnitte  $K_m$  und  $K_n$ , in Bezug auf welche aber die Pole von  $g$  auf  $g_1$  liegen müssen, weil letztere Gerade durch die festen Punkte  $(p_0 q_0)$  und  $(pq)$  geht.

II. Im zweiten Falle werde angenommen, daß die konfokalen Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$  mit gemeinschaftlicher Hauptaxe keine reellen gemeinschaftlichen Tangenten haben, sondern noch zwei imaginäre, welche ersetzt werden durch eine gemeinschaftliche Involution konjugierter Strahlen in  $A$ .

Wie im ersten Falle bestimmt eine zur Hauptaxe senkrechte Gerade  $l$  als Leitlinie einen Kegelschnitt  $K$ , der  $B$  zum Brennpunkte und in  $A$  dieselbe Involution konjugierter Strahlen hat, wie  $K_1$  und  $K_2$ . Statt der Berührungspunkte auf den reellen Tangenten konstruiere man die Polare von  $A$ . — Zu dem Zwecke sei  $q$  eine beliebige Gerade durch  $A$ ,  $q_1$  der ihr konjugierte Strahl, so muß auf  $q_1$  der Pol von  $q$  liegen. Es schneide  $q$  die Leitlinie  $l$  in  $R$ , so muß auf der Polare von  $R$  auch der Pol von  $q$  liegen. Diese Polare erhält man aber, wenn man  $RB$  und darauf in  $B$  die Senkrechte zieht; diese



schneidet  $q_1$  im Pol  $Q$  von  $q$ . Die Senkrechte von  $Q$  zur Hauptaxe ist die Polare von  $A$ .

Der übrige Teil des Beweises ergibt sich wie in I.

409. *Die Pole einer Geraden  $g$  in Bezug auf die Kegelschnitte einer Schar liegen auf einer Geraden  $g_1$ ;  $g$  und  $g_1$  heißen konjugierte Gerade der Schar.*

I. Für den Fall, daß die Schar zwei oder vier imaginäre gemeinschaftliche Tangenten hat, folgt der Satz aus 407. und 408; im Falle von vier gemeinschaftlichen Tangenten ist er schon in 368. bewiesen.

II. Der aufgestellte Satz läßt sich jedoch gleichmäßig für alle drei Fälle in folgender Art beweisen.

In  $A$  und  $J$  seien zwei gemeinschaftliche Strahleninvolutionen der Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$ ; der Schnittpunkt  $M$  der beiden Strahlen beider Involutionen, welche der Geraden  $AJ$  konjugiert sind, ist der Pol von  $AJ$  für beide Kegelschnitte. Durch  $M$  lege man eine beliebige Gerade  $a$ , welche für einen Kegelschnitt  $K$  der Schar die Polare von  $A$  sein soll, so ist dadurch dieser Kegelschnitt bestimmt, denn man kennt auf  $a$  die Involution konjugierter Punkte.

Zunächst läßt sich die Polare von  $J$  in Bezug auf den gesuchten Kegelschnitt bestimmen. Sind nämlich  $i_1 i_2$  zwei konjugierte Strahlen durch  $J$  und schneidet  $i_1$  die Gerade  $a$  in  $A_1$ , so konstruiere man zu  $A_1$  die Polare, welche der zu  $A_1 A$  konjugierte Strahl in  $A$  ist; diese schneidet  $i_2$  im Pol  $J_1$  von  $i_1$ . Wenn man in gleicher Weise den Pol  $J_2$  von  $i_2$  sich konstruiert denkt, so hat man  $J_1 J_2$  als Polare  $i$  von  $J$ .

Die beiden Geraden  $a$  und  $i$  mögen  $g$  in  $P$  und  $Q$  schneiden; zieht man  $PA$  und  $QJ$ , so sind die zu diesen Geraden konjugierten Strahlen in  $A$  und  $J$  die Polaren von  $P$  und  $Q$ , welche sich im Pol  $R$  von  $g$  in Bezug auf  $K$  schneiden.

Man lege die Polare  $a_0$  von  $A$  durch  $A$  selbst; so muß  $AJ$  die Polare von  $A_1$  werden und  $J_1$  muß mit  $J$  zusammenfallen. Daraus aber folgt, daß in diesem Falle der Kegelschnitt  $K_0$  in das Punktpaar  $(AJ)$  degeneriert; die Polare von  $J$  in Bezug auf dasselbe wird die Gerade  $MJ$ . Die beiden Geraden  $MA$  und  $MJ$  mögen  $g$  in  $P_0$  und  $Q_0$  treffen.



In gleicher Weise lege man durch  $A$  zwei Gerade  $a_m$  und  $a_n$ , welche  $a$  und  $a_o$  harmonisch trennen, so sind durch dieselben zwei Kegelschnitte  $K_m$  und  $K_n$  bestimmt, ferner die Polaren  $i_m$  und  $i_n$  von  $J$  und mithin die Pole  $R_m = (a_m i_m)$  und  $R_n = (a_n i_n)$  von  $g$  bezüglich  $K_m$  und  $K_n$  bestimmt.

Da aber  $A(PP_o P_m P_n)$  und  $J(QQ_o Q_m Q_n)$  harmonisch sind, so sind auch die Polaren jener Punkte  $PP_o P_m P_n$  und  $QQ_o Q_m Q_n$  harmonisch und da die Polaren von  $P_o$  und  $Q_o$  mit der Geraden  $AJ$  zusammenfallen, so liegen die Schnittpunkte  $RR_m R_n$  in einer Geraden.

410. *Die Polaren eines Punktes  $P$  bezüglich der Kegelschnitte einer Schar umhüllen einen Kegelschnitt, den Polarkegelschnitt von  $P$ .*

Beweis wie in 371.

411. *Die Mittelpunkte aller Kegelschnitte einer Schar liegen auf einer Geraden  $m$ .*

Man wende 409. auf  $g_\infty$  an.

412. *Die Halbierungspunkte der drei Diagonalen eines vollständigen Vierseits liegen in einer Geraden.*

Denn die Paare von Endpunkten der drei Diagonalen des Vierseits gehören zu den Kegelschnitten der Schar, welche dem Vierseite eingeschrieben ist.

413. *Die drei Punkte, welche die Endpunkte der drei Diagonalen eines vollständigen Vierseits harmonisch von einer Geraden  $g$  trennen, liegen auch auf einer Geraden.*

Denn sie sind die Pole von  $g$  bezüglich der drei Punktpaare der Schar.

414. *Die Paare von Tangenten durch einen Punkt  $P$  an die Kegelschnitte einer Schar bilden eine Involution.*

Der Punkt  $P$  liegt entweder außerhalb oder innerhalb seines Polarkegelschnittes  $\pi$ .

Ist im ersten Falle  $t_1$  eine Tangente durch  $P$  an  $\pi$ , so muß ihre konjugierte Gerade  $t_2$  auch  $\pi$  berühren, weil  $t_1$  durch  $P$  geht und auch durch  $P$  gehen, weil  $t_1$  den Kegelschnitt  $\pi$  berührt. Die beiden Geraden  $t_1 t_2$  trennen also jedes Tangentenpaar von  $P$  an einen Kegelschnitt der Schar harmonisch, also bilden alle Tangentenpaare eine Involution mit den reellen Doppelstrahlen  $t_1$  und  $t_2$ .



Im zweiten Falle, dessen Beweis auch für den ersten Fall gilt, seien  $g_1$  und  $g_2$  zwei Tangenten von  $P$  an einen Kegelschnitt  $K$  der Schar; ihnen seien in Bezug auf die Schar  $h_1$  und  $h_2$  konjugiert, so daß also  $h_1$  durch den Berührungspunkt  $G_1$  von  $g_1$  mit  $K$  und  $h_2$  durch denjenigen  $G_2$  von  $g_2$  mit  $K$  geht. Die Verbindungslinie  $p$  von  $G_1$  und  $G_2$  ist die




Fig. 163.

Polare von  $P$  bezüglich  $K$ . — Sind  $H_1$  und  $H_2$  die Schnittpunkte von  $h_1g_2$  und  $h_2g_1$ , ferner  $Q$  der Schnittpunkt von  $h_1h_2$ , so sind nach 192. auch  $PQ$  und  $H_1H_2$  konjugierte Gerade in Bezug auf die Kegelschnittschar und da  $PQ$  durch  $P$  geht, so berührt  $H_1H_2$  den Polarkegelschnitt  $\pi$ . (371.) In Bezug auf diesen sind die Diagonalen des umgeschriebenen Vierseits  $H_1RG_2Q$  konjugiert. Da also zwei Tangenten an einen Kegelschnitt  $K$  durch  $P$  konjugierte Strahlen in Be-



zug auf den Polarkegelschnitt  $\pi$  sind, so bilden alle Tangentenpaare eine Involution.

415. *In jeder Kegelschnittschar giebt es Ellipsen und Hyperbeln, eine Parabel und ein oder drei Punktpaare.*

I. Fall. Die Schar hat vier reelle Tangenten.

Die Gegeneckenpaare des vollständigen Vierseits, welches die vier Tangenten bilden, seien  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ . Beschreibt man über  $CC_1$  einen Halbkreis und nimmt auf ihm das Centrum einer harmonischen Verwandtschaft, deren Mittellinie  $CC_1$  ist, so ist dem Viereck  $ABA_1B_1$  ein Rechteck  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1$  und der Kegelschnittschar eine andere Schar verwandt. In dieser läßt




Fig. 164.

sich leicht die Natur der Kegelschnitte erkennen. Zieht man durch  $\mathfrak{M}$  irgend zwei durch die Diagonalen harmonisch getrennte Gerade, so sind ihre Schnittpunkte  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{D}_1\mathfrak{E}_1$  mit den Seiten die Berührungspunkte einer Ellipse, diejenigen  $\mathfrak{F}\mathfrak{G}\mathfrak{F}_1\mathfrak{G}_1$  mit den Verlängerungen der Seiten die Berührungspunkte einer Hyperbel. Wenn  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{E}$  mit  $\mathfrak{A}$  zusammenfallen, so geht der Kegelschnitt der Schar in das Punktpaar  $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1)$  über, welches also den Übergang von den Ellipsen zu den Hyperbeln bildet.

Wenn  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{E}$  in der Mitte von  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}_1$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{G}$  also im Unendlichen liegen und mit den Punkten  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$ , die den Punkten  $CC_1$  verwandt sind, zusammenfallen, so berührt die Ellipse die Seiten des Rechtecks in ihren Mitten und die Hyperbel geht in das Punktpaar  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  über.

Bewegt sich  $\mathfrak{D}$  über die Mitte von  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}_1$  nach  $\mathfrak{B}_1$  hin, so nähert sich  $\mathfrak{G}$  dem Punkte  $\mathfrak{B}_1$  von der andern Seite her und



man erhält eine zweite Gruppe von Ellipsen und Hyperbeln, welche durch das Punktpaar  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  getrennt werden.

Unter allen Kegelschnitten der Schar, welche die Seiten des Rechtecks berühren, giebt es stets einen, welcher  $CC_1$  zur Tangente hat. Die übrigen Kegelschnitte schneiden entweder  $CC_1$  oder haben mit dieser Geraden keinen Punkt gemein. Da  $CC_1$  die Mittellinie der Verwandtschaft ist, so ist demjenigen Kegelschnitte, welcher  $CC_1$  berührt, eine Parabel verwandt; denjenigen Kegelschnitten, welche  $CC_1$  schneiden, sind Hyperbeln und denjenigen, welche keinen Punkt mit  $CC_1$  gemein haben, sind Ellipsen verwandt. Da den Punktpaaren  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  die Punktpaare  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  verwandt sind, so werden die Gruppen von Ellipsen und Hyperbeln durch eine Parabel und drei Punktpaare von einander getrennt.

II. Fall. Die Schar hat zwei reelle und zwei imaginäre Tangenten. Fig. 165.

Der Schnittpunkt der reellen Tangenten sei  $A$ , derjenige der imaginären  $B$ . Man stelle eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher der Involution konjugierter Strahlen in  $B$  eine cirkulare Involution in  $\mathfrak{B}$  und dem Pole von  $AB$ , d. i. dem Schnittpunkte der beiden zu  $AB$  konjugierten Strahlen ein senkrecht über der verwandten Geraden  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  liegender Punkt verwandt ist. Der Schar von Kegelschnitten mit den gemeinsamen Involutionen konjugierter Strahlen in  $A$  und  $B$  ist eine Schar von Kegelschnitten mit  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  als gemeinsamer Hauptaxe und  $\mathfrak{B}$  als gemeinschaftlichem Brennpunkte verwandt, welche zwei reelle Tangenten in  $\mathfrak{A}$  haben. In dieser Schar läßt sich wieder die Natur der Kegelschnitte leicht erkennen.

Eine zur Hauptaxe senkrechte Gerade  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  schneide jene in  $\mathfrak{E}$ ; liegt  $\mathfrak{E}$  mit  $\mathfrak{B}$  in demselben Winkel der gemeinschaftlichen Tangenten in  $\mathfrak{A}$ , so erhält man den zweiten Brennpunkt  $\mathfrak{B}_1$ , wenn man  $\sphericalangle \mathfrak{B}_1\mathfrak{D}\mathfrak{E} = \sphericalangle \mathfrak{B}\mathfrak{D}\mathfrak{A}$  macht und der Kegelschnitt wird Ellipse.

Liegt  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  im Unendlichen, so erhält man eine Parabel.

Springt dann  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  auf die andere Seite des Winkels  $\mathfrak{A}$ , etwa nach  $\mathfrak{D}'\mathfrak{E}'$ , so erhält man den zweiten Brennpunkt  $\mathfrak{B}'_1$ , wenn man  $\sphericalangle \mathfrak{B}'_1\mathfrak{E}'\mathfrak{E}' = \sphericalangle \mathfrak{B}\mathfrak{E}'\mathfrak{A}$  macht. Da die Brennpunkte



in Scheitelwinkeln gemeinschaftlicher Tangenten liegen, so wird der Kegelschnitt Hyperbel.




Fig. 165.

Geht  $\mathfrak{D}\mathfrak{E}$  durch  $\mathfrak{B}$ , so degeneriert der Kegelschnitt in das Punktpaar  $(\mathfrak{A}\mathfrak{B})$ .

Die Ellipsengruppe wird also von der Hyperbelgruppe durch die Parabel und das Punktpaar  $(\mathfrak{A}\mathfrak{B})$  getrennt.

Die Mittellinie der harmonischen Verwandtschaft teilt die Kegelschnitte der obigen Schar in solche, welche getroffen und welche nicht getroffen werden, auf deren gemeinsamer Grenze derjenige Kegelschnitt sich befindet, welcher die Mittellinie berührt. Diesen drei Arten von Kegelschnitten sind Hyperbeln, Ellipsen und eine Parabel verwandt.

III. Fall. Die Schar hat zwei Paar konjugiert imaginäre Tangenten.

Die Schnittpunkte dieser Paare seien  $A$  und  $B$ ; es haben also diese Punkte dieselbe Involution konjugierter Strahlen. Man bezeichne die Strahlenpaare derselben mit  $aa'$ ,  $a_1a'_1$ ,  $a_2a'_2$ , ... und  $bb'$ ,  $b_1b'_1$ ,  $b_2b'_2$ , ... Die der Geraden  $AB$  konjugierten Strahlen schneiden sich im Pole  $C$  von  $AB$ . Wenn man die Strahlen  $aa'$  mit den Strahlen  $bb'$ ,  $b_1b'_1$ ,  $b_2b'_2$ , ... schneidet und die Schnittpunkte eines jeden Paares verbindet, so umhüllen die Verbindungslinien einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  (188b.), welcher  $a$  und  $a'$  berührt. An diesen ziehe man von  $C$  eine Tangente  $t$ , welche  $a$  und  $a'$  in  $T$  und  $T'$  schneidet. Diese Punkte müssen aber die Schnittpunkte eines Paares  $bb'$  mit  $aa'$  sein, da  $BB'$  eine Tangente von  $\mathfrak{K}$  ist. Bezeichnet man noch den Schnittpunkt von  $t$  und  $AB$  mit  $C'$ , so sind  $TT'$  und  $CC'$



Punktpaare derjenigen beiden Involutionen, in denen  $t$  von den Strahlenpaaren der Involutionen konjugierter Strahlen in  $A$  und  $B$  geschnitten wird. Diese Involutionen auf  $t$  fallen demnach zusammen. Es sei  $O$  einer der beiden Punkte, von denen die Punktpaare unter rechten Winkeln gesehen werden; in einer harmonischen Verwandtschaft mit dem Centrum  $O$  und der Mittellinie  $t$  sind den Involutionen in  $A$  und  $B$  cirkulare Involutionen in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  verwandt, also der Schar von Kegelschnitten ist eine andere mit den beiden gemeinschaftlichen Brennpunkten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  verwandt:

*Jeder Schar von Kegelschnitten mit zwei Paaren konjugiert imaginärer Tangenten ist eine Schar mit zwei gemeinschaftlichen Brennpunkten verwandt.*

In dieser gehen durch jeden Punkt eine Ellipse und eine Hyperbel, (mit rechtwinkligen Tangenten). Die beiden Brennpunkte  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  bilden einen degenerierten Kegelschnitt der Schar.

Diese Schar bikonfokaler Kegelschnitte schneidet die Gerade  $t$  in reellen oder imaginären Punkten. Einen Kegelschnitt giebt es, welcher  $t$  berührt. Also kommen in der Schar verwandter Kegelschnitte Ellipsen, Hyperbeln, eine Parabel und ein Punktpaar vor.

416. *Konstruiert man für jeden Kegelschnitt einer Schar den Ortskreis derjenigen Punkte, in denen sich zwei rechtwinklige Tangenten schneiden, so gehört derselbe einem Büschel an, welches die Leitlinie der einzigen in der Schar vorkommenden Parabel zur Potenzlinie hat.*

Es sei  $PQR$  das gemeinschaftliche Poldreieck der Schar, so muß jeder Ortskreis den umgeschriebenen Kreis des Poldreiecks rechtwinklig schneiden (198. 199.) und da die Mittelpunkte aller Ortskreise auf einer Geraden liegen (411.), so gehört er einem Kreisbüschel an, welches diese Gerade zur Centrale hat. Für die Parabel artet der Ortskreis in die Leitlinie aus; es ist diese also als Kreis des Büschels anzusehen und ist folglich die Potenzlinie desselben.

Da sie den um  $PQR$  beschriebenen Kreis rechtwinklig schneidet, so geht sie durch den Mittelpunkt desselben und noch durch die Höhenpunkte der vier Dreiecke, welche die vier gemeinschaftlichen Tangenten bilden, im Falle sie reell sind.



417. *In jeder Kegelschnittschar giebt es entweder zwei Punkte, in denen die Tangentenpaare an die Kegelschnitte der Schar eine cirkulare Involution bilden oder zwei gleichseitige Hyperbeln.*

Wenn das Büschel der Ortskreise der Schnittpunkte rechtwinkliger Tangenten zwei Grundpunkte  $P$  und  $Q$  hat, so bilden die Tangentenpaare in jedem eine cirkulare Involution. In diesem Falle kann der dem Poldreiecke  $PQR$  umgeschriebene Kreis  $\mathfrak{K}$  die Centrale des Kreisbüschels, also den Ort der Mittelpunkte der Kegelschnitte der Schar, nicht schneiden. Es reducirt sich also kein Ortskreis auf einen Punkt und da dies bei der gleichseitigen Hyperbel der Fall sein muß, so hat in diesem Falle die Schar keine gleichseitige Hyperbel.

Wenn aber das Büschel der Ortskreise keine Grundpunkte hat, so enthält dasselbe zwei Punktkreise, die Mittelpunkte zweier gleichseitigen Hyperbeln der Schar.

418. *Der Ort der Mittelpunkte aller einem Dreiecke eingeschriebenen gleichseitigen Hyperbeln ist ein Kreis um den Höhenpunkt dieses Dreiecks, welcher den um das Dreieck beschriebenen Kreis rechtwinklig schneidet.*




Fig. 166.



Man schneide die Seiten des Dreiecks  $ABC$  durch eine Gerade in  $A_1B_1C_1$ ; das Diagonaldreieck des vollständigen Vierseits  $ABCA_1B_1C_1$  sei  $PQR$ . Ferner seien  $\mathfrak{U}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  die Halbierungspunkte von  $AA_1, BB_1, CC_1$ ; dieselben liegen in einer Geraden und auf ihr steht nach Obigem die Gerade  $OH$  senkrecht, welche den Mittelpunkt des um  $PQR$  beschriebenen Kreises mit dem Höhenpunkte  $H$  des Dreiecks  $ABC$  verbindet. Die Gerade  $\mathfrak{U}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  schneide den Kreis  $O$  im  $M$  und  $N$ . Dann ist

$$\begin{aligned} O\mathfrak{U}^2 - OM^2 &= \mathfrak{U}S^2 - MS^2 \\ &= (\mathfrak{U}S + MS)(\mathfrak{U}S - MS) \\ &= \mathfrak{U}N \cdot \mathfrak{U}M, \end{aligned}$$

also  $\mathfrak{U}S^2 = MS^2 + \mathfrak{U}M \cdot \mathfrak{U}N.$

Aber auch

$$\begin{aligned} \mathfrak{U}S^2 &= \mathfrak{U}H^2 - HS^2, \\ \text{also } HM^2 &= HS^2 + MS^2 = \mathfrak{U}H^2 - \mathfrak{U}M \cdot \mathfrak{U}N \\ &= \mathfrak{U}H^2 - \mathfrak{U}R \cdot \mathfrak{U}Q \\ &= \mathfrak{U}H^2 - \mathfrak{U}A^2 \end{aligned}$$

Wenn man über  $AA_1$  als Durchmesser einen Kreis beschreibt, so geht derselbe durch den Fußpunkt  $D$  der Höhe  $AH$  auf  $BC$ . Die Potenz dieses Kreises im Punkte  $H$  ist

$$HA \cdot HD = H\mathfrak{U}^2 - \mathfrak{U}A^2 = HM^2$$

also nur abhängig vom Dreiecke  $ABC$ . Die Punkte  $M$  und  $N$  liegen also auf dem Kreise um  $H$  mit  $HM = \sqrt{HA \cdot HD}$ .

Damit dieser Radius reell sei, muß  $H$  außerhalb des Dreiecks  $ABC$  liegen; dieses muß also ein stumpfwinkliges sein.

419. Polarisiert man ein Kegelschnittbüschel in Bezug auf irgend einen Kegelschnitt, so erhält man eine Kegelschnittschar. Aus den Eigenschaften der einen ergeben sich die polaren Eigenschaften der anderen.

420. Eine Parabelschar läßt sich in ein Büschel gleichseitiger Hyperbeln polarisieren.

Es sei  $ABC$  das gemeinsame endliche Tangentendreieck der Parabelschar; die vierte gemeinschaftliche Tangente ist  $g_\infty$ . Um den Höhenpunkt  $H$  desselben, in welchem sich die Leit-







die Berührungspunkte auf einem neuen Kegelschnitte, der durch die beiden gemeinschaftlichen imaginären Punkte der drei ersten geht. Viermal liegen je drei Durchschnittspunkte gemeinschaftlicher Tangenten der drei Kegelschnitte in einer Geraden. (30, 58)

Sind  $\mathfrak{U}_{12} \mathfrak{S}_{12} \mathfrak{U}_{13} \mathfrak{S}_{13} \mathfrak{U}_{23} \mathfrak{S}_{23}$  die Ähnlichkeitspunkte der verwandten Kreise  $\mathfrak{K}_1 \mathfrak{K}_2 \mathfrak{K}_3$  und  $A_{12} J_{12} A_{13} J_{13} A_{23} J_{23}$  die verwandten Punkte, so liegen (49)  $A_{12} A_{13} A_{23}$ ,  $A_{12} J_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} A_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} J_{13} A_{23}$  je in einer Geraden.

b. Um diejenigen Kegelschnitte zu konstruieren, welche die drei Kegelschnitte  $K_1 K_2 K_3$  berühren und durch die beiden imaginären Schnittpunkte der letzteren gehen, konstruiere man die Pole der vier Geraden  $A_{12} A_{13} A_{23}$ ,  $A_{12} J_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} A_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} J_{13} A_{23}$ . Es seien  $P_1 P_2 P_3$  diejenigen der ersten Geraden bezüglich  $K_1 K_2 K_3$ , es sei  $P$  der Chordalpunkt von  $K_1 K_2 K_3$ ; die Geraden  $PP_1$ ,  $PP_2$ ,  $PP_3$  schneiden  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  in den Berührungspunkten  $B_1 B_2$ ,  $C_1 C_2$ ,  $D_1 D_2$  zweier Kegelschnitte, welche  $K_1 K_2 K_3$  berühren und durch deren gemeinsame Punkte gehen. (61.) Die drei anderen Geraden  $A_{12} J_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} A_{13} J_{23}$ ,  $J_{12} J_{13} A_{23}$  liefern noch 6 andere Berührungskegelschnitte. (64.)

## § 27.

### Kegelschnitte in doppelter Berührung.

422. Die Berührungspunkte sind imaginär.

Zwei konzentrische Kreise haben eine doppelte imaginäre Berührung in den beiden Kreispunkten der Ebene, denn die Polare des gemeinschaftlichen Mittelpunktes ist  $g_\infty$ . Die in irgend einer harmonischen Verwandtschaft ihnen verwandten Kegelschnitte haben demnach auch eine doppelte imaginäre Berührung. Das Charakteristische derselben folgt aus dem Umstande, daß die beiden ideellen Sekanten in eine zusammenfallen, weil die Potenzlinie zweier konzentrischen Kreise mit  $g_\infty$  zusammenfällt. Die imaginären Berührungspunkte der beiden Kegelschnitte sind die Doppelpunkte der Involution konjugierter Punkte auf der gemeinschaftlichen Sekante. Diese nennt man die *Berührungssehne*, ihren Pol den *Berührungspol*.

Aus den Eigenschaften konzentrischer Kreise folgt sofort:

a. Die Polaren eines Punktes der Berührungssehne bezüg-



lich zweier sich doppelt berührender Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  fallen in eine Gerade durch den Berührungspol zusammen.

b. Die Pole einer Geraden durch den Berührungspol fallen in einen Punkt der Berührungssehne zusammen.

c. Die Polaren eines beliebigen Punktes schneiden sich auf der Berührungssehne.

d. Die Pole einer beliebigen Geraden liegen in gerader Linie mit dem Berührungspol.

e. Jede Gerade wird von allen sich in denselben beiden imaginären Punkten doppelt berührenden Kegelschnitten in einer Involution geschnitten, von welcher der eine Doppelpunkt auf der Berührungssehne liegt.

Denn jede Gerade wird von allen konzentrischen Kreisen in einer Involution geschnitten, von welcher der eine Doppelpunkt auf  $g_\infty$  liegt.

f. Die Tangenten von einem Punkte an alle sich in denselben beiden imaginären Punkten doppelt berührenden Kegelschnitte bilden eine Involution, von welcher der Strahl nach dem Berührungspol ein Doppelstrahl ist.

g. Zieht man von einem beliebigen Punkte  $P$  Tangenten an alle Kegelschnitte, die sich in denselben beiden imaginären Punkten doppelt berühren, so liegen die Berührungspunkte auf einem neuen Kegelschnitte  $K$ , welcher durch  $P$ , die beiden imaginären Berührungspunkte und den Berührungspol  $B$  geht. Ist  $Q$  der Schnittpunkt der Polaren von  $P$ , (der auf der Berührungssehne liegt,) so berührt  $K$  in  $P$  und  $B$  die Geraden  $QP$  und  $QB$ .

Denn in dem harmonisch verwandten Büschel konzentrischer Kreise liegen die Berührungspunkte auf einem Kreise mit dem Durchmesser  $\mathfrak{P}\mathfrak{B}$ , wenn  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{B}$  die zu  $P$  und  $B$  verwandten Punkte sind;  $\mathfrak{B}$  ist dabei der Mittelpunkt der konzentrischen Kreise. Wenn  $\mathfrak{Q}$  der Pol von  $\mathfrak{P}\mathfrak{B}$  ist, so berührt der Kreis über dem Durchmesser  $\mathfrak{P}\mathfrak{B}$  die Geraden  $\mathfrak{P}\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{Q}$ , also muß der Kegelschnitt  $K$  die Geraden  $QB$  und  $QP$  in  $B$  und  $P$  berühren.

423. Die Berührungspunkte sind reell.

Ist  $K$  ein beliebiger Kegelschnitt und sind  $M$  und  $M_1$  irgend zwei Punkte desselben, so giebt es unendlich viele



Kegelschnitte  $CC_1C_2 \dots$ , welche  $K$  in diesen beiden Punkten, also doppelt berühren. Alle diese Kegelschnitte haben in  $M$




Fig. 167.

und  $M_1$  gemeinsame Tangenten; ihr Schnittpunkt  $B$  heißt der *Berührungspol* und ist der Pol der *Berührungssehne*  $MM_1$ .

a. Die Polaren eines Punktes  $P$  der *Berührungssehne* bezüglich der Kegelschnitte  $KCC_1 \dots$  fallen in eine Gerade zusammen, welche  $PB$  von den gemeinsamen Tangenten harmonisch trennt.

b. Die Pole einer Geraden  $p$  durch den *Berührungspol* fallen in einen Punkt der *Berührungssehne* zusammen, welcher den Schnittpunkt von  $p$  und  $MM_1$  harmonisch von  $MM_1$  trennt.

c. Jede Gerade  $g$  wird von den sich doppelt berührenden Kegelschnitten in einer Involution geschnitten, von welcher der eine Doppelpunkt auf der *Berührungssehne* liegt.

Ist  $P$  der Schnittpunkt von  $g$  und  $MM_1$ ,  $p$  seine Polare, so werden die Schnittpunkte von  $g$  mit irgend einem Kegelschnitte durch  $P$  und  $p$  harmonisch getrennt.

d. Die Tangenten von einem Punkte an alle sich in denselben reellen Punkten doppelt berührenden Kegelschnitte bilden eine Involution, von welcher ein Doppelstrahl die Verbindungsline mit dem *Berührungspol* ist.

Denn letztere und ihr Pol trennen je zwei Tangenten eines Kegelschnittes harmonisch.

e. Die Polaren eines beliebigen Punktes  $P$  in Bezug auf



zwei sich doppelt berührende Kegelschnitte schneiden sich in einem Punkte der Berührungssehne, dem Pole von  $PB$  (423b).

f. Die Pole einer beliebigen Geraden  $p$  in Bezug auf zwei sich doppelt berührende Kegelschnitte liegen in einer Geraden mit dem Berührungspol; diese ist die Polare des Schnittpunktes von  $p$  mit der Berührungssehne. (423a.)

g. Zieht man von einem Punkte  $P$  die Tangenten  $PA$  und  $PA_1$  an den Kegelschnitt  $K$  und legt durch  $AA_1MM_1B$  einen Kegelschnitt  $k$ , so geht dieser auch durch  $P$ ; ist  $Q$  der Schnittpunkt von  $MM_1$  und  $AA_1$  so berührt  $k$  die Geraden  $QB$  und  $QP$  in  $B$  und  $P$ .

$BP$  ist die Polare von  $Q$  für  $K$  und  $k$ , denn  $BP$  ist die Polare von  $Q$  für  $K$  und  $Q$  ist der Schnittpunkt gemeinsamer




Fig. 168.

Sehnen von  $K$  und  $k$ , also muß  $k$  die Gerade  $QB$  in  $B$  berühren.

Die Geraden  $MA$  und  $M_1A_1$ ,  $MA_1$  und  $M_1A$  treffen sich in zwei Punkten  $R$  und  $S$  von  $BP$ , welche  $BP$  harmonisch trennen;  $QR$  ist die gemeinsame Polare von  $S$  und weil  $k$  durch  $B$  geht und  $RSBP$  harmonisch sind, so muß  $k$  auch durch  $P$  gehen und  $QP$  berühren, denn  $BP$  ist die Polare von  $Q$ .

h. Die Berührungspunkte der Tangenten von einem Punkte  $P$  an alle sich doppelt berührenden Kegelschnitte  $KCC_1 \dots$  liegen auf einem neuen Kegelschnitte  $k$ , welcher durch  $B$  und  $P$  geht



und in diesen Punkten die Geraden berührt, welche den gemeinsamen Pol  $Q$  von  $BP$  in Bezug auf alle Kegelschnitte mit  $B$  und  $P$  verbinden.

Sind  $AA_1$ ,  $DE$ ,  $D_1E_1$ , ... die Berührungspunkte, so müssen die Kegelschnitte, welche man durch  $AA_1MM_1BP$ ,  $DEMM_1BP$ ,  $D_1E_1MM_1BP_1$  ... legen kann, zusammenfallen, denn sie haben vier gemeinsame Punkte  $MM_1BP$  und berühren in  $B$  und  $P$  die Geraden  $BQ$  und  $PQ$ . (g.)

i. Zieht man in den Schnittpunkten einer Geraden  $p$  mit  $K$  die Tangenten  $aa_1$  und legt an die Geraden  $aa_1$ ,  $MB$ ,  $M_1B$ ,  $MM_1$  einen Kegelschnitt  $k$ , so berührt dieser auch  $p$ ; ist  $q$  die Verbindungslinie von  $B$  mit dem Schnittpunkte von  $a$  und  $a_1$ , so berührt  $k$  die Geraden  $MM_1$  und  $p$  in ihren Schnittpunkten mit  $q$ .

Beweis wie in g. oder durch Polarisations.

k. Schneidet man die sich doppelt berührenden Kegelschnitte  $KCC_1$  ... durch eine Gerade und zieht in den Schnittpunkten Tangenten, so berühren diese einen neuen Kegelschnitt  $k$ , der auch die Berührungssehne  $MM_1$  und die Gerade  $p$  berührt und zwar in denjenigen Punkten, in denen beide von der Geraden  $q$  geschnitten werden, welche den Berührungspol  $B$  mit dem Pole von  $p$  verbindet.

Beweis wie in h. oder durch Polarisations.

l. Zieht man von einem beliebigen Punkte  $P$  die Tangenten  $PD$  und  $PD_1$ ,  $PE$  und  $PE_1$  an die sich in  $M$  und  $M_1$  doppelt berührenden Kegelschnitte  $K$  und  $C$ , so muß ein Kegelschnitt  $k$ , der  $K$  in  $DD_1$  berührt und durch  $E$  geht, auch durch  $E_1$  gehen.

Die Polaren von  $P$  in Bezug auf  $K$  und  $C$ , nämlich  $DD_1$  und  $EE_1$  schneiden sich in einem Punkte  $Q$  der Berührungssehne  $MM_1$  (e.); also hat  $Q$  in Bezug auf alle drei Kegelschnitte  $KCK$  dieselbe Polare, muß also auf einer gemeinschaftlichen Sehne von  $C$  und  $k$  liegen. Daher muß  $k$  durch  $E_1$  gehen.

m. Schneidet man mit einer beliebigen Geraden die sich doppelt berührenden Kegelschnitte  $K$  und  $C$  in  $DD_1$  und  $EE_1$ , so muß ein Kegelschnitt  $k$ , welcher  $K$  in  $DD_1$  und die Tangente in  $E$  berührt, auch die Tangente in  $E_1$  berühren.

Beweis wie in l. oder durch Polarisations.

424. a. Berühren zwei Kegelschnitte  $CC_1$ , einen dritten  $K$



*doppelt, so schneiden sich die Berührungssehnen und zwei gemeinschaftliche Sekanten in einem Punkte und bilden vier harmonische Strahlen.*

Die beiden Berührungssehnen  $s$  und  $s_1$  mögen sich in  $P$  treffen; der Punkt  $P$  hat für alle drei Kegelschnitte dieselbe




Fig. 169.

Polare (422, 423), also ist  $P$  eine Ecke des gemeinsamen Poldreiecks von  $C$  und  $C_1$ . Es seien  $q$  und  $r$  die beiden ge-



meinschaftlichen durch  $P$  gehenden Sekanten, sie bilden einen Kegelschnitt des Büschels  $(CC_1)$ . Man ziehe eine Gerade  $g$  von solcher Lage, daß die auf ihr von  $C$  und  $C_1$  abgeschnittenen Sehnen durch die Berührungssehnen  $s$  und  $s_1$  harmonisch geteilt werden. Man findet sie, indem man den Ort des den Punkten von  $s$  bezüglich beider Kegelschnitte konjugierten Punktes, der nach 360. und 393f. ein Kegelschnitt  $\sigma$  ist, mit  $s_1$  zum Durchschnitte bringt und einen der Schnittpunkte,  $D_1$ , mit seinem auf  $s$  liegenden konjugierten Punkte  $D$  verbindet. Diese Gerade schneide die Sekanten  $q$  und  $r$  in  $Q$  und  $R$ , den Kegelschnitt  $K$  in  $EE_1$ , die Berührungssehnen in  $D$  und  $D_1$ , die Kegelschnitte  $C$  und  $C_1$  in  $FG$  und  $F_1G_1$ ; dann sind nach 422. und 423. die Punkte  $D$  und  $D_1$  Doppelpunkte der Involutionen  $FGEE_1D$  und  $F_1G_1EE_1D_1$ . Es sind aber auch wegen der Konstruktion von  $g$  die Punkte  $FGDD_1$  und  $F_1G_1DD_1$  harmonisch, also sind  $FGF_1G_1EE_1DD_1$  in Involution mit den Doppelpunkten  $D$  und  $D_1$ . Zu dieser Involution gehören aber auch die Schnittpunkte  $Q$  und  $R$ , also sind  $QRDD_1$  und daher auch  $qrss_1$  harmonisch.

b. *Berühren zwei Kegelschnitte  $C$  und  $C_1$  einen dritten  $K$  doppelt, so werden die Berührungspole durch zwei Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten harmonisch getrennt.*

Beweis wie in a. oder durch Polarisierung.

c. *Zieht man durch den Schnittpunkt  $P$  der gemeinschaftlichen Sekanten von  $C$  und  $C_1$  zwei Strahlen  $s'$  und  $s'_1$ , welche jene Sekanten harmonisch trennen, so läßt sich durch ihre Schnittpunkte mit  $C$  und  $C_1$  ein Kegelschnitt legen, der  $C$  und  $C_1$  doppelt berührt.*

Folgt aus a.

d. *Sind  $B$  und  $B_1$  zwei Punkte, welche die in b. genannten Tangentendurchschnitte harmonisch trennen, so giebt es einen Kegelschnitt, welcher  $C$  und  $C_1$  doppelt so berührt, daß  $B$  und  $B_1$  die Berührungspole sind.*

Folgt aus b.

425. a. *Wenn drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  einen vierten  $K$  doppelt berühren, so schneiden sich drei ihrer gemeinschaftlichen Sekanten vier Mal in einem Punkte. (Chordalpunkt.)*

Die Berührungssehnen  $b_1b_2b_3$  schneiden sich in  $(b_1b_2)$  oder



$B_3$ ,  $(b_2b_3)$  oder  $B_1$ ,  $(b_3b_1)$  oder  $B_2$ ; die durch diese Punkte gehenden gemeinschaftlichen Sekanten seien  $q_3r_3$  von  $C_1C_2$ ,  $q_1r_1$  von  $C_2C_3$ ,  $q_2r_2$  von  $C_1C_3$ . Also sind die Büschel  $B_3(b_1b_2q_3r_3)$ ,  $B_1(b_2b_3q_1r_1)$ ,  $B_2(b_1b_3q_2r_2)$  harmonisch. Schneiden nun  $q_3$  und  $r_3$  die Sekante  $q_2$  in  $\beta$  und  $\beta'$ ,  $q_1$  und  $r_1$  in  $\gamma$  und  $\gamma'$  und sind  $vv'$  die reellen oder imaginären Schnittpunkte von  $q_2$  mit  $C_2$ ,




Fig. 170.

$R_2S_2$  diejenigen von  $q_2$  mit  $C_1$  und  $C_3$ , so sind  $\beta\beta'vv'R_2S_2$  und  $\gamma\gamma'vv'R_2S_2$  in Involution, denn  $(q_3r_3)$ ,  $C_2$ ,  $C_1$  und  $(q_1r_1)$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  sind je drei Kegelschnitte eines Büschels. Ist  $\Pi$  der Schnittpunkt von  $q_2$  mit  $B_1B_3$ , so sind  $\beta\beta'B_2\Pi$  und  $\gamma\gamma'B_2\Pi$  je vier harmonische Punkte, weil  $B_3(b_1b_2q_3r_3)$  und  $B_1(b_2b_3q_1r_1)$  harmonisch sind. Die Punktpaare  $\beta\beta'$  sind also sowohl in Involution mit  $vv'R_2S_2$  als harmonisch mit  $B_2\Pi$  und müssen daher zusammenfallen, denn es giebt nur ein Punktpaar einer Involution, welches mit einem gegebenen Punktpaare harmonisch liegt. Denkt man sich nämlich alle Punktpaare, welche das letztere harmonisch trennen, so bilden sie eine Involution, welche mit der ersten höchstens ein gemeinschaftliches Punktpaar hat. (36 d).

Es schneiden sich also in  $\beta$  die Sekanten  $q_1q_2q_3$ , in  $\beta'$  die Sekanten  $r_1q_2r_3$ . — Von den harmonischen Büscheln  $B_1(b_2b_3q_1r_1)$  und  $B_2(b_1b_3q_2r_2)$  fallen die Strahlen  $b_3$  zusammen, also liegen die Schnittpunkte der übrigen Strahlen auf einer Geraden. Von diesen schneiden sich  $b_1b_2$  in  $B_3$ ,  $r_1q_2$  in  $\beta'$



auf  $r_3$ , also müssen sich auch  $r_2q_1$  auf  $r_3$  schneiden, da  $r_3$  durch  $B_3$  geht; es treffen sich also  $r_2q_1r_3$  in einem Punkte und ebenso  $r_1r_2q_3$ .

b. Wenn drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  einen dritten  $K$  doppelt berühren, so liegen vier Mal drei der Durchschnittspunkte gemeinsamer Tangenten auf einer Geraden.

Beweis wie in a. oder durch Polarisation.

426. a. Wenn zwei Kegelschnitte  $CC_1$  einen dritten  $K$  doppelt berühren und man zieht von irgend einem Punkte  $B$  einer solchen gemeinschaftlichen Sekante von  $CC_1$ , welche durch den Schnittpunkt der Berührungssehnen geht, Tangenten an  $KCC_1$ , so liegen die 6 Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{R}$ , welcher  $K$  doppelt berührt und  $B$  zum Berührungspole hat.

Die Berührungssehnen  $bb_1$  mögen sich in  $P$  schneiden; die durch  $P$  gehenden gemeinschaftlichen Sekanten von  $CC_1$  seien  $qr$ . Von  $B$  auf  $q$  ziehe man die Tangenten an  $KCC_1$ , welche diese Kegelschnitte in  $\kappa\kappa'$ ,  $\gamma\gamma'$ ,  $\gamma_1\gamma_1'$  berühren. Die Geraden  $\gamma\gamma'$  und  $\gamma_1\gamma_1'$  müssen sich auf  $q$  in  $A$  schneiden. Nach 4231. giebt es einen Kegelschnitt  $\mathfrak{R}$ , welcher  $K$  in  $\kappa\kappa'$  doppelt berührt und durch  $\gamma\gamma'$  geht. Die Polaren  $\kappa\kappa'$  und  $\gamma_1\gamma_1'$  von  $B$  nach  $K$  und  $C_1$  schneiden sich auf der Berührungssehne  $b_1$  in  $Q$ ; die Kegelschnitte  $\mathfrak{R}$  und  $C_1$  berühren  $K$  doppelt, also muß eine gemeinschaftliche Sekante beider durch den Schnittpunkt  $Q$  ihrer Berührungssehnen  $\kappa\kappa'$  und  $b_1$  gehen. Da  $CC_1\mathfrak{R}$  den Kegelschnitt  $K$  doppelt berühren, so müssen sich nach 425a. ihre gemeinschaftlichen Sekanten zu je drei in vier Punkten treffen; zwei von diesen, nämlich diejenigen von  $CC_1$  und  $C\mathfrak{R}$  sind  $q$  und  $\gamma\gamma'$ , diese treffen sich in  $A$ , also muß auch eine von  $C_1$  und  $\mathfrak{R}$  durch  $A$  gehen. Demnach ist  $AQ$  eine gemeinschaftliche Sehne von  $C_1$  und  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}$  muß durch  $\gamma_1\gamma_1'$  gehen.

b. Wenn zwei Kegelschnitte  $CC_1$  einen dritten  $K$  doppelt berühren und man schneidet dieselben durch eine Gerade  $p$ , welche durch einen solchen Durchschnittspunkt gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$  geht, der auf der Verbindungslinie der Berührungspole liegt, so umhüllen die Tangenten in den Schnittpunkten von  $p$  mit  $CC_1K$  einen Kegelschnitt  $\mathfrak{R}$ , welcher  $K$  doppelt berührt und  $p$  zur Berührungssehne hat.

Beweis wie in a. oder durch Polarisation.



c. *Berühren drei Kegelschnitte einen vierten  $K$  doppelt und zieht man von einem der vier Chordalpunkte (425a) Tangenten an alle vier Kegelschnitte, so liegen die 8 Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte, der  $K$  doppelt berührt.*

Folgt aus a.

d. *Berühren drei Kegelschnitte einen vierten  $K$  doppelt, so schneidet jede der vier Geraden, auf denen drei Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten liegen, die vier Kegelschnitte in solchen 8 Punkten, daß die Tangenten in ihnen einen Kegelschnitt umhüllen, welcher  $K$  doppelt berührt.*

Folgt aus b.

427.  $A$  und  $B$  seien zwei Punkte außerhalb eines Kegelschnittes  $K$ ; die Gerade  $AB$  treffe  $K$  in  $A_1B_1$  und  $PQ$  seien die Punkte, welche  $AB$  und  $A_1B_1$  harmonisch teilen. Durch  $P$  ziehe man eine Gerade, welche  $K$  in  $DE$  schneidet und lege durch  $A$  einen Kegelschnitt  $C$ , welcher  $K$  in  $D$  und  $E$  berührt. Die Polaren von  $P$  bezüglich beider Kegelschnitte  $K$  und  $C$  fallen in eine Gerade  $p$  zusammen, welche durch  $Q$  geht und die Punkte  $D$  und  $E$  harmonisch von  $P$  trennt. Deshalb muß  $C$  auch durch  $B$  gehen, weil  $ABPQ$  harmonisch sind. Durch  $A$  und  $B$  lassen sich also unzählige Kegelschnitte legen, welche  $K$  doppelt berühren. Die Berührungssehnens derselben treffen sich in  $P$ . In gleicher Weise läßt sich zeigen, daß es eine zweite Schar von Kegelschnitten giebt, welche durch  $A$  und  $B$  gehen,  $K$  doppelt berühren und deren Berührungssehnens sich in  $Q$  schneiden. Umgekehrt folgt, daß die Berührungssehnens aller  $K$  doppelt berührenden Kegelschnitte durch  $A$  und  $B$  entweder durch  $P$  oder  $Q$  gehen. Denn ist  $C$  ein solcher Kegelschnitt und trifft seine Berührungssehne  $AB$  in  $X$ , so hat  $X$  für beide Kegelschnitte dieselbe Polare  $x$  und diese schneidet  $AB$  in einem solchen Punkte  $Y$ , daß das Punktpaar  $XY$  die beiden Punktpaare  $AB$  und  $A_1B_1$  harmonisch trennt. Also muß  $XY$  mit  $PQ$  zusammenfallen.

Es ändert sich nichts, wenn die Punkte  $D$  und  $E$  imaginär werden.

Ist  $G$  ein beliebiger Punkt von  $AB$ , so müssen die Berührungspunkte aller Tangenten von ihm an die Kegelschnitte  $C \dots$ , welche  $K$  doppelt berühren und durch  $AB$  gehen, auf einem



Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  liegen (426a), welcher  $K$  doppelt berührt. Zu den Kegelschnitten  $C$  gehören auch zwei Geradenpaare. Zieht man nämlich von  $A$  an  $K$  die Tangenten, welche in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  berühren und schneidet  $K$  mit  $P\mathfrak{A}$  in  $\mathfrak{B}$ , mit  $P\mathfrak{A}_1$  in  $\mathfrak{B}_1$ , so sind  $B\mathfrak{B}$  und  $B\mathfrak{B}_1$  auch Tangenten. Die Tangentenpaare  $(A\mathfrak{A}, B\mathfrak{B})$  und  $(A\mathfrak{A}_1, B\mathfrak{B}_1)$  gehören zu den Kegelschnitten  $C$  und deshalb muß durch die Scheitel  $T$  und  $T_1$  derselben der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  gehen.

Ändert der Punkt  $G$  auf  $AB$  seine Lage, so erhält man neue Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ ; alle diese gehen durch  $T$  und  $T_1$ .

Die vorige Betrachtung bleibt ungeändert, wenn  $A$  und  $B$  innerhalb  $K$  liegen. An Stelle der Tangenten von  $A$  und  $B$  treten die imaginären Doppelstrahlen der Involutionen konjugierter Strahlen. Von diesen liegen zwei imaginäre Schnittpunkte auf der Polare  $p$  von  $P$  und durch diese müssen alle Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  gehen. Dies läßt sich auch auf folgende Art erkennen. Ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  schneidet  $p$  in zwei reellen oder imaginären Punkten  $Q$  und  $R$ , durch welche zwei Kegelschnitte aus der Schar  $C \dots$  etwa  $C_q$  und  $C_r$  gehen. Diese können aber keine wirklichen Kegelschnitte sein, weil die Tangenten an sie in  $Q$  und  $R$  nicht durch  $G$ , sondern durch  $P$  gehen, da  $P$  und  $p$  Pol und Polare für alle Kegelschnitte  $C \dots$  sind, es müssen also  $C_q$  und  $C_r$  Geradenpaare,  $Q$  und  $R$  deren Scheitel sein. Also:

a. *Berühren die Kegelschnitte  $C \dots$  einen Kegelschnitt  $K$  doppelt und schneiden sie sich in denselben beiden Punkten  $A$  und  $B$ , so treffen sich ihre Berührungssehnens in zwei festen Punkten  $P$  und  $Q$  von  $AB$ . Zieht man von einem Punkte  $G$  der Sekante  $AB$  Tangenten an die Kegelschnitte  $C \dots$ , deren Berührungssehnens sich in  $P$  treffen, so liegen ihre Berührungspunkte auf einem  $K$  doppelt berührenden Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , welcher durch zwei feste, reelle oder imaginäre, Punkte auf der Polare von  $P$  geht. Wenn  $K$  in ein Geradenpaar ausartet, so thut dies auch  $\mathfrak{K}$ ; beide Paare haben denselben Scheitel.*

Um denjenigen unter den Kegelschnitten  $C \dots$  zu finden, welcher durch einen gegebenen Punkt  $R$  geht, ziehe man  $AR$ , schneide mit derselben  $K$  in  $R_1R_2$  und konstruiere das Punktpaar  $P_1Q_1$ , welches  $AR$  und  $R_1R_2$  harmonisch teilt, so



sind die Geraden  $PP_1$ ,  $PQ_1$ ,  $QP_1$ ,  $QQ_1$  die Berührungssehnensolcher Kegelschnitte, welche durch  $ABR$  gehen und  $K$  doppelt berühren:

b. *Durch drei Punkte lassen sich vier Kegelschnitte legen, welche einen Kegelschnitt  $K$  doppelt berühren.*

Es bleibt der Fall zu erledigen, daß die Kegelschnitte  $C \dots$ , welche  $K$  doppelt berühren, durch zwei imaginäre Punkte  $A$  und  $B$  gehen, also eine Involution  $J$  auf einer Geraden  $g$  als Involution konjugierter Punkte haben. Die Paare konjugierter Punkte auf  $g$  bezüglich  $K$  bilden eine zweite Involution, welche mit der vorigen ein stets reelles gemeinsames Punktpaar  $PQ$  hat. Man folgert wie vorhin:

c. *Alle Kegelschnitte  $C \dots$ , welche einen Kegelschnitt  $K$  doppelt berühren und eine Involution  $J$  als Involution konjugierter Punkte haben, teilen sich in zwei Scharen, deren Berührungssehnensich in zwei festen Punkten  $P$  und  $Q$  auf dem Träger der Involution schneiden. Zieht man von irgend einem Punkte  $G$  auf  $PQ$  Tangenten an alle  $C \dots$  der einen Schar, so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , welcher die Polare des Punktes, in dem sich alle Berührungssehnens schneiden, in zwei festen Punkten trifft und  $K$  doppelt berührt. Es giebt vier Kegelschnitte, welche  $J$  als Involution konjugierter Punkte haben,  $K$  doppelt berühren und durch einen Punkt  $R$  gehen.*

428. Die Kegelschnitte  $C$  und  $C_1$  berühren  $K$  doppelt; durch den Schnittpunkt  $P$  der Berührungssehnens seien  $q$  und  $r$  die gemeinschaftlichen reellen oder ideellen Sekanten von  $C$  und  $C_1$ . Auf  $q$  sei  $A$  irgend ein Punkt; man ziehe durch  $A$  eine Gerade, welche  $C$  in  $D$  und  $E$  trifft, so lassen sich durch  $DE$  unendlich viele Kegelschnitte legen, welche  $K$  doppelt berühren. Alle diese schneiden  $C_1$  in solchen Punkten, daß eine gemeinschaftliche Sekante durch  $P$  geht. Legt man also umgekehrt durch  $P$  eine zweite Gerade, welche  $C_1$  in  $D_1$  und  $E_1$  trifft, so läßt sich durch  $DED_1E_1$  ein Kegelschnitt legen, welcher  $K$  doppelt berührt. Wählt man statt der beliebigen Geraden  $DE$  und  $D_1E_1$  durch  $P$  zwei Tangenten dieses Punktes an  $C$  und  $C_1$ , so folgt der Satz:

a. *Wenn zwei Kegelschnitte  $CC_1$  einen dritten  $K$  doppelt be-*



rühren und man zieht von einem beliebigen Punkte einer solchen gemeinschaftlichen Sekante von  $CC_1$ , welche durch den Schnittpunkt der Berührungsschnen geht, 2 Gerade, so liegen die vier Schnittpunkte, in denen die eine  $C$ , die andere  $C_1$  schneidet, auf einem Kegelschnitte, welcher  $K$  doppelt berührt. Zieht man statt der beliebigen Geraden je an  $C$  und  $C_1$  eine Tangente, so kann man durch die Berührungspunkte einen in ihnen  $C$  und  $C_1$  einfach berührenden Kegelschnitt  $C_2$  legen, der  $K$  doppelt berührt.

Sind  $F$  und  $F_1$  die Berührungspunkte von  $C_2$  mit  $C$  und  $C_1$ , so sind die Tangenten in ihnen gemeinschaftliche Sekanten von  $CC_2$  und  $C_1C_2$  und sie selbst Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten. Deshalb mit Hilfe von 425a und b.:

b. Wenn zwei Kegelschnitte  $C$  und  $C_1$  von einem dritten  $C_2$  einfach, alle drei aber von einem vierten  $K$  doppelt berührt werden, so liegen die Berührungspunkte von  $CC_2$  und  $C_1C_2$  in gerader Linie mit einem Durchschnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$  und die Tangenten in den Berührungspunkten von  $CC_2$  und  $C_1C_2$  schneiden sich auf einer gemeinschaftlichen Sekante von  $CC_1$ .

429. Durch einen Durchschnitt  $N$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$ , welcher auf der Verbindungslinie der Berührungspole liegt, ziehe man zwei Gerade  $gg_1$ , welche  $C$  in  $STUV$  und  $C_1$  in  $S_1T_1U_1V_1$  schneiden. Von den gemeinschaftlichen Sekanten der Kegelschnitte  $C$ ,  $C_1$  und des Geradenpaares ( $gg_1$ ) schneiden sich nach 425a. viermal drei in einem Punkte, weil  $C$ ,  $C_1$  und ( $gg_1$ ) als drei Kegelschnitte betrachtet werden können, welche das Tangentenpaar in  $N$  doppelt berühren. Man beweist diese Eigenschaft aber wie in 425. auch leicht direkt. Es mögen sich  $US$  und  $V_1T_1$  sowie  $U_1S_1$  und  $VT$  auf  $q$ ,  $UT$  und  $U_1T_1$  sowie  $SV$  und  $S_1V_1$  auf  $r$  schneiden, so lassen sich nach 428. durch  $USV_1T_1$ ,  $U_1S_1VT$ ,  $UTU_1T_1$  und  $SVS_1V_1$  Kegelschnitte legen, welche  $K$  doppelt berühren, also:

Wenn zwei Kegelschnitte  $C$  und  $C_1$  einen dritten  $K$  doppelt berühren und man zieht durch einen solchen Durchschnitt  $N$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$ , welcher auf der Verbindungslinie der Berührungspole liegt, zwei Gerade durch  $CC_1$ , so schneiden sich viermal je zwei der Verbindungslinien der acht Schnitt-



punkte auf den beiden gemeinschaftlichen Sekanten von  $CC_1$ , welche durch den Schnittpunkt der Berührungssehnens gehen und viermal lassen sich durch je vier der Schnittpunkte Kegelschnitte legen, welche  $K$  doppelt berühren. Fallen die beiden Geraden zusammen, so schneiden sich die Tangenten in den Schnittpunkten viermal auf den gemeinschaftlichen Sekanten. Zieht man umgekehrt von einem Punkte einer gemeinschaftlichen Sekante Tangenten an  $CC_1$ , so gehen vier Verbindungslinien der Berührungspunkte durch solche Schnittpunkte gemeinsamer Tangenten, welche auf der Verbindungslinie der Berührungspole liegen.

430. Durch  $UV_1, ST_1, VU_1, S_1T$  lassen sich Kegelschnitte legen, welche in ihnen  $C$  und  $C_1$  einfach und außerdem  $K$  doppelt berühren. Dies folgt aus 429., wenn  $g$  und  $g_1$  zusammenfallen. Sind die beiden ersten  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$ , so müssen sich  $US$  und  $V_1T_1$  in einem Schnittpunkte gemeinsamer Tangenten von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  schneiden (429.), welcher also auf einer gemeinschaftlichen Sekante  $q$  von  $CC_1$  liegt. Die Tangenten in  $US$  an  $C$  und an  $V_1T_1$  an  $C_1$  müssen sich (425.) auf einer gemeinschaftlichen Sekante von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  schneiden und beide Schnittpunkte liegen in gerader Linie mit  $N$ , also:

Wenn die Kegelschnitte  $CC_1$  von  $\mathfrak{R}$  in  $UV_1$ , von  $\mathfrak{R}_1$  in  $ST_1$  alle vier aber von  $K$  doppelt berührt werden und die Geraden  $UV_1$  und  $ST_1$  sich in einem solchen Durchschnitte  $N$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$  schneiden, welcher auf der Verbindungslinie der Berührungspole von  $CC_1$  mit  $K$  liegt, so liegt 1) ein Schnittpunkt gemeinschaftlicher Tangenten von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  auf einer gemeinschaftlichen Sekante von  $CC_1$  und 2) ein Schnittpunkt  $N$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $CC_1$  auf einer gemeinschaftlichen Sekante von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$ .

431.  $K$  wurde von  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{R}_1$  doppelt berührt; es lassen sich nach Obigem Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  konstruieren, welche  $K$  doppelt und  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  einfach berühren. Die Berührungspunkte von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  mit  $C_1, C_2, C_3$  seien  $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3$  und zwar sollen die Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  so konstruiert sein, daß die Geraden  $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3$  in demselben Durchschnittpunkte  $S$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $\mathfrak{R}\mathfrak{R}_1$  sich treffen;  $S$  liegt dann auch auf den gemeinschaftlichen Sekanten von  $C_1C_2, C_2C_3, C_3C_1$  und ist also ein Chordalpunkt von  $C_1C_2C_3$ . Die



Geraden  $A_1A_2$  und  $B_1B_2$ ,  $A_2A_3$  und  $B_2B_3$ ,  $A_3A_1$  und  $B_3B_1$  schneiden sich in den Durchschnitten  $T_3$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  gemeinschaftlicher Tangenten von  $C_1C_2$ ,  $C_2C_3$ ,  $C_3C_1$  und zugleich liegen diese Punkte auf derselben gemeinsamen Sekante von  $\mathfrak{K}\mathfrak{K}_1$ , also ist  $T_1T_2T_3$  eine Gerade, deren Pole in Bezug auf  $C_1C_2C_3$  auf den Geraden  $SA_1$ ,  $SA_2$ ,  $SA_3$  liegen müssen, weil  $T_1$  der Pol von  $SA_1$  in Bezug auf  $C_1$ ,  $T_2$  der Pol von  $SA_2$  in Bezug auf  $C_2$  und  $T_3$  der Pol von  $SA_3$  in Bezug auf  $C_3$  ist. Daraus folgt:

*Berührt ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  drei andere  $C_1C_2C_3$  einfach in  $A_1A_2A_3$  und werden alle vier von einem fünften  $K$  doppelt berührt, so liegen  $A_1A_2A_3$  auf den Verbindungslinien eines Chordalpunktes von  $C_1C_2C_3$  mit den Polen einer Geraden, auf welcher drei Durchschnitte gemeinschaftlicher Tangenten von  $C_1C_2C_3$  liegen, diese Pole genommen in Bezug auf  $C_1C_2C_3$ .*

Durch diesen Satz wird die Aufgabe gelöst.

*Es sind drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  gegeben, welche einen vierten  $K$  doppelt berühren; man soll einen fünften  $\mathfrak{K}$  konstruieren, welcher  $K$  doppelt und  $C_1C_2C_3$  einfach berührt.*

432. Die im vorigen Satze angegebene Konstruktion liefert zwei Kegelschnitte. Da es vier Gerade, auf denen drei Durchschnittspunkte gemeinschaftlicher Tangenten liegen, und vier Chordalpunkte von  $C_1C_2C_3$  giebt und jede Verbindung einer solchen Geraden mit einem Chordalpunkte zwei Auflösungen giebt, so hat die Aufgabe im Allgemeinen 32 Auflösungen.

Mit gewissen Modificationen enthält diese Aufgabe die Auflösungen aller derjenigen Aufgaben, die entstehen, wenn man einen oder zwei, oder alle drei Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  je in einen Punkt oder eine Gerade übergehen läßt. Treten außerdem noch an Stelle von  $K$  zwei Punkte oder zwei Gerade, so erhält man die Konstruktion der Kegelschnitte aus Punkten und Geraden.

433. *Konjugierte Kegelschnittreihen.*

$K$  werde von  $C$  und  $C_1$  doppelt berührt; die Berührungsehnungen schneiden sich in  $P$  und durch  $P$  seien  $qr$  die gemeinschaftlichen Sekanten von  $CC_1$ . Zieht man von einem Punkte  $D$  von  $q$  Tangenten an  $KCC_1$ , so liegen die Berührungs-



punkte auf einem  $K$  doppelt berührenden Kegelschnitte  $k$ . Die Verbindungslinien der Berührungspunkte treffen sich zu zweien in den Schnittpunkten  $A$  und  $B$  gemeinschaftlicher Tangenten. Wenn  $D$  die Sekante  $q$  durchläuft, so durchläuft  $k$  eine Reihe von Kegelschnitten, die  $K$  doppelt berühren und sich in denselben zwei Punkten  $M$  und  $N$  der gemeinsamen Polare  $p$  von  $P$  für  $KCC_1$  schneiden (427.). Zieht man deshalb von  $A$  Tangenten an alle  $k$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem  $K$  doppelt berührenden Kegelschnitte  $\alpha$ ; ebenso liegen die Berührungspunkte aller von  $B$  gezogenen Tangenten auf einem Kegelschnitte  $\beta$ , der  $K$  doppelt berührt. Aus 428b. folgt, daß die Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten zweier Kegelschnitte  $k$  auf der Sekante  $q$  liegen, denn zu den Kegelschnitten  $k$  gehören auch solche, welche  $C$  und  $C_1$  berühren.

Es seien  $EF$  die beiden Schnittpunkte von  $q$  mit  $C$  und  $C_1$ ; also sind  $M$  und  $N$  diejenigen Durchschnitte der von  $E$  und  $F$  an  $K$  gezogenen Tangenten, welche auf  $p$  liegen. Alle Kegelschnitte  $k$  gehen durch  $M$  und  $N$ . Zieht man von irgend einem Punkte  $L$  auf  $MN$  Tangenten an alle  $k$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $\lambda$ , welcher  $K$  doppelt berührt und durch die Schnittpunkte  $E$  und  $F$  gehen muß, denn zu den Kegelschnitten  $k$ , welche  $K$  doppelt berühren und durch  $MN$  gehen, gehören auch die Geradenpaare  $(EM, FM)$  und  $(EN, FN)$ . Daher muß  $\lambda$  mit einem Kegelschnitte aus der Reihe  $CC_1$  derjenigen Kegelschnitte zusammenfallen, welche durch  $E$  und  $F$  gehen und  $K$  doppelt berühren. Also:

*Sind  $CC_1C_2 \dots$  Kegelschnitte durch zwei Punkte  $EF$ , berühren sie  $K$  doppelt und schneiden sich ihre Berührungssehnen in einem Punkte  $P$ , so liegen die Berührungspunkte aller Tangenten, die man von einem Punkte  $D$  auf  $EF$  an  $CC_1C_2 \dots$  ziehen kann, auf einem Kegelschnitte  $k$ , welcher  $K$  doppelt berührt und durch zwei feste Punkte  $M$  und  $N$  auf der Polare  $p$  von  $P$  bezüglich  $K$  geht. Wenn  $D$  sich auf  $EF$  bewegt, so durchlaufen alle  $k \dots$  eine Reihe von Kegelschnitten; zieht man an diese von irgend einem Punkte  $L$  auf  $p$  Tangenten, so liegen die Berührungspunkte auf einem der Kegelschnitte  $CC_1C_2 \dots$ . Die*



*Kegelschnittreihen  $CC_1C_2 \dots$  und  $k \dots$  heißen konjugiert. Zu den Kegelschnitten  $CC_1C_2 \dots$  gehören auch die Kegelschnitte  $\alpha$  und  $\beta$ .*

$C_1C_2C_3$  sollen drei Kegelschnitte sein, welche  $K$  doppelt berühren, so haben sie im Allgemeinen vier Chordalpunkte  $Q_1Q_2Q_3Q_4$ . Zieht man von diesen Tangenten an  $C_1C_2C_3$ , so liegen die Berührungspunkte auf vier Kegelschnitten  $k_1k_2k_3k_4$ , welche  $K$  doppelt berühren. Sind  $A_{12}$ ,  $A_{23}$ ,  $A_{31}$  solche Schnittpunkte gemeinschaftlicher Tangenten von  $C_1C_2$ ,  $C_2C_3$ ,  $C_3C_1$  die auf einer Geraden liegen und zieht man von  $A_{12}$  Tangenten an  $k_1$ , so liegen die Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte  $C_{12}$  aus der Reihe  $C_1C_2$ ; ebenso liegen die Berührungspunkte der von  $A_{23}$  an  $k_1$  und von  $A_{31}$  an  $k_1$  gezogenen Tangenten auf zwei Kegelschnitten  $C_{23}$  und  $C_{31}$  aus der Reihe  $C_2C_3$  und  $C_3C_1$ . Die drei Kegelschnitte  $C_{12}C_{23}C_{31}$  müssen sich aber in zwei Punkten schneiden, welche auf der Polare  $s$  des Punktes liegen, in welchem die Gerade  $A_{12}A_{23}A_{31}$  die Berührungssehne von  $k_1$  und  $K$  schneidet; man erhält diese Punkte, indem man von den Schnittpunkten der Geraden  $A_{12}A_{23}A_{31}$  und des Kegelschnittes  $k_1$  Tangenten an  $K$  zieht und diejenigen ihrer Durchschnitte bestimmt, welche auf jener genannten Polare  $s$  liegen. Zieht man von einem Punkte auf  $s$  Tangenten an die Kegelschnitte  $C_{12}C_{23}C_{31}$ , so liegen ihre Schnittpunkte auf einem  $K$  doppelt berührenden Kegelschnitte  $\mu$ , welcher die Kegelschnitte  $C_1C_2C_3$  in solchen Punkten schneidet, daß die Verbindungslinien von den auf 2 Kegelschnitten z. B.  $C_1$  und  $C_2$  befindlichen Schnittpunkten sich in den Tangentendurchschnitten  $A_{12}A_{23}A_{31}$ , hier in  $A_{12}$  schneiden.

## § 28.

### Das Polarsystem.

434. Zwei Strecken  $SS_1 = 2a$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1 = 2b$  halbieren Fig. 171. sich senkrecht in  $M$ ; sie heißen *Axen*. Von einem beliebigen Punkte  $A$  fälle man senkrecht  $PB$  und  $P\mathfrak{B}$  auf die Axen, mache  $SS_1BB_1$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  harmonisch, so heißt die Gerade  $B_1\mathfrak{B}_1$  oder  $p$  die *Polare* von  $P$ . Ist umgekehrt eine beliebige Gerade  $p$  gegeben, welche die Axen in  $B_1$  und  $\mathfrak{B}_1$  schneidet, so mache man wieder  $SS_1BB_1$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  har-







und 
$$\frac{MB}{X} + \frac{M\mathfrak{B}}{Y} = \frac{x}{X_1} + \frac{y}{Y_1} = 1.$$

Hieraus ergibt sich, daß  $P$  auf der Polare  $q$  oder  $D_1\mathfrak{D}_1$  von  $Q$  liegt. Darin aber liegt der Hauptsatz der Polarentheorie:

a. *Bewegt sich ein Punkt  $Q$  auf einer Geraden  $p$ , so dreht sich seine Polare  $q$  um den Pol  $P$  der letzteren und umgekehrt.*

b. *Die Polaren von vier harmonischen Punkten sind vier harmonische Strahlen.*

c. *Die Pole von vier harmonischen Strahlen sind harmonische Punkte.*

435. Von Interesse sind in dem so hergestellten Polarsystem diejenigen Punkte, welche auf ihren Polaren liegen und diejenigen Geraden, welche durch ihre Pole gehen.

Für den Fall, daß  $q$  durch  $Q$  geht, wird

$$\frac{x}{X} + \frac{y}{Y} = 1$$

und also

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

oder

$$\frac{a^2}{X^2} + \frac{b^2}{Y^2} = 1.$$

Man erkennt in diesen Gleichungen die Gleichung der Ellipse als Punkt- und Tangentengebilde. Daraus folgt also:

*Alle Punkte des Polarsystems, welche auf ihren Polaren liegen, erfüllen eine Ellipse; die Tangenten in ihnen sind ihre Polaren.*

437. Ohne die Gleichung des Kegelschnittes zu benutzen gelangt man zu den letzten Resultaten auf folgendem Wege. Man weiß zunächst, daß  $SS_1\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  solche Punkte sind, durch welche ihre Polaren gehen. Durch  $S$  ziehe man eine beliebige Gerade  $g$ ; auf ihr sei  $P$  irgend ein Punkt, dessen Polare  $p$  die Gerade  $g$  in  $P_1$  treffe, dann muß die Polare  $p_1$  von  $P_1$  durch  $P$  gehen. Sind nun  $PP_1SZ$  harmonisch, so sind ihre Polaren  $pp_1sz$  auch harmonisch und folglich muß  $z$  durch  $Z$  gehen und  $Z$  ist der einzige Punkt von  $g$ , dessen Polare durch ihn hindurchgeht. Wenn  $g$  sich um  $S$  dreht, so durchläuft  $Z$  eine krumme Linie. Auf gleiche Weise folgt, daß jede durch  $Z$  gelegte Gerade außer  $Z$  nur noch einen Punkt besitzen kann, dessen Polare durch ihn hindurchgeht und daß somit alle



Punkte, welche die Eigenschaft haben, daß ihre Polaren durch sie hindurchgehen, auf einer Curve  $K$  II. Ordnung liegen.

Sind  $JJ_1$  zwei Punkte von  $K$ ,  $P$  irgend ein Punkt der Geraden  $JJ_1$  oder  $g$  und  $P_1$  der Schnittpunkt von  $JJ_1$  mit der Polare  $p$  von  $P$ , so muß die Polare  $p_1$  von  $P_1$  durch  $P$  gehen. Sind  $PP_1JX$  harmonisch, so sind auch ihre Polaren  $pp_1ix$  harmonisch und müssen  $JJ_1$  in vier harmonischen Punkten schneiden. Da  $p$  durch  $P_1$ ,  $p_1$  durch  $P$ ,  $i$  durch  $J$  geht, so muß auch  $x$  durch  $X$  gehen. Es giebt aber auf der Geraden  $g$  außer  $J$  nur noch den Punkt  $J_1$ , welcher auf seiner Polare liegt, also muß  $J_1$  mit  $X$  zusammenfallen. Dies aber ergibt den Satz:

*Jede Sehne von  $K$  wird durch einen ihrer Punkte und seine Polare harmonisch geteilt.*

In gleicher Weise ergibt sich der reciproke Satz.




Fig. 172.

Um zu zeigen, daß  $K$  ein Kegelschnitt ist, beschreibt man um  $\mathfrak{S}$  mit  $a$  einen Bogen, welcher  $SS_1$  in  $FF_1$  schneidet, macht  $SS_1FL$  harmonisch, errichtet in  $F$  die Gerade  $l \perp SS_1$ , so ist sie die Polare von  $F$ . Die Polare eines Punktes  $G$  von

$l$  konstruiert man, indem man  $G\mathfrak{H} \perp \mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  fällt,  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1\mathfrak{H}\mathfrak{H}_1$  harmonisch macht und  $F\mathfrak{H}_1$  zieht.

Weil  $MF \cdot ML = a^2 = MF^2 + M\mathfrak{S}^2$  im  $\triangle MF\mathfrak{S}$ ,

so ist  $MF(ML - MF) = M\mathfrak{S}^2$

oder  $MF \cdot LF = M\mathfrak{S}^2 = M\mathfrak{H} \cdot M\mathfrak{H}_1$

und  $MF : M\mathfrak{H}_1 = M\mathfrak{H} : LF$ .

Da  $M\mathfrak{H} = GL$ , so folgt aus der letzten Proportion die Ähnlichkeit der Dreiecke  $FGL$  und  $MF\mathfrak{H}_1$ , woraus sich ergibt

$$\sphericalangle G F \mathfrak{H}_1 = 1 R.$$

Nennt man  $FF_1$  die Brennpunkte des Polarsystems und  $ll_1$  ihre Leitlinien, so folgt die Fundamenteleigenschaft der Brennpunkte und Leitlinien:



Die Polare eines Punktes einer Leitlinie steht in ihrem Brennpunkte auf seiner Verbindungslinie mit jenem Punkte senkrecht.

438. Die Sehne  $JJ_1$  treffe die Leitlinie  $l$  in  $Q$ ; man ziehe  $QF$  und in  $F$  die Gerade  $q \perp QF$ , so ist  $q$  die Polare von  $Q$ . Wenn diese  $JJ_1$  in  $Q_1$  trifft, so sind  $JJ_1QQ_1$  harmonisch; daher halbieren, weil  $q \perp QF$ , die Geraden  $FQ'$  und  $FQ_1$  die von  $FJ$  und  $FJ_1$  gebildeten Winkel, also ist  $FJ:FJ_1 = QJ:QJ_1$  und wenn man  $JN$  und  $J_1N_1$  senkrecht auf  $l$  fällt, auch  $QJ:QJ_1 = NJ:N_1J_1$ , daher auch  $FJ:NJ = FJ_1:N_1J_1$ . Dreht sich die Gerade  $JJ_1$  um  $J_1$ , so folgt, daß das Verhältniß  $FJ:NJ$  für den veränderlichen Punkt  $J$  von  $K$  konstant gleich  $FJ_1:N_1J_1$  ist; also ist  $K$  ein Kegelschnitt (cf. 126), er heißt der *Kernkegelschnitt* des Polarsystems.

439. Die eben auseinandergesetzte Methode führt nur zum Polarsystem einer Ellipse; sie läßt sich jedoch verallgemeinern und liefert dann auch die Hyperbel.

Zwei sich senkrecht schneidende Gerade  $s$  und  $\mathfrak{s}$  treffen sich in  $M$ ; auf beiden liegen Involutionen mit dem Centralpunkte  $M$ . Von einem beliebigen Punkte  $P$  fälle man die Senkrechten  $PB$  auf  $s$  und  $P\mathfrak{B}$  auf  $\mathfrak{s}$ , suche die in den Involutionen zu  $B$  und  $\mathfrak{B}$  zugeordneten Punkte  $B_1$  und  $\mathfrak{B}_1$ , dann soll die Gerade  $B_1\mathfrak{B}_1$  oder  $p$  die Polare von  $P$  heißen. Es ist leicht ersichtlich, wie man von der Geraden  $p$  zum Punkte  $P$  gelangt. Dadurch aber ist das Polarsystem hergestellt, für welches in der vorhin angegebenen Weise die genannten harmonischen Eigenschaften abgeleitet werden. Zu den Brennpunkteigenschaften gelangt man auf etwas abweichendem Wege.

Von den Involutionen habe nur diejenige auf  $s$  Doppelpunkte  $SS_1$ ; man beschreibe über  $SS_1$  einen Kreis, schneide ihn mit einer Tangente von  $K$  in  $RR_1$ , errichte in diesen Punkten auf  $RR_1$  Senkrechte, welche  $SS_1$  in  $FF_1$  schneiden. Construiert man dann einen Kegelschnitt mit der Axe  $SS_1$  und den Brennpunkten  $FF_1$ , so muß dieser mit  $K$  zusammenfallen. Cf. 232c.

Hat keine von den Involutionen Doppelpunkte, so giebt es in dem Polarsystem keinen Punkt, welcher auf seiner Polare



liegt; der Kernkegelschnitt des Polarsystems ist imaginär. Da in diesem Falle die Potenzen beider Involutionen negativ sind, gleich  $-a^2$  und  $-b^2$ , so erhält man als Gleichung des imaginären Kegelschnittes

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1.$$

440. Auch auf folgende Art erhält man die Brennpunkte des Polarsystems. Es seien die Potenzen der Involutionen auf den Axen  $a^2$  und  $b^2$ . Durch einen Punkt  $C$  der ersteren ziehe man eine beliebige Gerade  $d$  und fälle von ihrem Pole  $D$  die Senkrechte  $DE$  auf  $d$ ; diese schneide die Axe in  $G$ .




Fig. 173.

Fällt man  $DH$  senkrecht auf die Axe  $AA_1$ , so ist  $DH$  die Polare von  $C$  und die Gerade  $JG$  muß auf  $CD$  senkrecht stehen, denn die drei Höhen eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkte, hier  $G$ . Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke  $CDH$  und  $G H J$  folgt  $CH \cdot GH = DH \cdot JH$ .



Die Punkte  $D$  und  $J$  sind konjugierte Punkte; dreht sich  $d$  um  $C$ , so bleibt das Produkt  $DH \cdot JH$  konstant gleich  $HL^2 = HN^2$ . Man fälle  $LO$  senkrecht auf die andere Axe und ziehe die Gerade  $CN$ , die Polare von  $L$ , welche diese Axe in  $P$  schneiden mag. Da  $L$  der Pol von  $PN$  ist, so muß die Polare von  $P$  durch  $L$  gehen, sie steht aber auch auf  $MP$  senkrecht, also sind  $O$  und  $P$  konjugierte Punkte und es ist  $MO \cdot MP = b^2$ . Dann verhält sich

$$HL^2 : b^2 = HN^2 : MP \cdot MO = HN : MP, \\ = HC : MC \text{ also ist,}$$

$$HL^2 = b^2 \cdot \frac{HC}{MC}, \text{ daher auch}$$

$$CH \cdot GH = b^2 \cdot \frac{HC}{MC} \text{ oder } GH \cdot MC = b^2$$

$$(MH - MG)MC = b^2$$

$$MH \cdot MC - MG \cdot MC = b^2.$$

Aber  $MH \cdot MC = a^2$ , also

$$MG \cdot MC = a^2 - b^2 = c^2.$$

Wie man auch  $d$  um  $C$  drehen mag, der konjugierte Normalstrahl  $DE$  schneidet die Axe  $AA_1$  in einem festen Punkte  $G$ , so daß  $MG \cdot MC = a^2 - b^2 = c^2$ . Macht man nun  $MF = MF_1 = c$ , so muß der konjugierte Normalstrahl zu jeder durch  $F$  bez.  $F_1$  gezogenen Geraden durch diesen Punkt gehen. Daher sind  $F$  und  $F_1$  die Brennpunkte.

Ändert sich  $C$  auf der Axe, so thut dies auch  $G$ ; die Punktpaare  $CG$  bilden aber wegen der Gleichung  $MC \cdot MG = a^2 - b^2$  eine Involution mit dem Centralpunkte  $M$ , deren Doppelpunkte die beiden Brennpunkte  $F$  und  $F_1$  sind.

Im Punkte  $E$  sind  $EC$  und  $ED$  die beiden konjugierten Normalstrahlen. Erwägt man noch, daß im Berührungspunkte einer Tangente diese und ihre Normale konjugierte Strahlen sind, so folgt:

*Konstruiert man in einem beliebigen Punkte die beiden konjugierten Normalstrahlen oder in einem Punkte des Kernkegelschnittes Tangente und Normale, so schneiden sie die Hauptaxe in einem Punktpaare einer Involution mit dem Centralpunkte  $M$*



und der Potenz  $a^2 - b^2$ , deren Doppelpunkte die Brennpunkte  $F$  und  $F_1$  sind.

Die beiden konjugierten Normalstrahlen  $EC$  und  $ED$  mögen die Nebenaxe in  $C_1$  und  $G_1$  schneiden; die Polare von  $C_1$  muß durch  $D$  gehen und auf der Nebenaxe senkrecht stehen. Sie treffe diese in  $H_1$  und  $CC_1$  in  $J_1$ . Im Dreiecke  $C_1DJ_1$  ist  $G_1$  der Durchschnitt der Höhen, also ist

$$H_1J_1 \cdot H_1D = G_1H_1 \cdot C_1H_1.$$

In gleicher Art wie vorhin findet man  $MJ_1 \cdot H_1D = a^2 \cdot \frac{H_1C_1}{MC_1}$ , also  $G_1H_1 \cdot C_1H_1 = a^2 \cdot \frac{H_1C_1}{MC_1}$  und  $MC_1 \cdot G_1H_1 = a^2$ . Setzt man  $G_1H_1 = MG_1 + MH_1$  und  $MC_1 \cdot MH_1 = b^2$ , so hat man auch

$$MC_1 \cdot MG_1 = a^2 - b^2, \text{ also}$$

Alle konjugierten Normalstrahlenpaare schneiden die Nebenaxe in den Punktpaaren einer Involution, deren Centralpunkt  $M$  und deren Potenz  $a^2 - b^2$  ist. Diese Involution hat keine Doppelpunkte; die Kreise über den einzelnen Punktpaaren schneiden sich in den beiden Brennpunkten.

Ein spezieller Fall dieses Satzes lautet:

Irgend eine Tangente und ihre Normale schneiden die Nebenaxe in zwei Punkten, welche mit den Brennpunkten auf einem Kreise liegen.

441. Im Falle der Parabel muß die obige Beweisführung




Fig. 174.

ihre Giltigkeit verlieren, da der Mittelpunkt  $M$  ins Unendliche rückt. Man muß daher eine andere Eigenschaft der Parabel zu Hilfe nehmen, die zunächst abgeleitet werden soll. Es seien  $BD$  und  $BD_1$  zwei Tangenten, welche die Scheiteltangente in  $CC_1$  treffen. Die drei Tangenten  $CD$ ,

$CC_1$ ,  $C_1D$  bilden mit der unendlich fernen Geraden ein umgeschriebenes Vierseit, in welchem sich die Diagonalen und



Verbindungslinien der Berührungspunkte auf den Gegenseiten in einem Punkte treffen. Daher muß  $DD_1$  die Axe in einem solchen Punkte  $G$  schneiden, daß  $CG \parallel C_1D_1$  und  $C_1G \parallel CD$  wird. Man fälle noch  $DE$  und  $D_1E_1$  senkrecht auf die Axe.

Aus ähnlichen Dreiecken folgt, wenn man noch  $BH \parallel AE$  zieht

$$DE : D_1E_1 = CD : C_1G = CD : CB = AE : BH$$

$$DE : D_1E_1 = CG : C_1D_1 = BC_1 : C_1D_1 = BH : AE_1,$$

aus welchen Proportionen durch Zusammensetzung sich der Satz ergibt

$$DE^2 : D_1E_1^2 = AE : AE_1.$$

Fällt man aus zwei Parabelpunkten die Senkrechten auf die Axe, so verhalten sich ihre Quadrate wie ihre Entfernungen vom Scheitel.

Die Gerade  $d$  schneide die Axe in  $C$ ; von ihrem Pole  $D$  sie  $DE$  senkrecht auf  $d$  und  $G$  der Schnittpunkt von  $DE$  mit der Axe. Ferner sei  $DH$  senkrecht zur

Axe, dann folgt aus den ähnlichen Dreiecken  $DGH$  und  $CJH$  die Gleichung  $GH \cdot HC = HD \cdot HJ = HK^2$ , da  $D$  und  $J$  konjugierte Punkte der Involution auf  $HK$  sind und  $H$  der Centralpunkt




Fig. 175.

der letzteren ist. Wenn sich  $d$  um  $C$  dreht, so bleibt  $HK$ , da es die Polare von  $C$  ist, und somit das Produkt  $GH \cdot CH$ , also Punkt  $G$  ungeändert. Ist  $d_1$  parallel zu  $d$ , sind  $C_1D_1E_1G_1H_1J_1K_1$  die analogen Punkte, so ist

$$HG \cdot HC : H_1G_1 \cdot H_1C_1 = HK^2 : H_1K_1^2 = AH : AH_1$$

Weil aber  $AC = AH$ ,  $AC_1 = AH_1$ , so folgt  $HG = H_1G_1$ , also auch  $GG_1 = HH_1 = CC_1$ . Mithin haben die Punktpaare  $CG$ ,  $C_1G_1$ , ... dieselbe Mitte  $F$  und diese muß der Brennpunkt sein.

442. Das Polarsystem ist bestimmt durch die Involutionen auf den beiden Axen; es ist aber auch bestimmt durch die



Involution auf einer Axe und irgend einen Punkt  $P$  des Kernkegelschnittes  $K$ .

Von  $P$  fälle man die Senkrechten  $PB$ ,  $P\mathfrak{B}$  auf die Axen, suche zu  $B$  den involutorisch zugeordneten Punkt  $B_1$ , dann ist  $PB_1$  Tangente in  $P$  an  $K$ ; sie möge  $\mathfrak{s}$  in  $\mathfrak{B}_1$  treffen. Durch  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  und den Centralpunkt  $M$  ist aber die Involution auf  $\mathfrak{s}$  und somit das Polarsystem bestimmt.

Durch die Involution auf der einen Axe  $s$  des Kernkegelschnittes  $K$  ist also das Polarsystem nicht vollständig bestimmt; es giebt einfach unendlich viele solcher Polarsysteme, was man leicht daraus erkennt, wenn man den zur vollständigen Bestimmung nothwendigen Punkt  $P$  eine Gerade durchlaufen läßt, da er auf dieser einfach unendlich viele Lagen einnimmt. Die allen Systemen gemeinsamen Eigenschaften sollen abgeleitet werden.

443. Von einem Polarsystem sei ein fester Punkt  $P$  des Kernkegelschnittes  $K$  und die veränderliche Involution auf der Axe  $s$  mit dem Centralpunkte  $M$  gegeben. Man fälle die Senkrechten  $PB$  und  $P\mathfrak{B}$ , und aus  $R$ , einem beliebigen Punkte,  $RD$  und  $R\mathfrak{D}$ , suche in einer Involution die zu  $B$  und  $D$  involutorisch zugeordneten Punkte  $B_1$  und  $D_1$ , dann ist  $B_1P$  eine Tangente an  $K$ ; diese treffe  $\mathfrak{s}$  in  $\mathfrak{B}_1$ , so ist durch das Punktpaar  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  und den Centralpunkt  $M$  auch die Involution auf  $\mathfrak{s}$  bestimmt. Man setze  $MB = p$ ,  $MD = r$ ,  $M\mathfrak{B} = \mathfrak{p}$ ,  $M\mathfrak{D} = \mathfrak{r}$ . Sind  $D_1$  und  $\mathfrak{D}_1$  die zu  $D$  und  $\mathfrak{D}$  involutorisch zugeordneten Punkte, so ist die Gerade  $D_1\mathfrak{D}_1$  die Polare  $\varrho$  von  $R$ . Wenn man noch  $MB_1 = p_1$ ,  $MD_1 = r_1$ ,  $M\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{p}_1$ ,  $M\mathfrak{D}_1 = \mathfrak{r}_1$  setzt, so ist die Bedingung dafür, daß ein Punkt  $Q$ , dessen Entfernungen von den Axen  $s$  und  $\mathfrak{s}$  gleich  $y$  und  $x$  sind (cf. 434.) auf  $D_1\mathfrak{D}_1$  liegt,

$$\frac{x}{r_1} + \frac{y}{\mathfrak{r}_1} = 1. \text{ Da } P \text{ auf } B_1\mathfrak{B}_1 \text{ liegt,}$$

$$\text{so ist auch} \quad \frac{p}{p_1} + \frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{p}_1} = 1.$$

Aus den Eigenschaften der Involution folgt,

$$p \cdot p_1 = r \cdot r_1, \quad \mathfrak{p} \cdot \mathfrak{p}_1 = \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{r}_1, \text{ also}$$

$$\frac{xr}{pp_1} + \frac{y\mathfrak{r}}{\mathfrak{p}\mathfrak{p}_1} = 1.$$



Andert sich nun die Involution auf  $s$  und bezeichnen  $p_2 p_2$  die den Strecken  $p_1 p_1$  analogen Strecken, so hat man auch

$$\frac{xr}{pp_2} + \frac{yr}{p p_2} = 1.$$

Erweitert man die letzten Gleichungen mit  $p_1$  und  $p_2$  und zieht sie von einander ab, so erhält man

$$\frac{xr}{p} \left( \frac{p_1}{p_1} - \frac{p_2}{p_2} \right) = p_1 - p_2.$$

Aus den Gleichungen

$$\frac{p}{p_1} + \frac{p}{p_1} = 1$$

und

$$\frac{p}{p_2} + \frac{p}{p_2} = 1$$

ergiebt sich

$$p \left( \frac{p_1}{p_1} - \frac{p_2}{p_2} \right) = p_1 - p_2,$$

also

$$xr = p^2$$

und ebenso

$$yr = p^2.$$

Wie sich also auch die Involution auf  $s$  ändern mag, die Polaren von  $R$  gehen durch einen festen Punkt, dessen Entfernungen von  $\xi$  und  $s$  gegeben sind durch

$$x = \frac{p^2}{r} \quad \text{und} \quad y = \frac{p^2}{r}.$$

Die Kernkegelschnitte  $K$  aller Polarsysteme gehen außer durch  $P$  noch durch drei andere feste Punkte  $P_1 P_2 P_3$ , die mit  $P$  symmetrisch zu  $s$ ,  $\xi$  und  $M$  liegen und bilden ein Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten. Für dieses aber gilt nach Obigem der Satz:

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle einem Rechtecke umgeschriebenen Kegelschnitte schneiden sich in einem Punkte.*

444. Das Polarsystem ist auch durch eine Involution auf der einen Axe  $s$  und durch ein Paar konjugierter Punkte  $P$  und  $Q$  gegeben. Denn sind  $PB$  und  $P\mathfrak{B}$  senkrecht auf  $s$  und  $\xi$ , ist  $B_1$  der zu  $B$  involutorisch zugeordnete Punkt, so ist  $B_1 Q$  die Polare von  $P$ ; schneidet sie  $\xi$  in  $\mathfrak{B}_1$ , dann ist  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  ein Punktpaar der Involution auf  $\xi$  und diese ist also durch dasselbe und den Centralpunkt  $M$  gegeben. Hält man das Punktpaar  $PQ$  und die Axen fest, läßt aber die Involution auf  $s$  sich ändern, jedoch so, daß der Schnittpunkt  $M$



der Axen der Centralpunkt bleibt; so ändern sich auch die Polarsysteme und die Kernkegelschnitte  $K$ . Die letzteren haben jedoch die Axen und ein Paar konjugierter Punkte gemeinsam. Man nehme eine bestimmte Involution auf  $s$  an, fälle  $PB$ ,  $QC$  und  $P\mathfrak{B}$ ,  $Q\mathfrak{C}$  senkrecht auf  $s$  und  $\mathfrak{s}$ , bestimme zu  $BC$  die involutorisch zugeordneten Punkte  $B_1C_1$ , schneide  $\mathfrak{s}$  mit  $B_1Q$  in  $\mathfrak{B}_1$  und konstituiere durch  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  und den Centralpunkt  $M$  auf  $\mathfrak{s}$  die Involution; endlich nehme man einen beliebigen Punkt  $R$ , fälle  $RD$  und  $R\mathfrak{D}$  senkrecht auf  $s$  und  $\mathfrak{s}$ , bestimme die involutorisch zugeordneten Punkte  $D_1\mathfrak{D}_1$  zu  $D\mathfrak{D}$ , dann ist  $D_1\mathfrak{D}_1$  die Polare von  $R$ . Hat ein Punkt  $X$  der letzteren von  $\mathfrak{s}$  und  $s$  die Entfernungen  $x$  und  $y$  und setzt man  $MB = p$ ,  $MB_1 = p_1$ ,  $MC = q$ ,  $MC_1 = q_1$ ,  $MD = r$ ,  $MD_1 = r_1$ ,  $M\mathfrak{B} = \mathfrak{p}$ ,  $M\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{p}_1$ ,  $M\mathfrak{C} = \mathfrak{q}$ ,  $M\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{q}_1$ ,  $M\mathfrak{D} = \mathfrak{r}$ ,  $M\mathfrak{D}_1 = \mathfrak{r}_1$ , so sind die Bedingungen dafür, daß  $X$  auf  $D_1\mathfrak{D}_1$  und  $Q$  auf  $B_1\mathfrak{B}_1$  liegt,

$$\frac{x}{r_1} + \frac{y}{\mathfrak{r}_1} = 1$$

und

$$\frac{q}{p_1} + \frac{\mathfrak{q}}{\mathfrak{p}_1} = 1.$$

Da aber  $pp_1 = qq_1 = rr_1$ ,  $\mathfrak{p} \cdot \mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q} \cdot \mathfrak{q}_1 = \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{r}_1$ , so ist

$$\frac{xr}{pp_1} + \frac{y\mathfrak{r}}{\mathfrak{p}\mathfrak{p}_1} = 1.$$

Sind für ein anderes Polarsystem  $p_2$   $\mathfrak{p}_2$   $r_2$   $\mathfrak{r}_2$  die den Strecken  $p_1$   $\mathfrak{p}_1$   $r_1$   $\mathfrak{r}_1$  analogen Strecken, so erhält man an Stelle der letzten Gleichungen

$$\frac{q}{p_2} + \frac{\mathfrak{q}}{\mathfrak{p}_2} = 1$$

$$\frac{xr}{pp_2} + \frac{y\mathfrak{r}}{\mathfrak{p}\mathfrak{p}_2} = 1.$$

Aus den vier letzten Gleichungen folgt leicht

$$\frac{xr}{p} \left( \frac{\mathfrak{p}_1}{p_1} - \frac{\mathfrak{p}_2}{p_2} \right) = \mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_2,$$

$$q \left( \frac{\mathfrak{p}_1}{p_1} - \frac{\mathfrak{p}_2}{p_2} \right) = \mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_2$$

woraus

$$x = \frac{pq}{r}$$

und ebenso

$$y = \frac{p\mathfrak{q}}{\mathfrak{r}}.$$



sich ergibt, d. h. für alle konstruierten Polarsysteme geht die Polare von  $R$  durch einen festen Punkt, der von den gemeinsamen Axen die Abstände  $\frac{pq}{r}$  und  $\frac{pq}{r}$  hat. Daraus aber folgt für die Kernkegelschnitte  $K$  der Satz:

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf alle Kegelschnitte, welche dieselben Axen und zwei feste konjugierte Punkte haben, schneiden sich in einem Punkte.*

445. Die Gesamtheit der Kegelschnitte, welche dieselben Axen haben und außerdem durch einen Punkt  $P$  gehen oder zwei Punkte  $P$  und  $Q$  zu konjugierten Punkten haben, bildet ein *Kegelschnittbüschel*. Im ersten Falle haben alle Kegelschnitte desselben außer  $P$  noch drei gemeinsame Punkte; im zweiten haben sie entweder vier gemeinschaftliche Punkte oder gar keine, aber noch drei leicht angebbare Paare von konjugierten Punkten. Sind nämlich  $P_1 P_2 P_3$  und  $Q_1 Q_2 Q_3$  die in Bezug auf  $sM$  symmetrisch liegenden Punkte zu  $P$  und  $Q$ , so sind  $P_1$  und  $Q_1$ ,  $P_2$  und  $Q_2$ ,  $P_3$  und  $Q_3$  konjugierte Punkte in Bezug auf alle Kegelschnitte.

Man unterscheidet also Kegelschnittbüschel mit vier reellen Grundpunkten und ohne Grundpunkte. Jedes der beiden Büschel ist aber durch zwei seiner Kegelschnitte bestimmt; denn dieselben bestimmen im ersten Falle die Grundpunkte und im anderen ein Paar konjugierter Punkte  $PQ$ .

446. Sind  $K_1 K_2$  zwei ganz beliebige Kegelschnitte, die

nicht gemeinschaftliche Axen haben und entweder vier reelle Schnittpunkte oder keinen reellen Schnittpunkt, also ein reelles Poldreieck haben, so läßt sich leicht eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher jenen Kegelschnitten zwei andere mit gemeinschaftlichen Axen verwandt sind. Ist nämlich  $ABC$  das beiden Kegelschnitten gemeinsame




Fig. 176.



Poldreieck, so hat man die Verwandtschaft so zu wählen, daß die der Geraden  $AB$  verwandte Gerade  $A_1B_1$  ins Unendliche fällt und daß dem Winkel  $ACB$  ein rechter Winkel verwandt ist. Der Scheitel desselben ist dann der Mittelpunkt und seine Schenkel sind die Axen des Kegelschnitts. Zu dem Zwecke beschreibe man über  $AB$  einen Halbkreis, nehme darauf beliebig  $S$ , falle  $SD \perp AB$ , mache  $DE = SD$ , und  $l \perp SE$  in  $E$ , dann sind  $S$  und  $l$  Centrum und Axe der Verwandtschaft; sind  $C$  und  $C_1$  verwandte Punkte,  $C_1A_1 \parallel CA$ ,  $C_1B_1 \parallel CB$ , so sind  $C_1A_1$  und  $C_1B_1$  die Axen der verwandten Kegelschnitte. Diese konstituieren ein Büschel, dessen Kegelschnitten andere verwandt sind, welche mit  $K_1K_2$  ein Büschel bilden. Für dieses gilt daher der Satz:

*Die Polaren eines Punktes  $P$  in Bezug auf alle Kegelschnitte eines Büschels, das vier reelle Grundpunkte oder keinen reellen Grundpunkt hat, schneiden sich in einem Punkte  $Q$ , dem konjugierten zu  $P$  in Bezug auf das Büschel.*

447. Auf einer Geraden  $g$  seien  $AB$  durch  $CD$  harmonisch getrennt, die Pole von  $g$  bezüglich der Kegelschnitte des Büschels seien  $G_1G_2G_3 \dots$ , die konjugierten Punkte zu  $ABCD$  seien  $A_1B_1C_1D_1$ . Verbindet man letztere mit den Polen  $G_1G_2G_3 \dots$ , so erhält man die Polaren von  $ABCD$  und diese sind harmonisch, weil  $ABCD$  harmonisch sind, daher ist der Ort von  $G_1G_2G_3 \dots$  ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ , auf welchem auch  $A_1B_1C_1D_1$  liegen. Läßt man  $CD$ , also auch  $C_1D_1$  sich ändern, so erkennt man, daß alle zu den Punkten von  $g$  konjugierten Punkte auf  $\mathfrak{K}$ , dem *Polarkegelschnitt* von  $g$  liegen.




Fig. 177.

$g$  schneide einen Kegelschnitt  $K$  des Büschels in  $E$  und  $F$ , die Tangenten in diesen Punkten an  $K$  mögen sich in  $G$  treffen. Sie gehen durch die konjugierten Punkte  $E_1$  und  $F_1$  zu  $E$  und  $F$ . Die drei Punkte  $E_1F_1G$  liegen auf  $\mathfrak{K}$ ; da  $E$  und  $E_1$ ,  $F$  und  $F_1$  konjugiert sind, so sind auch  $H$  und  $H_1$



konjugiert für alle Kegelschnitte des Büschels (cf. 192). Da aber  $H$  auf  $g$  liegt, so muß  $H_1$ , wie vorhin bewiesen, auf  $\mathfrak{R}$  liegen. Es ist also  $GE_1H_1F_1$ , ein diesem eingeschriebenes Viereck und  $EF$  sind konjugierte Punkte in Bezug auf  $\mathfrak{R}$ . Demnach bilden die Schnittpunkte von  $g$  mit allen Kegelschnitten des Büschels eine Involution. Zusammenfassend:

*Die Pole einer Geraden  $g$  in Bezug auf die Kegelschnitte eines Büschels mit vier Grundpunkten oder ohne Grundpunkte liegen auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{R}$ , dem Polarkegelschnitte von  $g$ ; auf diesem liegen auch diejenigen Punkte, welche den Punkten von  $g$  bezüglich des Büschels konjugiert sind.*

*Alle Kegelschnitte des Büschels schneiden eine Gerade  $g$  in den Punktpaaren einer Involution. — Die Punktpaare dieser Involution bestehen aus konjugierten Punkten bezüglich des Polarkegelschnittes  $\mathfrak{R}$  von  $g$ .*

Da die Mittelpunkte der Kegelschnitte die Pole der unendlich fernen Geraden  $g_\infty$  sind, so folgt auch noch:

*Die Mittelpunkte aller Kegelschnitte eines Büschels mit vier Grundpunkten oder ohne Grundpunkte liegen auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{M}$ .*

Die Involution, in welcher die Kegelschnitte eines Büschels eine Gerade schneiden, hat höchstens zwei Doppelpunkte. In ihnen berühren zwei Kegelschnitte die Gerade. Daraus aber folgt:

*Von allen Kegelschnitten eines Büschels berühren im Allgemeinen zwei eine Gerade.*

448. Es bleibt zu untersuchen, ob in den besprochenen Kegelschnittbüscheln Kegelschnitte von allen drei Gattungen vorkommen. Zunächst ist leicht zu erkennen, daß in den Kegelschnittbüscheln, deren Kegelschnitte dieselben Axen haben, Ellipsen und Hyperbeln, aber keine Parabeln vorkommen, weil  $M$  der Mittelpunkt eines jeden Kegelschnittes ist und im Endlichen liegt.

Ist ein beliebiges Kegelschnittbüschel durch zwei Kegelschnitte  $K_1K_2$  konstituiert, so läßt sich eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher allen Kegelschnitten des Büschels solche  $\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2$  mit denselben Axen verwandt sind. (Cf. 446.)  $S$  und  $l$  seien Centrum und Axe der Verwandtschaft,  $g$  sei die Mittellinie beider, also diejenige Gerade,







beiden seien Involutionen gegeben, deren Centralpunkte  $M$  und  $A$  sein mögen. Der zu  $A$  involutorisch zugeordnete Punkt auf  $s$  sei  $A_1$ . Es sei  $P$  ein beliebiger Punkt; man fälle  $PB \perp s$  und schneide  $\xi$  mit  $A_1P$  in  $\mathfrak{B}$ , verbinde dann die beiden  $B$  und  $\mathfrak{B}$  involutorisch zugeordneten Punkte  $B_1$  und  $\mathfrak{B}_1$  durch die Gerade  $p$  und ordne  $P$  und  $p$  als Pol und Polare einander zu. Wie man von der Geraden  $p$  zu ihrem Pole  $P$  gelangt, ist sofort ersichtlich.

Auf  $p$  nehme man beliebig den Punkt  $Q$ , fälle  $QC \perp s$ , schneide  $\xi$  mit  $A_1Q$  in  $\mathfrak{C}$ , konstruiere den zu  $C$  involutorisch zugeordneten Punkt  $C_1$  und schneide  $\xi$  mit  $PC_1$  in  $\mathfrak{C}_1$ , so läßt sich zeigen, daß  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}_1$  auf  $\xi$  involutorisch zugeordnet sind und daß die Gerade  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  also die Polare  $q$  von  $Q$  ist. — Aus ähnlichen Dreiecken folgt:

$$\begin{aligned} A\mathfrak{C}_1 &= \frac{BP \cdot AC_1}{BC_1}, \quad BP = \frac{A\mathfrak{B} \cdot A_1B}{AA_1}, \quad \text{also} \\ A\mathfrak{C}_1 &= \frac{AC_1 \cdot A\mathfrak{B} \cdot A_1B}{BC_1 \cdot AA_1} \\ A\mathfrak{C} &= \frac{CQ \cdot AA_1}{A_1C}, \quad CQ = \frac{A\mathfrak{B}_1 \cdot B_1C}{AB_1} \quad \text{und daher} \\ A\mathfrak{C} &= \frac{AA_1 \cdot A\mathfrak{B}_1 \cdot B_1C}{A_1C \cdot AB_1}. \end{aligned}$$

Durch Multiplikation

$$A\mathfrak{C} \cdot A\mathfrak{C}_1 = \frac{AC_1 \cdot A\mathfrak{B} \cdot A_1B \cdot A\mathfrak{B}_1 \cdot B_1C}{BC_1 \cdot A_1C \cdot AB_1}.$$

Bezeichnet man nun die Potenzen der Involutionen auf  $s$  und  $\xi$  mit  $a^2$  und  $\alpha^2$ , so ist

$$\begin{aligned} A\mathfrak{B} \cdot A\mathfrak{B}_1 &= \alpha^2 \quad \text{und} \\ MA \cdot MA_1 &= MB \cdot MB_1 = MC \cdot MC_1 = a^2. \end{aligned}$$

Aus den letzten Gleichungen folgen die Proportionen

$$\begin{aligned} MA : MB &= MB_1 : MA_1 \\ MB : MC &= MC_1 : MB_1 \\ MC : MA &= MA_1 : MC_1 \end{aligned}$$

und aus diesen durch leichte Umformung

$$\begin{aligned} AB_1 : A_1B &= MA : MB \\ BC_1 : B_1C &= MB : MC \\ CA_1 : C_1A &= MC : MA, \end{aligned}$$



also durch Zusammensetzung

$$AB_1 \cdot BC_1 \cdot CA_1 = A_1B \cdot B_1C \cdot C_1A,$$

daher

$$A\mathfrak{C} \cdot A\mathfrak{C}_1 = \alpha^2.$$

Es sind also  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}_1$  involutorisch zugeordnete Punkte und  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  ist die Polare  $q$  von  $Q$ . Daraus aber ergibt sich die Haupteigenschaft des Polarsystems:

*Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden und umgekehrt.*

*Die Polaren von vier harmonischen Punkten sind harmonische Strahlen und die Pole von vier harmonischen Strahlen sind harmonische Punkte.*

Wenn man die Konstruktion der Polare für einen Punkt von  $s$  vornimmt, so ergibt sich, daß die Polare desselben im involutorisch zugeordneten Punkte auf  $s$  senkrecht steht.

Für die Punkte der Geraden  $g$ , welche in  $A_1$  auf  $s$  senkrecht steht, versagt die obige Konstruktion der Polare. Ist  $R$  ein Punkt von  $g$ , so lege man durch  $R$  zwei Gerade  $l$  und  $l'$  und konstruiere ihre Pole  $L$  und  $L'$ , dann muß der Pol von  $LL'$  nach dem obigen Satze sowohl auf  $l$  als auf  $l'$  liegen, also  $R$  sein; daher ist  $LL'$  die Polare von  $R$ . Dieselbe muß durch  $A$  gehen, da  $A$  der Pol von  $g$  ist.

Um außer den harmonischen Beziehungen auch die Brennpunkteigenschaften abzuleiten, nehme man noch an, daß die Involutionen auf  $s$  und  $\mathfrak{s}$  die reellen Doppelpunkte  $SS_1$  und  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1$  haben und daß  $AA_1$  mittelst der Proportion

$$MS : MA = AA_1 : A\mathfrak{S}$$

bestimmt seien. Schneidet nun die Gerade  $l$  die Geraden  $s$  und  $\mathfrak{s}$  in  $D_1$  und  $\mathfrak{D}_1$  und sind  $D$  und  $\mathfrak{D}$  involutorisch zugeordnet, so ist  $A\mathfrak{D} \cdot A\mathfrak{D}_1 = A\mathfrak{S}^2 = \frac{MA^2 \cdot AA_1^2}{MS^2}$

$$= \frac{MA^2 \cdot AA_1^2}{MA \cdot MA_1} = \frac{MA \cdot AA_1^2}{MA_1}.$$

Aus ähnlichen Dreiecken folgt

$$A\mathfrak{D} = \frac{DL \cdot AA_1}{A_1D}, \quad A\mathfrak{D}_1 = \frac{A_1R \cdot AD_1}{A_1D_1}, \quad \text{also} \\ \frac{DL \cdot A_1R \cdot AD_1}{A_1D \cdot A_1D_1} = \frac{MA \cdot AA_1}{MA_1}.$$



Da aber  $MA \cdot MA_1 = MD \cdot MD_1$ , so folgt

$$MA : MD = MD_1 : MA_1$$

und hieraus durch eine einfache Umformung

$$AD : A_1 D_1 = MA : MD_1$$

$$AD_1 : A_1 D = MD_1 : MA_1, \text{ also}$$

---


$$AD \cdot AD_1 : A_1 D_1 \cdot A_1 D = MA : MA_1$$

und durch Substitution

$$A_1 R \cdot DL = AA_1 \cdot AD \text{ oder}$$

$$A_1 R : AA_1 = AD : DL.$$

Aus dieser Proportion folgt die Ähnlichkeit der Dreiecke  $AA_1 R$  und  $ADL$ . Mithin steht  $AL$  senkrecht auf  $AR$ . Dies aber ist die fundamentale Eigenschaft von Brennpunkt und Leitlinie, aus welcher sich die übrigen leicht ergeben.

450. Ein Polarsystem ist auch bestimmt durch zwei Involutionsen konjugierter Punkte und den Pol des Trägers der einen.




Fig. 179.

Auf den Geraden  $s$  und  $s'$  seien die Involutionsen konjugierter Punkte  $S_1 S_2, S'_1 S'_2, \dots$  und  $\mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2, \mathfrak{S}'_1 \mathfrak{S}'_2, \dots$ ; es seien  $S_0$  und  $\mathfrak{S}_0$  die dem Schnittpunkte  $S'_0$  involutorisch zugeordneten Punkte, und endlich sei  $T$  der Pol von  $s$ . Man kann zunächst den Pol  $\mathfrak{T}$  von  $s'$  konstruieren. Zu dem Zwecke lege man durch  $T$  eine beliebige Gerade, welche  $s$  und  $s'$  in  $S_1$  und  $\mathfrak{S}_1$  schneidet; sind dann  $S_2$  und  $\mathfrak{S}_2$  die involutorisch



zugeordneten Punkte, so schneidet  $S_2 \mathfrak{S}_2$  die Gerade  $S_0 \mathfrak{S}_0$  im Pole  $\mathfrak{T}$  von  $\mathfrak{s}$ . — In der That ist  $S_2$  der Pol von  $S_1 \mathfrak{S}_1$  und da die Polare von  $\mathfrak{S}_1$  durch  $\mathfrak{S}_2$  gehen muß, so ist  $S_2 \mathfrak{S}_2$  die Polare von  $\mathfrak{S}_1$ ; da aber auch  $S_0 \mathfrak{S}_0$  die Polare von  $S'_0$  ist, so ist  $\mathfrak{T}$  der Pol von  $\mathfrak{s}$ .

Ist ferner  $\mathfrak{T}_1$  der Schnittpunkt von  $S_1 \mathfrak{S}_1$  mit  $S_2 \mathfrak{S}_2$ , so sind die Schnittpunkte des Kernkegelschnittes mit  $S_1 \mathfrak{S}_1$ , falls solche reell vorhanden sind, harmonisch getrennt durch  $S_1 T$  und  $\mathfrak{S}_1 \mathfrak{T}_1$ . — Man findet also beliebig viele Punkte des Kernkegelschnittes  $K$  oder, wenn solche nicht reell vorhanden sind, auf einer Geraden die Involution konjugierter Punkte.

Wenn  $T$  mit  $S_0$  zusammenfällt, so fällt  $S_1$  mit  $S_0$  und daher  $S_2$  mit  $S'_0$  zusammen, also  $\mathfrak{T}$  mit  $\mathfrak{S}_0$ . Daher sind  $S_1$  und die sämtlichen Punkte von  $s$  wie von  $\mathfrak{s}$  Punkte des Kernkegelschnittes; derselbe besteht in diesem Falle aus dem Geradenpaar  $(s\mathfrak{s})$ ; er heiße  $K_0$ .

Durch zwei andere Punkte  $T_m$  und  $T_n$ , die auf  $S_0 \mathfrak{S}_0$  so gewählt sein sollen, daß sie  $TS_0$  harmonisch trennen, sind zwei andere Polarsysteme  $K_m$  und  $K_n$  bestimmt.

Man verbinde einen Punkt  $P$  mit den Punkten  $TS_0 T_m T_n$  durch die Geraden  $tt_0 t_m t_n$ . Es seien  $\mathfrak{T}_m \mathfrak{T}_n$  die Pole von  $\mathfrak{s}$  bezüglich  $K_m K_n$ ; man verbinde auch  $P$  mit  $\mathfrak{T} \mathfrak{S}_0 \mathfrak{T}_m \mathfrak{T}_n$  durch die Geraden  $tt_0 t_m t_n$ . Die genannten Punkt- und Strahlengruppen sind, wie sich leicht ergibt, harmonisch.

Die Geraden  $tt_0 t_m t_n$  schneiden  $s$  in vier harmonischen Punkten, deren involutorisch zugeordnete auch harmonische Punkte und die Pole von  $tt_0 t_m t_n$  sind; diese Pole seien  $SS'_0 S_m S_n$ . In gleicher Weise findet man auf  $\mathfrak{s}$  als Pole von  $tt_0 t_m t_n$  die harmonischen Punkte  $\mathfrak{S} \mathfrak{S}'_0 \mathfrak{S}_m \mathfrak{S}_n$  und daher als Polaren von  $P$  die Geraden  $S \mathfrak{S}$ ,  $S'_0 \mathfrak{S}'_0$ ,  $S_m \mathfrak{S}_m$ ,  $S_n \mathfrak{S}_n$ , die sich in einem Punkte  $Q$  schneiden müssen, da die harmonischen Punktreihen den Punkt  $S'_0$  gemein haben.

Wenn  $T_m$  und  $T_n$ , unter der Bedingung  $T$  und  $S_0$  harmonisch zu trennen, die Geraden  $S_0 \mathfrak{S}_0$  durchlaufen, so erhält man neue Kegelschnitte  $K_m$  und  $K_n$ , in Bezug auf welche die Polaren von  $P$  durch  $Q$  gehen.

Alle diese Kegelschnitte haben vier gemeinschaftliche Punkte, die reellen oder imaginären Doppelpunkte der Invo-



lutionen auf  $s$  und  $\bar{s}$ . Besitzen beide Involutionen reelle Doppelpunkte, so haben alle Kegelschnitte vier reelle Schnittpunkte; sonst haben sie zwei reelle und zwei imaginäre oder vier imaginäre Schnittpunkte. In allen drei Fällen bilden sie ein Kegelschnittbüschel, für dieses gilt der Satz:

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf die Kegelschnitte eines Büschels schneiden sich in einem Punkte.*

Aus ihm leitet man die übrigen Polareigenschaften des Kegelschnittbüschels leicht ab. Cf. 447.

450a. *Ein Polarsystem ist durch fünf Punkte bestimmt.*




Fig. 180.

$ABCDE$  seien fünf beliebige Punkte; man konstruiere das Diagonaldreieck  $PQR$  des vollständigen Vierecks  $ABCD$ . Durch  $P$  ziehe man die Gerade  $PE$  und bestimme auf ihr denjenigen Punkt  $F$ , welcher  $E$  von  $P$  und  $QR$  harmonisch trennt. Wegen der harmonischen Eigenschaften des vollständigen Vierseits müssen sich die Geraden  $CE$  und  $DF$ , sowie  $DE$  und  $CF$  in zwei Punkten  $S$  und  $T$  von  $QR$  schneiden. Auf der letzteren Geraden konstruiere man nun diejenigen Punkte  $M$  und  $N$ , welche sowohl die Strecke  $QR$  als  $ST$  harmonisch trennen. Cf. Fig. 54. Seite 91.

In gleicher Weise ziehe man  $RE$  und bestimme auf dieser Geraden denjenigen Punkt  $F_1$ , welcher  $E$  von  $R$  und  $PQ$  harmonisch trennt; dann müssen sich, wie aus den harmo-



nischen Eigenschaften des vollständigen Vierseits folgt, die Geraden  $BE$  und  $CF_1$  sowie  $BF_1$  und  $CE$  in zwei Punkten  $S_1$  und  $T_1$  von  $PQ$  schneiden. Wie vorhin bestimme man auf dieser Geraden diejenigen Punkte  $M_1$  und  $N_1$ , welche  $PQ$  und  $S_1T_1$  gleichzeitig harmonisch teilen.

Die Geraden  $QR$  und  $PQ$  mögen mit  $m$  und  $m_1$  bezeichnet werden.

Eine beliebige Gerade  $g$  schneide  $m$  in  $H$  und  $m_1$  in  $H_1$ ; man mache  $MNHJ$  und  $M_1N_1H_1J_1$  harmonisch, so daß  $HJ$  sowie  $H_1J_1$  zugeordnete Punkte sind, ziehe  $PJ$  und  $RJ_1$ , so soll der Schnittpunkt  $G$  dieser beiden Geraden der Pol von  $g$  heißen und umgekehrt  $g$  die Polare von  $G$ .

Durch das vorher angegebene Verfahren gelangt man von jeder Geraden  $g$  zu ihrem Pole  $G$ .

Umgekehrt findet man die Polare  $g$  eines Punktes  $G$  auf folgende Art.

Man verbindet  $G$  mit  $P$  und mit  $R$  und schneidet mit diesen Verbindungslinien  $QR$  in  $J$ ,  $QP$  in  $J_1$ , macht dann  $QRJH$  und  $QPJ_1H_1$  harmonisch, so ist die Gerade  $HH_1$  die Polare  $g$  von  $G$ .

Auf dieser wähle man einen festen Punkt  $L$ . Wenn sich  $g$  um  $L$  dreht, so durchläuft  $G$  irgend eine gerade oder krumme Linie  $l$ , welche die Gerade  $PR$  in einem Punkte  $U$  schneiden mag. — Bei der Drehung gelangt  $g$  auch in die Lage  $LQ$ ; es fallen hier die Punkte  $H$  und  $H_1$  mit  $Q$ ,  $J$  mit  $R$  und  $J_1$  mit  $P$  zusammen; der Schnittpunkt  $G$  der Geraden  $PR$  und  $RP$  wird also unbestimmt; man findet ihn aber in dem Punkte  $U$ , dem Schnittpunkte von  $PR$  mit  $l$ .

Sind nun  $g'g''$  zwei Gerade durch  $L$ , welche eine beliebige Gerade  $g$  harmonisch von  $LQ$  trennen, und  $QR$  in  $H'H''$ ,  $QP$  in  $H_1'H_1''$  schneiden, so sind  $HQH'H''$  und  $H_1QH_1'H_1''$  je vier harmonische Punkte. Macht man

$$QRH'J', QRH''J'', QPH_1'J_1', QPH_1''J_1''$$

harmonisch, so daß  $H'J'$ ,  $H''J''$ ,  $H_1'J_1'$ ,  $H_1''J_1''$  zugeordnete Punkte sind, so sind auch

$$JRJ'J'' \text{ und } J_1PJ_1'J_1''$$

je vier harmonische Punkte und die Strahlen  $P(JRJ'J'')$  und



$R(J_1PJ_1'J_1'')$  harmonische Strahlenbüschel. Diese haben den Strahl  $PR$  gemeinsam, also liegen die Schnittpunkte  $L$  von  $PJ$  und  $RJ_1$ ,  $L'$  von  $PJ'$  und  $RJ_1'$ ,  $L''$  von  $PJ''$  und  $RJ_1''$  auf einer Geraden. Diese Gerade geht durch den festen Punkt  $U$  auf  $PR$  und bleibt, wenn man  $g$  festhält, dieselbe, wie man auch  $g'$  und  $g''$  wählen mag, wofern diese Geraden nur  $g$  und  $LQ$  harmonisch trennen, da sie stets durch  $G$ , den Pol von  $g$  geht.

*Demnach liegen die Pole aller Geraden durch einen Punkt  $L$  auf einer Geraden  $l$  und die Polaren aller Punkte einer Geraden  $l$  schneiden sich in einem Punkte  $L$ .*

Es läßt sich nachweisen, daß  $L$  und  $l$  Pol und Polare sind.

Wenn  $g$  sich um  $L$  dreht, so kommt es auch in die Lagen  $LP$  und  $LR$ . Die erste Gerade  $LP$  schneide  $m$  in  $\S$  und  $m_1$  in  $P$ ; man mache  $MN\S\S$  harmonisch. Dann ist der Schnittpunkt von  $P\S$  mit  $QR$  der Pol von  $LP$ ; da derselbe auf  $l$  liegen muß, so ist  $\S$  der Schnittpunkt von  $QR$  mit  $l$ .

In gleicher Weise findet man den Pol  $\S_1$  von  $LR$  als Schnittpunkt von  $QP$  mit  $l$ .

Um aber die Polare von  $L$  zu konstruieren, muß man  $L$  mit  $P$  und  $R$  verbinden, die Schnittpunkte  $\S$  mit  $m$  und  $\S_1$  mit  $m_1$  bestimmen, die Punktreihen  $MN\S\S$  und  $M_1N_1\S_1\S_1$  harmonisch machen, so daß  $\S\S$  und  $\S_1\S_1$  zugeordnete Punkte sind, und endlich  $\S$  mit  $\S_1$  verbinden. Diese Verbindungsgerade ist die Polare von  $L$  und fällt demnach mit  $l$  zusammen. Der vorige Satz nimmt mithin die genauere Fassung an:

*Die Pole aller Geraden durch einen Punkt liegen auf der Polare des Punktes und*

*Die Polaren aller Punkte einer Geraden schneiden sich im Pol der Geraden.*

Von besonderem Interesse ist es, solche Punkte aufzusuchen, die auf ihren Polaren liegen.

Zunächst weiß man, daß die Punkte  $MNM_1N_1$  diese Eigenschaft besitzen. Denn um die Polare von  $M$  zu bestimmen, muß man  $M$  mit  $P$  und  $R$  verbinden, darauf  $m$  und  $m_1$  mit  $MP$  und  $MR$  schneiden, die Schnittpunkte sind  $M$



und  $Q$ , zu diesen bezüglich  $MN$  und  $M_1N_1$  die zugeordneten harmonischen  $M$  und  $P$  suchen und  $M$  mit  $P$  verbinden.

Durch  $M$  lege man beliebig die Gerade  $s$  und wähle auf ihr den Punkt  $X$ , dessen Polare  $x$  die Gerade  $s$  in  $X_1$  schneiden mag. Es muß dann nach dem obigen Satze die Polare  $x_1$  von  $X_1$  durch  $X$  gehen. Ist nun  $M'$  der zu  $M$  bezüglich  $XX_1$  zugeordnete harmonische Punkt,  $m'$  seine Polare, so müssen die vier Polaren  $MP$ ,  $m'$ ,  $x$ ,  $x_1$  der vier harmonischen Punkte  $M$ ,  $M'$ ,  $X$ ,  $X_1$  vier harmonische Strahlen sein, wie sich unmittelbar aus der Konstruktion von Pol und Polare folgern läßt. Da aber  $MP$  durch  $M$ ,  $x$  durch  $X_1$ ,  $x_1$  durch  $X$  geht, so muß  $m'$  durch  $M'$  gehen und es ist  $M'$  ein solcher Punkt von  $s$ , der auf seiner Polare liegt.

Es kann aber auf  $s$  keinen dritten Punkt von dieser Eigenschaft geben. Denn wäre etwa  $M''$  ein solcher und  $m''$  seine Polare; wären  $MM'M''Y$  harmonisch, so müssten auch die Polaren  $MP$ ,  $m'm''y$  harmonisch sein und da  $MP$ ,  $m'$  und  $m''$  durch ihre Pole  $M$ ,  $M'$  und  $M''$  gehen, so müsste auch  $Y$  auf seiner Polare  $y$  liegen.

Somit erfüllen alle Punkte, welche auf ihren Polaren liegen, eine Kurve  $\mathfrak{K}$  II. O. Sind  $OO_1$  zwei ganz beliebige solche Punkte,  $Z$  ein Punkt von  $OO_1$ ,  $z$  seine Polare, welche  $OO_1$  in  $Z_1$  schneidet, so muß die Polare  $z_1$  von  $Z_1$  durch  $Z$  gehen. Sind  $OO'ZZ_1$  harmonisch, so sind auch ihre Polaren  $oo'zz_1$  harmonisch. Da  $o$  durch  $O$ ,  $z$  durch  $Z_1$ ,  $z_1$  durch  $Z$  geht, so muß  $o'$  durch den vierten harmonischen, dem Punkte  $O$  bezüglich  $Z$  und  $Z_1$  zugeordneten Punkt, also durch  $O_1$  gehen und es muß also  $O_1$  mit  $O'$  zusammenfallen. Daraus aber folgt:

*Jede Sehne der Kurve  $\mathfrak{K}$  wird durch einen ihrer Punkte und seine Polare harmonisch geteilt.*

Hieraus aber läßt sich zeigen, daß  $\mathfrak{K}$  ein Kegelschnitt ist.

Fig. 181.

Die Polare eines Punktes  $G$  läßt sich mit Hilfe der eben entwickelten Eigenschaften nun auch in folgender Weise konstruieren. Es mögen die Tangenten  $a$  durch  $A$  und  $b$  durch  $B$  die Gerade  $PQ$  in  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  treffen; man schneide  $AD$  mit  $\mathfrak{A}G$  in  $\mathfrak{A}_1$ ,  $BC$  mit  $\mathfrak{B}G$  in  $\mathfrak{B}_1$ , mache  $AD\mathfrak{A}_1A_1$  und  $BC\mathfrak{B}_1B_1$  harmonisch, so daß  $\mathfrak{A}_1A_1$  und  $\mathfrak{B}_1B_1$  harmonisch sind, so ist  $A_1B_1$  die Polare von  $G$ .



Denn  $A_1$  ist der Pol von  $\mathfrak{A}G$ , weil es erstens auf der Polare  $AD$  von  $\mathfrak{A}$  liegt und weil zweitens  $AD\mathfrak{A}_1A_1$  harmonische Punkte sind. Da auch  $B_1$  der Pol von  $\mathfrak{B}G$  ist, so muß  $A_1B_1$  die Polare von  $G$  sein.




Fig. 181.

Durch die Punkte  $ABCD$  und die Tangente  $a$  in  $A$  ist der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  bestimmt. Läßt man die Tangente  $a$  mit

der Geraden  $AR$  zusammenfallen, so degeneriert  $\mathfrak{K}$  in das Geradenpaar  $(AR, BR)$ . Dreht sich  $a$  um  $A$ , so durchläuft  $\mathfrak{K}$  ein Büschel von Kegelschnitten mit den Grundpunkten  $ABCD$ .

Will man die Polare von  $G$  bezüglich des Geradenpaares  $(AR, BR)$  bestimmen, so fallen zunächst die Punkte  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  mit den Punkten  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{C}$  zusammen, in denen  $PQ$  die Geraden  $AR$  und  $BR$  trifft, also vereinigen sich  $A_1$  und  $B_1$  in  $R$  und die Polare von  $G$  geht durch  $R$  und muß  $G$  von  $AR$  und  $BR$  wegen des letzten Satzes harmonisch trennen. Es seien  $g$  und  $g$  die Polaren von  $G$  bezüglich  $\mathfrak{K}$  und  $(AR, BR)$ .

Sind  $a'$  und  $a''$  zwei solche Gerade durch  $A$ , welche  $a$  und  $AR$  harmonisch trennen, so bestimmen sie als Tangenten zwei Kegelschnitte  $\mathfrak{K}'$  und  $\mathfrak{K}''$  des Büschels und es sind

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D}\mathfrak{A}'\mathfrak{A}'', \quad \mathfrak{A}_1\mathfrak{D}\mathfrak{A}'_1\mathfrak{A}''_1, \quad A_1RA'_1A''_1 \text{ sowie} \\ \mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{B}'\mathfrak{B}'', \quad \mathfrak{B}_1\mathfrak{C}\mathfrak{B}'_1\mathfrak{B}''_1, \quad B_1RB'_1B''_1$$

je vier harmonische Punkte. Die Verbindungslinien

$$A_1B_1, \quad A'_1B'_1, \quad A''_1B''_1$$

sind die Polaren von  $G$  in Bezug auf die Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ ,  $\mathfrak{K}'$ ,  $\mathfrak{K}''$  und müssen sich, da die harmonischen Punktreihen den Punkt  $R$  gemeinschaftlich haben, in einem Punkte  $\mathfrak{G}$  schneiden. Durch diesen Punkt muß auch die Polare von  $G$  in Bezug auf das Geradenpaar  $(AR, BR)$  gehen.

Letzteres ergibt sich aus folgender Überlegung.

Wenn auf jeder der Geraden  $m$  und  $m_1$  vier harmonische



Punkte liegen, so sind die vier Verbindungslinien derselben Tangenten eines Kegelschnittes, der auch  $m$  und  $m_1$  berührt. Degeneriert dieser Kegelschnitt in ein Punktpaar  $Q\mathfrak{G}$  und gehen drei von den vier Tangenten durch  $\mathfrak{G}$ , so muß auch die vierte hindurchgehen. Im vorliegenden Falle liefse sich überdies noch nachweisen, daß die Polare von  $G$  in Bezug auf das Geradenpaar  $(AR, BR)$  die einzige Tangente von  $G$  durch  $\mathfrak{G}$  sein muß, daß also die Polare für keinen anderen Kegelschnitt durch  $\mathfrak{G}$  gehen kann.

Man kann jedoch auch auf folgendem Wege zum Beweise gelangen.

Man wähle die drei Geradenpaare

$$(AB, CD), (AC, BD), (AD, BC)$$

als Kegelschnitte aus dem Büschel, mache  $AB, AC, AD, a$  harmonisch, so daß  $AD$  und  $a$  zugeordnet sind; es soll  $K$  der Kegelschnitt des Büschels sein, welcher  $a$  berührt. Dann findet man wie vorhin, daß die Polaren von  $G$  in Bezug auf

$$(AB, CD), (AC, BD), K$$

sich in einem Punkte  $\mathfrak{G}$  schneiden.

Bei der Konstruktion hatten die Punkte  $P$  und  $Q$  eine von  $R$  verschiedene Rolle; man kann jedoch zwei derselben mit einander vertauschen und wenn man dann von neuem die Konstruktion durchführt, so findet man, daß die Polaren von  $G$  in Bezug auf

$$(AB, CD), (AD, BC), K$$

oder

$$(AC, BD), (AD, BC), K$$

sich in einem Punkte  $\mathfrak{G}$  treffen. Daraus folgt zunächst der schon früher bewiesene Satz:

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf die drei Geradenpaare eines Büschels schneiden sich in einem Punkte.*

Ist nun  $a'$  eine feste Gerade durch  $A$ , so bestimmt sie einen Kegelschnitt  $K'$  des Büschels. Man mache

$$AB, a', AC, a'' \text{ und } AB, a', AD, a'''$$

harmonisch, so daß  $AC$  und  $a''$ , sowie  $AD$  und  $a'''$  zugeordnet sind. Durch  $a''$  und  $a'''$  als Tangenten sind zwei Kegelschnitte  $K''$  und  $K'''$  bestimmt. Wiederholt man jetzt die



frühere Konstruktion, so ergibt sich, daß sich die Polaren von  $G$  bezüglich

$$K', (AC, BD), K'' \text{ und auch } K', (AD, BC), K'''$$

in einem Punkte schneiden. Durch diesen aber muß nach dem letzten Satze auch die Polare in Bezug auf  $(AB, CD)$  gehen, so daß also ohne Einschränkung bewiesen ist:

*Die Polaren eines Punktes in Bezug auf die Kegelschnitte eines Büschels schneiden sich in einem Punkte.*

Von diesem Satze ausgehend gelangt man, wie schon früher gezeigt, zu den hauptsächlichsten Eigenschaften des Kegelschnittbüschels. Um diese unmittelbar aus der Konstruktion von Pol und Polare abzuleiten, muß man zunächst einen Hilfssatz beweisen.

„Sind  $O_1 O_2 O_3 O_4$  die Mittelpunkte von vier Kreisen eines Büschels mit den Grundpunkten  $A$  und  $B$ , sind die Tangenten  $a_1 a_2 a_3 a_4$  in  $A$  vier harmonische Strahlen, so sind auch die Polaren eines beliebigen Punktes  $P$  in Bezug auf die vier Kreise vier harmonische Strahlen.“

Die Radien  $AO_1, AO_2, AO_3, AO_4$ , stehen auf vier harmonischen Strahlen senkrecht und sind daher selbst harmonisch; also sind  $O_1 O_2 O_3 O_4$ , sowie die Strahlen  $P(O_1 O_2 O_3 O_4)$  harmonisch und da die Polaren von  $P$  auf letzteren senkrecht stehen, so sind es auch diese.

Aus diesem Satze aber folgert man weiter:

Sind  $A_1 A_2 A_3 A_4$  vier harmonische Punkte, ist  $A$  irgend ein fester Punkt derselben Geraden, sind

$$M_1 N_1, M_2 N_2, M_3 N_3, M_4 N_4$$

vier Punktpaare einer Involution, welche bezüglich

$$AA_1, AA_2, AA_3, AA_4$$

harmonisch trennen, so sind auch die vier Punkte  $B_1 B_2 B_3 B_4$ , welche einen festen Punkt  $B$  derselben Geraden von jenen involutorischen Punktpaaren harmonisch trennen, harmonische Punkte.

In Bezug auf einen Kegelschnitt  $K$  des Büschels wurde der Pol von  $g$  gefunden, indem man  $m$  und  $m_1$  (Fig. 180.) mit  $g$  in  $H$  und  $H_1$  schnitt,  $MNJH$  und  $M_1 N_1 J_1 H_1$  harmonisch machte und  $PJ$  mit  $RJ_1$  in  $G$  zum Durchschnitt brachte.



Man denke sich nun in  $A$  vier harmonische Gerade  $aa'a''a'''$ , so sind durch sie als Tangenten vier Kegelschnitte  $KK'K''K'''$  bestimmt. Wegen des oben bewiesenen Hilfsatzes sind dann auch  $JJ'J''J'''$  und  $J_1J_1'J_1''J_1'''$  harmonisch und daher auch  $P(JJ'J''J''')$  und  $R(J_1J_1'J_1''J_1''')$ , folglich liegen die vier Pole  $GG'G''G'''$  mit den Punkten  $P$  und  $R$  auf einem Kegelschnitte. (188.)

Dieselbe Rolle, wie den Punkten  $P$  und  $R$  bei der Konstruktion des Poles von  $g$  kann man den Punkten  $P$  und  $Q$  zugestehen und daraus schließt man sofort, daß auch  $Q$  auf dem Kegelschnitte liegt.

Hält man  $a$  und  $a'$  fest, wählt aber zwei andere Gerade  $a_1''a_1'''$ , welche jene harmonisch trennen, so bestimmen sie zwei andere Kegelschnitte des Büschels, in Bezug auf welche die Pole  $G_1''G_1'''$  sein mögen. Diese müssen dann mit  $GG'PQR$  auf einem Kegelschnitte liegen, der mit dem ersten zusammenfällt und somit folgt:

*Die Pole einer Geraden in Bezug auf die Kegelschnitte eines Büschels liegen auf einem Kegelschnitte.*

Dieser schneidet  $g$  im Allgemeinen in zwei Punkten, diese sind daher Pole von  $g$  in Bezug auf solche Kegelschnitte, welche  $g$  berühren; daher:

*In einem Kegelschnittbüschel giebt es im Allgemeinen zwei Kegelschnitte, welche eine Gerade berühren.*

Aus den entwickelten Polareigenschaften ergibt sich wie schon früher gezeigt, (414.) die Haupteigenschaft des Büschels jede Gerade in einer Involution zu schneiden. Die letztere löst folgende Aufgaben:

I. *Von zwei Kegelschnitten kennt man drei Schnittpunkte und noch je zwei Punkte; man soll den vierten Schnittpunkt bestimmen.*

Es seien  $ABC$  die drei bekannten Schnittpunkte der Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ ; vom ersten kenne man noch die Punkte  $E$  und  $F$ , vom zweiten  $E_1$  und  $F_1$ ; man soll den vierten Schnittpunkt bestimmen.

Auf einer beliebigen Geraden  $g$  z. B.  $EE_1$  bestimme man die Schnittpunkte  $\mathfrak{E}$  und  $\mathfrak{E}_1$  mit  $K$  und  $K_1$ ; dann sind  $E\mathfrak{E}$



und  $E_1\mathfrak{C}_1$  zwei Punktpaare der Involution, in welcher  $g$  von den Kegelschnitten des Büschels geschnitten wird. Zu diesen Kegelschnitten gehören die Geradenpaare

$$(AB, CD) \text{ und } (AC, BD).$$

Wenn  $AB$  und  $AC$  die Gerade  $g$  in  $C_1$  und  $B_1$  schneiden und  $\mathfrak{C}_1$  und  $\mathfrak{B}_1$  die den Schnittpunkten involutorisch zugeordneten Punkte sind, so treffen sich die Geraden

$$C\mathfrak{C}_1 \text{ und } B\mathfrak{B}_1 \text{ in } D.$$

II. *Von zwei Kegelschnitten kennt man zwei Schnittpunkte und noch je drei Punkte; man soll die beiden anderen Schnittpunkte konstruieren.*

Die gegebenen Schnittpunkte seien  $A$  und  $B$ , die gesuchten  $C$  und  $D$ ; die außerdem bekannten Punkte der Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  seien  $EEG$  und  $E_1F_1G_1$ .

Man bestimme auf  $EE_1$  und  $FF_1$  die Schnittpunkte  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{C}_1$  sowie  $\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{F}_1$ ; die Punktpaare  $E\mathfrak{C}$  und  $E_1\mathfrak{C}_1$ , sowie  $F\mathfrak{F}$  und  $F_1\mathfrak{F}_1$  gehören den Involutionen an, in denen die Geraden  $EE_1$  und  $FF_1$  durch die Kegelschnitte des Büschels  $(KK_1)$  getroffen werden.

Die Gerade  $AB$  schneide  $EE_1$  in  $C_1$  und  $FF_1$  in  $C'_1$ ; sind  $\mathfrak{C}_1$  und  $\mathfrak{C}'_1$  die diesen Punkten involutorisch zugeordneten Punkte, so ist  $\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}'_1$  eine gemeinschaftliche Sekante beider Kegelschnitte. Sie trifft die Kegelschnitte in den gesuchten gemeinschaftlichen Punkten.



## Vierter Abschnitt.

### § 29.

#### Die projektivischen Gebilde.

451. Alle Punkte einer Geraden bilden eine *Punktreihe*, alle Strahlen eines Punktes ein *Strahlenbüschel*. Punktreihe und Strahlenbüschel sind die *Grundgebilde*. Die Punkte und Strahlen heißen die *Elemente des Gebildes*.

452. Wenn ein Punkt eine Punktreihe durchläuft und man denkt ihn in jeder seiner Lagen mit zwei festen Punkten  $S$  und  $S_1$  verbunden, so entstehen in  $S$  und  $S_1$  zwei Strahlenbüschel, die in einer bestimmten Beziehung sich befinden. Ordnet man je zwei Strahlen der beiden Büschel, die in einem Punkte der Punktreihe sich treffen, als *entsprechende* oder *homologe* einander zu, so läßt sich die Beziehung dahin charakterisieren, daß der gemeinsame Strahl sich selbst entspricht und daß irgend vier harmonischen Strahlen des einen Büschels vier harmonische des anderen entsprechen. Verschiebt man die beiden Büschel in der Ebene, so ändert sich zwar die durch das harmonische Entsprechen ausgedrückte Beziehung nicht, aber der gemeinsame Strahl entspricht sich im Allgemeinen nicht mehr selbst.

Wenn ein Strahl ein Strahlenbüschel durchläuft und man denkt ihn in jeder seiner Lagen von zwei festen Geraden  $s$  und  $s_1$  geschnitten, so entstehen auf  $s$  und  $s_1$  zwei Punktreihen, die in einer bestimmten Beziehung sich befinden. Ordnet man je zwei Punkte der beiden Punktreihen, welche auf einem Strahle des Büschels liegen, als *entsprechende* oder *homologe* einander zu, so läßt sich die Beziehung dahin charakterisieren, daß der gemeinsame Punkt sich selbst entspricht und daß irgend vier harmonischen Punkten der einen Reihe vier harmonische der anderen entsprechen. Verschiebt man die beiden



Punktreihen in der Ebene, so ändert sich zwar die durch das harmonische Entsprechen ausgedrückte Beziehung nicht, aber der gemeinsame Punkt entspricht sich im Allgemeinen nicht mehr selbst.

453. Zwischen gleichartigen Gebilden läßt sich demnach eine solche Beziehung herstellen, daß jedem Elemente des einen ein bestimmtes des anderen und diesem wieder jenes erste entspricht und daß ferner irgend vier harmonischen Elementen des einen vier harmonische des anderen entsprechen. Solche Gebilde heißen *projektivisch*.

454. Aus dieser Definition folgt: *Sind zwei Gebilde zu einem dritten projektivisch, so sind sie selbst projektivisch.*

Man bezeichnet die Punktreihe  $ABC \dots$  auf  $s$  mit  $s(ABC \dots)$ , das Strahlenbüschel  $abc \dots$  in  $S$  mit  $S(abc \dots)$ . Das Zeichen der Projektivität ist  $\bar{\wedge}$ .

455. Fundamentalsatz: *a. Haben zwei projektivische Strahlenbüschel denselben Scheitel und fallen drei Paar entsprechende Strahlen zusammen, so sind sie identisch.*

Es seien  $S(abcd \dots)$  und  $S(a_1b_1c_1d_1 \dots)$  die projektivischen Büschel und es fallen  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  zusammen. Sind  $abcp$  und  $a_1b_1c_1p_1$  harmonisch, so sind  $p$  und  $p_1$  entsprechende Strahlen, welche zusammenfallen müssen. Zum Strahle  $p$  ziehe man eine Parallele  $s$ , welche die projektivischen Büschel in den projektivischen Punktreihen  $ABCP \dots$  und  $A_1B_1C_1P_1 \dots$  schneidet. In diesen Punktreihen fallen die entsprechenden Punkte  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ ,  $PP_1$  zusammen. Da  $s \parallel p$  ist, so liegt  $P$  im Unendlichen und  $C$  in der Mitte von  $AB$  (4b. 5a.). Sind  $ACPA'$  und  $BCPB'$  harmonisch, so entsprechen auch  $A'$  und  $B'$  sich selbst. Sie sind die Mitten von  $AC$  und  $BC$ . Halbiert man die Hälften von  $AC$  und  $BC$  und weiter die dann erhaltenen Teile u. s. f. in inf., so müssen alle Teilpunkte sich selbst entsprechen und die ganze Strecke  $AB$  kontinuierlich erfüllen, da nach unendlich oft wiederholter Teilung die zu halbierende Strecke unendlich klein wird, also mit ihrer Mitte zusammenfällt. Da aber jeder Punkt außerhalb  $AB$  von einem auf  $AB$  liegenden durch  $A$  und  $B$  harmonisch getrennt wird, so müssen auch alle außerhalb  $AB$  liegenden Punkte sich



selbst entsprechen. Daraus aber folgt, daß auch alle Strahlen der beiden Büschel in  $S$  sich selbst entsprechen.

b. *Liegen zwei projektivische Punktreihen auf derselben Geraden und fallen drei Paar entsprechende Punkte zusammen, so sind die Punktreihen identisch.*

Man verbindet dieselben mit einem Punkte  $S$  und erhält zwei projektivische Strahlenbüschel, in denen drei Paar entsprechende Strahlen zusammenfallen. Daher sind diese Büschel und folglich auch die Punktreihen identisch.

456. a. *Entspricht der gemeinschaftliche Strahl zweier projektivischen Strahlenbüschel  $S$  und  $S_1$  sich selbst, so liegen die Schnittpunkte aller entsprechenden Strahlen auf einer Geraden. Die projektivischen Büschel sind in perspektivischer Lage.*

Die entsprechenden Strahlen  $aa_1$  und  $bb_1$  schneiden sich in  $A$  und  $B$ ; die Gerade  $AB$  oder  $s$  wird von den projektivischen Büscheln in projektivischen Punktreihen geschnitten. Diese haben drei Punkte entsprechend gemein, nämlich  $A$ ,  $B$  und den Schnittpunkt mit  $SS_1$ , also sind sie (455b.) identisch und je zwei entsprechende Strahlen der Büschel  $S$  und  $S_1$  schneiden sich auf  $s$ .

b. *Entspricht der gemeinsame Punkt zweier projektivischen Punktreihen  $s$  und  $s_1$  sich selbst, so schneiden sich die Verbindungslinien entsprechender Punkte in einem Punkte. Die projektivischen Punktreihen sind in perspektivischer Lage.*

Die Geraden  $a$  und  $b$ , welche die entsprechenden Punkte  $AA_1$  und  $BB_1$  verbinden, schneiden sich in  $S$ . Diesen Punkt denke man sich mit den projektivischen Punktreihen  $s$  und  $s_1$  verbunden; dadurch entstehen in  $S$  zwei projektivische Strahlenbüschel, welche drei entsprechend gemeinsame Strahlen besitzen, nämlich  $a$ ,  $b$  und die Verbindungsgerade von  $S$  mit dem Schnittpunkte von  $s$  und  $s_1$ . Daher sind die Büschel identisch und jeder Strahl geht durch entsprechende Punkte auf  $s$  und  $s_1$ .

457. *Von zwei projektivischen Gebilden kennt man drei Paar homologe Elemente; man soll zu einem Elemente des ersten Gebildes das homologe des anderen konstruieren.*

I. Fall. Die Gebilde haben verschiedene Träger.



a. In den Strahlenbüscheln  $S$  und  $S_1$  seien  $aa_1, bb_1, cc_1$  entsprechende Strahlen. Durch




Fig. 182.

den Schnittpunkt  $A$  von  $a$  und  $a_1$  lege man die Geraden  $s$  und  $s_1$ ; schneide  $s$  durch  $b$  und  $c$  in  $B$  und  $C$ ,  $s_1$  durch  $b_1$  und  $c_1$  in  $B_1$  und  $C_1$ , ziehe  $BC$  und  $B_1C_1$  bis zum Durchschnitte in  $P$ . Mit dem Strahle  $d$  von  $S$  schneide man  $s$  in  $D$ ; schneide  $s_1$  mit  $PD$  in  $D_1$ , so ist  $S_1D_1$  der dem Strahle  $d$  homologe

Strahl  $d_1$ . (456 b. 453).

b. In den Punktreihen  $s$  und  $s_1$  seien  $AA_1, BB_1, CC_1$  entsprechende Punkte. Auf der Verbindungsgeraden  $a$  von




Fig. 183.

$A$  und  $A_1$  nehme man die Punkte  $S$  und  $S_1$ , verbinde  $S$  mit  $B$  und  $C$  durch die Strahlen  $b$  und  $c$ ,  $S_1$  mit  $B_1$  und  $C_1$  durch  $b_1$  und  $c_1$ , und verbinde den Schnittpunkt von  $b$  und  $b_1$  mit demjenigen von  $c$  und  $c_1$  durch die Gerade  $p$ . Den Punkt  $D$  verbinde man mit  $S$

durch  $d$ , verbinde  $S_1$  mit dem Schnittpunkte  $pq$  durch  $d_1$  und schneide mit  $d_1$  die Gerade  $s_1$  in dem zu  $D$  homologen Punkte  $D_1$ . (456 a. 453.).




Fig. 184.

II. Fall. Die Gebilde haben denselben Träger.

a. In  $S$  seien zwei projektivische Strahlenbüschel;  $aa_1, bb_1, cc_1$  seien entsprechende Strahlen. Durch  $S$  lege man einen Kreis  $K$ , und schneide ihn mit  $abc$  in  $ABC$ , mit  $a_1b_1c_1$  in  $A_1B_1C_1$ , bestimme die Durchschnitte  $\beta, \gamma$  von  $AB_1$  und  $A_1B$ ,  $AC_1$  und



$A_1C$ , ziehe  $\beta\gamma$ . Ein veränderlicher Strahl  $d$  von  $S$  schneide  $K$  in  $D$ ;  $A_1D$  treffe  $\beta\gamma$  in  $\delta$ ,  $A\delta$  treffe  $K$  in  $D_1$ , dann ist  $SD_1$  der zu  $d$  homologe Strahl  $d_1$ .

Ist  $\alpha$  der Schnittpunkt von  $AA_1$  mit  $\beta\gamma$ , so ist  $A(\alpha\beta\gamma\delta\dots) \bar{\wedge} A_1(\alpha\beta\gamma\delta\dots)$  oder  $A(A_1B_1C_1D_1) \bar{\wedge} A_1(ABCD\dots)$ , also wegen Gleichheit der Peripheriewinkel auch  $S(ABCD\dots) \bar{\wedge} S(A_1B_1C_1D_1\dots)$ .

a'. Die Gerade  $\beta\gamma$  hat mit  $K$  zwei reelle oder imaginäre Schnittpunkte  $M$  und  $N$ . Die Strahlen  $SM$  und  $SN$  sind sich selbst entsprechende. Sie heißen die *Doppelstrahlen*.

Wenn man statt  $AA_1$  irgend zwei entsprechende Punkte  $XX_1$  wählt, so erhält man doch stets als perspektivischen Durchschnitt die Gerade  $\beta\gamma$  (455.). Die Doppelstrahlen können auch zusammenfallen, wenn  $\beta\gamma$  den Kreis berührt.

b. Auf  $s$  seien  $AA_1, BB_1, CC_1$  drei Paar homologe Punkte zweier projektivischen Punktreihen. Um zu einem Punkte  $D$  den homologen  $D_1$  zu finden, verbinde man  $ABCA_1B_1C_1$  mit einem Punkte  $S$ , konstruiere nach a. zu dem Strahle  $SD$  den homologen, so schneidet er  $s$  in  $D_1$ .

b'. In gleicher Weise findet man die reellen oder imaginären *Doppelpunkte* der beiden projektivischen Punktreihen, d. h. diejenigen beiden Punkte, in denen homologe Punkte sich vereinigen. Auch diese können in einen Punkt zusammenfallen.

458. Die Paare  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  von konjugierten Punkten auf einer Geraden  $g$  bezüglich eines Kreises bilden (36a.) eine Involution. Da aber die konjugierten Punkte zu vier harmonischen Punkten auch harmonische Punkte sind (20), so ist (453) die Reihe der Punkte  $ABC\dots$  projektivisch mit derjenigen der konjugierten Punkte  $A_1B_1C_1\dots$ . Jeden Punkt von  $g$  kann man sowohl der einen als der anderen Reihe zuweisen; ihm entspricht stets derselbe Punkt. Daraus folgt:

a. *Eine Punktinvolution besteht aus zwei projektivischen Punktreihen in solcher Lage, daß jedem Punkte ein anderer doppelt entspricht.*

b. *Eine Strahleninvolution besteht aus zwei projektivischen Strahlenbüscheln in solcher Lage, daß jedem Strahle ein anderer doppelt entspricht.* (454. 458).



Diese Lage projektivischer Gebilde heit daher die *involutorische Lage*.

c. *Jede Strahleninvolution wird von irgend einer Geraden in einer Punktinvolution geschnitten.* (454).

459. *Zwei projektivische Gebilde auf demselben Trger befinden sich in involutorischer Lage, wenn irgend einem Elemente ein anderes doppelt entspricht.*

a. Die konzentrischen Buschel  $S(aa_1bc\dots)$  und  $S(a_1ab_1c\dots)$  seien projektivisch; dem Strahle  $a$  entspreche  $a_1$  doppelt. Man lege durch  $S$  einen Kreis  $K$ , welcher von den Strahlen  $aa_1bc\dots b_1c_1\dots$  in  $AA_1BC\dots B_1C_1\dots$  geschnitten wird. Aus Gleichheit der Peripheriewinkel und aus 454. folgt, da  $B_1(AA_1BC\dots) \bar{\wedge} B(A_1AB_1C_1\dots)$  ist. Da der gemeinsame Strahl  $BB_1$  sich selbst entspricht, so sind die Buschel in perspektivischer Lage (456.). Der perspektivische Durchschnitt sei  $p$ . Der perspektivische Durchschnitt der Buschel  $C_1(AA_1BC\dots)$  und  $C(A_1AB_1C_1\dots)$  mu aus den in 457. angegebenen Grunden auch  $p$  sein. Nennt man die Schnittpunkte von  $AB$  und  $A_1B_1$ ,  $AB_1$  und  $A_1B$ ,  $AC$  und  $A_1C_1$ ,  $AC_1$  und  $A_1C$ , ...  $\beta$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma$ ,  $\gamma_1$ , ... so folgt aus den Eigenschaften des vollstndigen Vierseits, da  $\beta\beta_1$ ,  $\gamma\gamma_1$ , ... Paare konjugierter Punkte in Bezug auf den Kreis  $K$  sind (15.). Daher entspricht in den projektivischen Punktreihen  $(\beta\gamma\dots)$  und  $(\beta_1\gamma_1\dots)$  und also auch in den projektivischen Strahlenbuscheln  $A(\beta\gamma\dots)$  und  $A(\beta_1\gamma_1\dots)$  und endlich in den projektivischen Buscheln  $S(BC\dots)$  und  $S(B_1C_1\dots)$  jedem Elemente ein anderes doppelt; also sind diese Buschel in involutorischer Lage.

b. Aus dem vorigen Beweise folgt noch, da die Geraden  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ , ... sich im Pole  $P$  von  $p$  schneiden mssen, wodurch ein neuer Beweis von 40a. gegeben ist.

c. Sind die projektivischen Gebilde Punktreihen, so projiziere man sie aus einem Punkte  $S$  und wende den Beweis in a. an.

460. *Der Kegelschnitt als Erzeugnis projektivischer Strahlenbuschel.*

Es seien  $S(abcd\dots)$  und  $S_1(a_1b_1c_1d_1\dots)$  zwei projektivische Strahlenbuschel; der Ort des Schnittpunktes entsprechen-



der Strahlen ist eine kontinuierliche krumme Linie, Kurve, welche mit einer Geraden  $g$  höchstens zwei Punkte gemeinsam




Fig. 185.

hat. Denn diese Gerade wird von den projektivischen Strahlenbüscheln in zwei projektivischen Punktreihen geschnitten; die Doppelpunkte beider sind die Schnittpunkte von  $g$  mit der Kurve. Diese nennt man daher von der *II. Ordnung*. Da dem gemeinsamen Strahle  $SS_1$  sowohl im Büschel ( $S$ ) als im Büschel ( $S_1$ ) ein Strahl ent-

spricht, so sind  $S$  und  $S_1$  Punkte der Kurve.

Jeder Strahl durch  $S$  oder  $S_1$  hat außer  $S$  oder  $S_1$  noch einen zweiten Punkt mit der Kurve gemein, den Schnittpunkt mit dem entsprechenden Strahle. Bei denjenigen Strahlen, welche dem gemeinsamen Strahle  $SS_1$  entsprechen, fällt dieser zweite Schnittpunkt mit  $S$  oder  $S_1$  zusammen. Diese Strahlen haben also mit der Kurve nur je den Punkt  $S$  oder  $S_1$  gemein; sie heißen *Tangenten der Kurve II. O.*

Die Schnittpunkte von  $aa_1, bb_1, cc_1, dd_1, \dots$  seien  $A, B, C, D, \dots$ . Man ziehe  $AB$  und  $AC$  und schneide diese Geraden mit den Strahlen der Büschel in  $AB\mathfrak{C}\mathfrak{D} \dots$  und  $A\mathfrak{B}_1C\mathfrak{D}_1 \dots$ , so sind diese Punktreihen projektivisch und in perspektivischer Lage, also schneiden sich die Verbindungslinien homologer Punkte,  $B\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}C, \mathfrak{D}\mathfrak{D}_1, \dots$  in einem Punkte  $P$ .

Man denke sich nun in der Figur die fünf Punkte  $SS_1BCD$  fest, aber  $A$  beweglich auf der Kurve II. O. Es drehen sich dabei die Geraden  $BA$  und  $CA$  um die Punkte  $B$  und  $C$ , die Punkte  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{B}_1\mathfrak{D}_1$  verändern auf ihnen ihre Lage, aber die Gerade  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  geht stets durch  $P$ , weil dieser Punkt als Schnittpunkt der festen Geraden  $S_1B$  und  $SC$  unverändert bleibt. Da sich also  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  um den festen Punkt  $P$  dreht, so beschreiben  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{D}_1$  auf den festen Strahlen  $SD$  und  $S_1D$  perspektivische Punktreihen, also sind die von  $BA$  und  $CA$  beschriebenen Strahlenbüschel projektivisch. Sie erzeugen also



auch die Kurve und da  $B$  und  $C$  zwei ganz beliebige Punkte derselben sind, so kann man den Satz aufstellen:

*Zwei projektivische Strahlenbüschel erzeugen eine Kurve II. O., welche von keiner Geraden in mehr als zwei Punkten geschnitten wird. Sie wird aus irgend zwei ihrer Punkte durch projektivische Strahlenbüschel projiziert.*

Daraus folgt, daß es in jedem Punkte der Kurve II. O. eine Tangente giebt.

461. Faßt man die Punkte  $ABS_1DSC$  als Ecken eines Sechsecks auf, so findet man, daß die Schnittpunkte der Gegenseiten,  $\mathfrak{D}$  von  $AB$  und  $DS$ ,  $P$  von  $BS_1$  und  $CS$ ,  $\mathfrak{D}_1$  von  $DS_1$  und  $AC$  in einer Geraden liegen. Dies aber ist der Pascal'sche Lehrsatz:

*In jedem einer Kurve II. O. eingeschriebenen Sechsecke liegen die Schnittpunkte der Gegenseiten in einer Geraden.*

462. Läßt man  $S_1$  mit  $B$  und  $S$  mit  $C$  zusammenfallen, so erhält man ein der Kurve eingeschriebenes Viereck  $ABDC$ ,




Fig. 186.

in welchem sich die Gegenseiten  $AB$  und  $CD$  in  $\mathfrak{D}$ ,  $AC$  und  $BD$  in  $\mathfrak{D}_1$  und die Tangenten in den Gegenecken  $B$  und  $C$  in einem Punkte  $P$  schneiden, der mit  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{D}_1$  in einer Geraden liegt. Somit folgt als spezieller Fall des Pascal'schen Satzes:



*In jedem einer Kurve II. O. eingeschriebenen Vierecke liegen die Schnittpunkte der Gegenseiten und der Tangenten in den Gegenecken auf einer Geraden.*

463. Mit Hilfe dieses Satzes ergeben sich ungemein einfach die Polareigenschaften.

Zieht man von einem Punkte  $A$  durch eine Kurve II. O.  $K$  eine feste Sehne  $BC$  und eine veränderliche  $DE$ , so nehme man  $BDCE$  als eingeschriebenes Viereck. Dann schneiden




Fig. 187.

sich die Gegenseiten  $BD$  und  $CE$ ,  $BE$  und  $CD$  und die Tangenten in den Gegenecken  $B$  und  $C$  in drei Punkten  $F$ ,  $G$  und  $H$  einer Geraden. Diese trifft  $BC$  und  $DE$  in zwei Punkten  $J$  und  $L$ , welche von  $A$  durch die Punkte  $BC$  resp.  $DE$  harmonisch getrennt sind. Da also  $J$  auf der festen Sehne  $BC$  ein fester Punkt ist, ebenso wie  $H$ , so ist die Gerade  $HJ$  unveränderlich bei der Drehung von  $DE$  um  $A$ . Man nennt  $A$  und  $HJ$  *Pol und Polare*

und hat sofort die Haupteigenschaft:

*Alle Punkte, welche einen Punkt  $A$  von einer Kurve II. O. harmonisch trennen, liegen auf einer Geraden  $a$ , der Polare von  $A$ .*

Auf dieser Geraden liegen, wie unmittelbar folgt, die Schnittpunkte der Tangenten, welche in den Endpunkten der durch  $A$  gezogenen Sehnen gelegt werden können.

464. Wenn die Polare  $a$  eines Punktes  $A$  die Kurve II. O. schneidet, in  $M$  und  $N$ , so müssen nach vorigem Satze  $AM$  und  $AN$  Tangenten an dieselbe sein.

Man hat demnach unter solchen Punkten zu unterscheiden, von denen sich Tangenten ziehen oder nicht ziehen lassen. Die ersten liegen im äußeren Gebiete, die anderen im inneren; beide Gebiete sind durch die Kurve getrennt.

Liegt ein Punkt  $L$  auf der Polare  $a$  von  $A$  im inneren Gebiete, so ist  $L$  von  $A$  durch die Kurve harmonisch getrennt, also geht die Polare von  $L$  durch  $A$ . Liegt aber ein Punkt



$H$  auf  $a$  im äußeren Gebiete, so ziehe man die Tangenten  $HB$  und  $HC$  durch Konstruktion der Polare  $h$  von  $H$ . Diese muß wegen 463. durch  $A$  gehen, also so hat man den Satz:

*Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden und umgekehrt.*

465. Zwei Punkte heißen *konjugiert*, wenn jeder auf der Polare des anderen liegt; zwei Strahlen heißen *konjugiert*, wenn jeder durch den Pol des anderen geht. Fig. 187.

Es seien  $A$  und  $a$  Pol und Polare; ein Punkt  $F$  durchlaufe  $a$ , dann dreht sich seine Polare  $f$  um  $F$ . Um  $f$  zu konstruieren, ziehe man durch  $F$  die Sehne  $BD$ , dann  $ABC$  und  $ADE$ ,  $BE$  und  $CD$  und endlich  $AG$  oder  $f$ . Wenn sich  $F$  auf  $a$  bewegt, so halte man den Punkt  $B$  und also auch  $C$  fest. Aus ihnen wird der veränderliche Punkt  $D$  durch zwei projektivische Strahlenbüschel projiziert, deren homologe Strahlen sich in  $G$  schneiden. Die Punktreihen  $F \dots$  und  $G \dots$  stehen demnach in projektivischer Beziehung. Da die Polare  $f$  von  $F$  durch  $G$  geht, so muß diejenige von  $G$  durch  $F$  gehen und jedem Punkte der Geraden  $a$ , ob man ihn zur Reihe  $F \dots$  oder  $G \dots$  rechnet, entspricht derselbe Punkt. Die Reihen sind also involutorisch. Die Punkte  $F$  und  $G$  sind aber konjugiert, denn jeder liegt auf der Polare des anderen, also folgt:

*Die Paare konjugierter Punkte einer Geraden bilden eine Involution*  
und ebenso:

*Die Paare konjugierter Strahlen eines Punktes bilden eine Involution.*

Liegt von zwei konjugierten Strahlen der eine im äußeren Gebiete, so liegt sein Pol im inneren und der andere Strahl muß daher die Kurve schneiden, also:

*Von zwei konjugierten Strahlen schneidet mindestens einer die Kurve II. O.*

466. Der Pol der unendlich fernen Geraden  $g_\infty$  sei  $M$ ; er halbiert jede durch ihn gehende Sehne (4b. 463) und heißt deshalb der *Mittelpunkt* der Kurve; die Sehnen durch ihn heißen *Durchmesser*. Diese Durchmesser ordnen sich paarweise zu







Zieht man  $JB$ , so sind  $E_1E_2LP$  harmonisch, demnach ist  $JP$  die Polare von  $L$  für den Kreis  $M$  und steht auf dem Durchmesser  $E_1E_2$  senkrecht.

Da der Punkt  $G$  der Schnittpunkt der Tangente  $EE_1$  mit der Polare von  $N$  ist, so ist er ein Punkt der Kurve, denn die Polare eines Punktes einer Tangente geht durch den Berührungspunkt. Die Polare von  $J$  in Bezug auf die Kurve ist  $BG$  (463. 464), also sind  $BG$  und  $BJ$  konjugierte Strahlen. Sie stehen auf einander senkrecht. In  $B$  sind noch  $BA$  und die Senkrechte zur Hauptaxe konjugierte Strahlen; es hat also die Involution konjugierter Strahlen in  $B$  zwei rechtwinklige Strahlenpaare und somit lauter solche Strahlenpaare. Dasselbe gilt vom Punkte  $B_1$ . Man nennt  $B$  und  $B_1$  *Brennpunkte* der Kurve, ihre Polaren  $l$  und  $l_1$  *Leitlinien*.

467. Es sei  $J$  ein ganz beliebiger Punkt der Leitlinie, so sind  $JB$  und die in  $B$  darauf errichtete Senkrechte  $i$  konjugierte Strahlen der Kurve. Ueber  $BJ$  beschreibe man einen Kreis, welcher den Kreis  $M$  schneiden muß. Einer der Schnittpunkte sei  $E$ , dann ist  $JE$  eine Tangente der Kurve und ihr Schnittpunkt  $G$  mit  $i$  der Berührungspunkt. Dies ist bewiesen, wenn man zeigt, daß  $NGEE_1$  harmonische Punkte sind.

Sind  $EE_1NX$  harmonisch, so müssen wieder  $NK$ ,  $BX$ ,  $E_1E_2$  parallel sein und  $JB$  ist die Polare von  $L$  bezüglich des Kreises, also senkrecht auf  $E_1E_2$  und also auch auf  $BX$ , folglich fällt  $BX$  mit  $BG$  zusammen, und  $EE_1NG$  sind harmonisch. Somit liegt  $G$  auf der Polare von  $N$  bezüglich des Kreises  $M$  und der Kurve, denn der Punkt  $N$  hat für beide dieselbe Polare. Umgekehrt muß also die Polare von  $G$  durch  $N$  und  $J$  gehen, also  $GJ$  selbst, d. h. eine Tangente der Kurve sein; der Berührungspunkt ist  $G$ .

Zieht man  $B_1G$  bis  $F$ , so ist  $BE = FE$ , also  $ME \parallel B_1F$  und  $ME = \frac{1}{2}B_1F = \frac{1}{2}(B_1G + BG)$ .

Aber  $ME = \frac{1}{2}AA_1$ , also

$$B_1G + BG = AA_1, \text{ d. h.}$$

Die Kurve II. O. ist der Ort eines Punktes, dessen Entfernungssumme (oder Entfernungsdifferenz) von zwei festen Punkten konstant gleich der Hauptaxe ist.



Hiermit ist die Identität der Kurve II. O. mit einem Kegelschnitte nachgewiesen; dies läßt sich auch noch auf folgende Art thun.

468. Die Sehne  $DD_1$  der Kurve II. O.  $K$  schneide die Leitlinie  $l$  in  $E$ ; man errichte die Senkrechte  $BF$  auf  $BE$ ,




Fig. 189.

also die Polare von  $E$ , so sind  $DD_1EF$  harmonisch, also (6c.) sind  $BE$  und  $BF$  die Halbierungslinien der von  $DB$  und  $D_1B$  gebildeten Winkel, folglich verhält sich (7.)

$$BD : BD_1 = ED : ED_1 = DH : D_1H_1$$

oder

$$DB : DH = D_1B : D_1H_1.$$

Wenn sich  $DD_1$  um  $D$  dreht, so bleibt das erste Verhältniß konstant, also auch das zweite, d. h.

*Die Kurve II. O. ist der Ort eines Punktes, dessen Abstände von einem festen Punkte und einer festen Geraden ein konstantes Verhältniß haben.*

469. *Der Kegelschnitt als Erzeugnis projektivischer Punktreihen.*

Es seien  $s(ABCD \dots)$  und  $s_1(A_1B_1C_1D_1 \dots)$  zwei projektivische Punktreihen; der Ort der Verbindungsgeraden entsprechender Punkte ist eine kontinuierliche krumme Linie, Kurve,  $\mathfrak{K}$ , an welche von jedem Punkte  $G$  nur zwei Verbindungslinien, Tangenten, sich ziehen lassen. Denn aus diesem Punkte werden die projektivischen Punktreihen durch zwei projektivische Strahlenbüschel projiziert, deren Doppelstrahlen die Tangenten durch  $G$  sind. Man nennt daher die Kurve von der II. Klasse. Da dem gemeinsamen Punkte  $ss_1$  sowohl



in der Punktreihe ( $s$ ) als in der Reihe ( $s_1$ ) ein Punkt entspricht, so sind  $s$  und  $s_1$  auch Tangenten der Kurve  $\mathfrak{K}$ .




Fig. 190.

Von jedem Punkte auf  $s$  oder  $s_1$  läßt sich außer  $s$  oder  $s_1$  noch eine zweite Tangente an die Kurve ziehen, die Verbindungslinie mit dem entsprechenden Punkte. Bei denjenigen Punkten, welche dem gemeinsamen Punkte  $ss_1$  entsprechen, fällt diese zweite Tangente mit  $s$  oder  $s_1$  zusammen. Von diesen Punkten läßt sich also an die Kurve nur je eine Tangente  $s$  oder  $s_1$  ziehen; sie heißen *Berührungspunkte der Kurve II. Klasse*.

Die Verbindungslinien  $AA_1, BB_1, CC_1, DD_1, \dots$  seien  $a, b, c, d, \dots$ . Man konstruiere die Schnittpunkte  $ab$  und  $ac$  und ziehe von ihnen noch den Punkten der Reihen die Strahlen  $abcd \dots$  und  $a_1b_1c_1d_1 \dots$ , so sind diese Strahlenbüschel projektivisch und in perspektivischer Lage, also liegen die Schnittpunkte homologer Strahlen auf einer Geraden  $p$ .

Man denke sich nun in der Figur die fünf Geraden



$ss_1bcd$  fest, aber  $a$  beweglich auf der Kurve II. Klasse, so daß es stets Tangente bleibt. Dabei durchlaufen die Punkte  $ba$  und  $ca$  die Geraden  $b$  und  $c$ , die Geraden  $c$ ,  $d$  und  $b_1$ ,  $d_1$  gehen stets durch diese Punkte. Der Schnittpunkt  $dd_1$  liegt dabei immer auf  $p$ , weil diese Gerade als Verbindungslinie der festen Punkte  $s_1b$  und  $sc$  unverändert bleibt. Da also der Punkt  $dd_1$  die feste Gerade  $p$  durchläuft, so beschreiben  $d$  und  $d_1$  um die festen Punkte  $sd$  und  $s_1d_1$  d. i.  $D$  und  $D_1$ , projektivische Strahlenbüschel, also sind die von den Punkten  $ba$  und  $ca$  beschriebenen Punktreihen projektivisch. Sie erzeugen also auch die Kurve  $\mathfrak{K}$  und da  $b$  und  $c$  zwei ganz beliebige Tangenten waren, so folgt:

470. *Irgend zwei Tangenten einer Kurve II. Klasse werden durch die übrigen in projektivischen Punktreihen geschnitten.*

Sieht man die Tangenten  $abs$ ,  $dsc$  als Seiten eines der Kurve umgeschriebenen Sechseits an, so findet man, daß die Diagonalen  $d$ ,  $p$ ,  $d_1$  sich in einem Punkte schneiden.

Der größeren Anschaulichkeit wegen werde das Sechseck als Sechseck  $EB_1D_1DCF$  bezeichnet; die Gegeneckenpaare sind  $E$  und  $D$ ,  $B_1$  und  $C$ ,  $F$  und  $D_1$ .

Es folgt also der Lehrsatz von Brianchon:

*In jedem einer Kurve II. Klasse umgeschriebenen Sechseck schneiden sich die Verbindungslinien der Gegenecken in einem Punkte.*

471. Läßt man  $s_1$  mit  $b$  und  $s$  mit  $c$  zusammenfallen, so erhält man ein der Kurve umgeschriebenes Viereck  $abdc$ , in welchem sich die Verbindungslinien der Gegenecken  $d$  von  $ab$  und  $cd$ ,  $d_1$  von  $ac$  und  $bd$  und die Verbindungslinie  $p$  der Berührungspunkte auf  $b$  und  $c$  in einem Punkte schneiden. Somit folgt als spezieller Fall des




Fig. 191.

vorigen Satzes:



In jedem einer Kurve II. Klasse umgeschriebenen Vierseite schneiden sich die Diagonalen und die Verbindungslinien der Berührungspunkte auf den Gegenseiten in einem Punkte.

472. Es sei  $a$  eine beliebige Gerade; von einem festen Punkte derselben ziehe man an eine Kurve II. Kl.  $K$  die Tangenten  $b$  und  $c$  und von einem veränderlichen Punkte die Tangenten  $d$  und  $e$ , so hat man ein umgeschriebenes Vierseit  $bcde$ . In diesem schneiden sich die Verbindungslinien  $f$




Fig. 192.

und  $g$  der Gegenecken  $be$ ,  $cd$  und  $bd$ ,  $ce$  in einem Punkte  $A$ , durch welchen auch die Verbindungslinie der Berührungspunkte  $D$  und  $E$  auf den Tangenten  $d$  und  $e$  geht. Aus den Eigenschaften des vollständigen Vierseits ergibt sich, daß  $d$  und  $e$  durch  $A$  und  $a$  harmonisch getrennt sind, also werden auch  $D$  und  $E$  durch  $A$  und  $a$  harmonisch getrennt und es folgt:

*Alle Punkte, welche durch eine Kurve II. Kl. von einem Punkte  $A$  harmonisch getrennt sind, liegen auf einer Geraden  $a$ ; diese heißt die Polare von  $A$ .*

473. Die Gerade  $a$  schneidet entweder die Kurve oder nicht. Im ersten Falle sind die Verbindungslinien der Schnittpunkte mit  $A$  Tangenten der Kurve. Im zweiten Falle lassen sich von  $A$  keine Tangenten an  $K$  ziehen. Der Punkt  $A$  liegt im ersten Falle außerhalb, im zweiten innerhalb der Kurve



II. Kl. und diese scheidet, wie eine Kurve II. O. die Ebene in zwei Gebiete, ein inneres und ein äußeres.

Liegt  $A$  innerhalb und ist  $A_1$  irgend ein Punkt seiner Polare  $a$ , so muß wegen des letzten Satzes die Polare von  $A_1$  durch  $A$  gehen. Dasselbe folgt aus diesem Satze, wenn  $A$  außerhalb, aber  $A_1$  innerhalb auf  $a$  liegt.

Ist  $A_2$  ein Punkt von  $a$  (Fig. 192), welcher außerhalb der Kurve liegt und sind  $de$  die Tangenten von ihm an  $K$ , so geht die Verbindungslinie der Berührungspunkte  $DE$ , d. i. die Polare von  $A_2$  durch  $A$ , also folgt allgemein:

*Durchläuft ein Punkt eine Gerade, so dreht sich seine Polare um den Pol der Geraden und umgekehrt.*

474. Aus diesen beiden Hauptsätzen der Polarentheorie folgert man wieder die Identität der Kurve II. Kl. mit einem Kegelschnitte.

Man konstruiere wieder den Mittelpunkt  $M$  der Kurve, d. i. den Pol der unendlichen fernen Geraden  $g_\infty$ . Wenn diese die Kurve nicht schneidet, so liegt  $M$  innerhalb derselben; wenn aber  $g_\infty$  und  $K$  gemeinsame Punkte haben, so liegt  $M$  außerhalb der Kurve. In diesem Falle lassen sich von  $M$  Tangenten an dieselbe ziehen, deren Berührungspunkte im Unendlichen liegen. Diese Tangenten heißen die *Asymptoten* der Kurve.

475. In der Involution konjugierter Durchmesser bestimme man das rechtwinklige Paar konjugierter Strahlen, die *Axen* der Kurve. Beide Axen müssen die Kurve schneiden, wenn  $M$  innerhalb liegt. Die größere von ihnen heißt die *Hauptaxe*. Wenn aber  $M$  außerhalb liegt, so ist jede Asymptote sich selbst konjugiert; *die Asymptoten sind demnach die Doppelstrahlen der Involution konjugierter Durchmesser und trennen jedes andere Paar konjugierter Durchmesser harmonisch.* Der von ihnen gebildete Winkel wird daher durch die Axen halbiert.

Die Asymptoten teilen die Ebene in vier Gebiete, die paarweise in Scheitelwinkeln liegen. In einem dieser Gebiete liegt die Kurve II. Kl. Von den beiden Axen kann daher nur eine die Kurve schneiden; diese heißt die *Hauptaxe*. Zieht man in ihren Endpunkten, den Scheiteln der Kurve, die Scheitel-



tangenten, so liegt zwischen diesen kein Punkt der Kurve. Alle Tangenten derselben schneiden die Hauptaxe.

476. Man ziehe in den Endpunkten  $AA_1$  der Hauptaxe die Scheiteltangenten und schneide sie mit den Asymptoten




Fig. 193.

in  $DE$  und  $D_1E_1$ , im zweiten Falle, wenn  $M$  innerhalb liegt, mit den Tangenten in den Endpunkten der Nebenaxe, in  $DE$  und  $D_1E_1$ . Über  $DD_1$  und  $EE_1$  beschreibe man Kreise, so schneiden sich diese in zwei Punkten  $BB_1$  der Hauptaxe.

Nennt man den Schnittpunkt der Scheiteltangenten  $\mathfrak{A}_\infty$ , so sind die Punktreihen  $(\mathfrak{A}_\infty A D E F \dots)$  und  $(A_1 \mathfrak{A}_\infty D_1 E_1 F_1 \dots)$ , in denen die Scheiteltangenten von den übrigen geschnitten werden, in projektivischer Beziehung und da

$$\sphericalangle ABD = \mathfrak{A}_\infty B D_1, \quad \sphericalangle ABE = \mathfrak{A}_\infty B E_1$$

[denn beide haben entweder  $DB\mathfrak{A}_\infty$  oder  $EB\mathfrak{A}_\infty$  zum Komplementwinkel,] so muß auch

$$\sphericalangle ABF = \mathfrak{A}_\infty B F_1$$

und daher

$$\sphericalangle FBF_1 = 90^\circ \text{ sein.}$$

Denkt man sich einen Kegelschnitt konstruiert, welcher  $AA_1$  zur Hauptaxe,  $B$  und  $B_1$  zu Brennpunkten hat, so erscheint letzteren jedes von den Scheiteltangenten abgeschnittene Stück einer anderen Tangente unter einem rechten Winkel. Die Tangenten dieses Kegelschnittes müssen daher mit den Tangenten der Kurven II. Klasse zusammenfallen, also ist letztere mit dem Kegelschnitte identisch.

477. *Andere Ableitung der Fundamenteigenschaft der Brennpunkte.*



Es sei  $q_1$  die Polare von  $Q_1$ ; man fälle  $RS$  senkrecht auf die Nebenaxe und konstruiere auf ihr den zu  $S$  konjugierten Punkt  $S_1$ ; dann ist

$$MS \cdot MS_1 = \pm b^2$$

je nachdem die Nebenaxe die Kurve schneidet oder nicht schneidet. Es ist  $Q_1 S_1$  die Polare von  $R$ , denn erstens sind




Fig. 194.

$R$  und  $S_1$  konjugierte Punkte, weil  $RS$  die Polare von  $S_1$  ist und zweitens sind  $R$  und  $Q_1$  konjugierte Punkte. Alle Paare konjugierter Punkte auf  $q_1$  bilden eine Involution, deren Centralpunkt  $Q$  ist, denn der ihm zugeordnete ist  $\mathcal{Q}_\infty$ . Die Potenz dieser Involution ist  $QR \cdot QR_1$ . Man setze

$$MQ = x, MQ_1 = x_1, AM = a;$$

dann ist

$$R_1 Q : x - x_1 = MS_1 : x_1$$

$$R_1 Q = \frac{MS_1 (x - x_1)}{x_1}$$

und 
$$QR \cdot QR_1 = \frac{(x - x_1) MS \cdot MS_1}{x_1} = \pm \frac{(x - x_1) b^2}{x_1}.$$

Aus 472. folgt

$$x \cdot x_1 = a^2, x = \frac{a^2}{x_1}, x - x_1 = \frac{a^2 - x_1^2}{x_1}.$$

Soll nun  $QR \cdot QR_1 = QQ_1^2$  sein, so hat man

$$\pm \frac{b^2 (x - x_1)}{x_1} = (x - x_1)^2,$$

also

$$\pm b^2 = x_1 (x - x_1) = a^2 - x_1^2$$

und

$$x_1^2 = a^2 \mp b^2.$$



Beschreibt man über allen Punktpaaren  $RR_1$  Kreise, so schneiden sie sich in zwei Punkten der Hauptaxe, denn diese steht im Centralpunkte auf  $q_1$  senkrecht und zwar muß einer dieser Punkte  $Q_1$  sein. Man bezeichne ihn in diesem Falle mit  $B$ . Da  $RB \perp R_1B$  und beide Strahlen konjugiert sind, so folgt mit Rücksicht auf die symmetrische Lage der Kurve in Bezug auf beide Axen:

*Es giebt auf der Hauptaxe zwei Punkte, in denen die Involutionen konjugierter Strahlen circulare Involutionen sind.*

Die Lage dieser Punkte ergibt sich aus der Gleichung

$$a^2 \mp b^2 = e^2$$

wenn man

$$MB = e \text{ setzt.}$$

Aus diesem Fundamentalsatze folgt aber wie vorhin (476) die Identität der Kurve II. Klasse mit dem Kegelschnitte.

478. Mit Hilfe der harmonischen Punkte  $RSPP_1$  folgt aus ähnlichen Dreiecken

$$QQ_1 : y_1 = QM : S_1M;$$

$$\text{Es ist aber } QQ_1 = x - x_1 = \frac{a^2 - x_1^2}{x_1}, \quad QM = \frac{a^2}{x_1},$$

$$S_1M = \pm \frac{b^2}{SM} = \pm \frac{b^2}{y_1},$$

$$\text{also} \quad \frac{(a^2 - x_1^2)}{x_1} : y_1 = \frac{a^2}{x_1} : \pm \frac{b^2}{y_1}$$

oder  $\pm b^2 (a^2 - x_1^2) = a^2 y_1^2$  und durch Division durch  $x_1^2 y_1^2$

$$\frac{x_1^2}{a^2} \pm \frac{y_1^2}{b^2} = 1.$$

Die Gleichung der Kurve II. Klasse ist also die Kegelschnittsgleichung.

479. Wenn  $g_\infty$  eine Tangente der Kurve II. Klasse wird, so wird der Mittelpunkt  $M$  derselben der Berührungspunkt mit  $g_\infty$ , also ein unendlich ferner Punkt. Alle Durchmesser dieser Kurve sind parallel. Da der Pol eines jeden im Unendlichen liegt, so erhält man einen Durchmesser, wenn man die Halbierungspunkte zweier parallelen Sehnen verbindet. Zieht man zwei zu diesem Durchmesser senkrechte Sehnen, so ist der Durchmesser  $a$ , welcher ihre Mitten verbindet, die Axe der Kurve, denn ihr Pol liegt senkrecht über ihr im Unendlichen. Die Tangente im Endpunkte  $A$  der Axe ist die



Scheiteltangente. Macht man auf ihr  $AD = AE$ , zieht durch  $D$  und  $E$  die Tangenten  $DD_\infty$  und  $EE_\infty$  an die Kurve und errichtet auf ihnen in  $D$  und  $E$  Senkrechte, so schneiden sie sich in einem Punkte  $B$  der Axe. Die Winkel  $DBD_\infty$  und  $EBE_\infty$  sind rechte Winkel. Schneidet irgend eine andere Tangente die Scheiteltangente in  $F$  und  $g_\infty$  in  $F_\infty$ , so folgt wie oben (476), dafs auch  $\angle FBF_\infty = 90^\circ$  ist.

480. Denkt man sich eine Parabel konstruiert, welche  $a$  zur Hauptaxe und die Senkrechte in  $A$  zur Scheiteltangente hat, so mufs sie, wie unmittelbar aus der Konstruktion folgt, mit der Kurve II. Klasse zusammenfallen.




Fig. 195.

Sind  $Q$  und  $Q_1$  zwei konjugierte Punkte der Axe, so müssen sie gleichweit von  $A$  entfernt sein, weil die Axe unendlich groß ist.

Man errichte in  $Q_1$  die Senkrechte  $Q_1P$ , nehme auf der Axe noch zwei konjugierte Punkte  $DD_1$  beliebig, errichte in  $Q$  und  $D$  die Senkrechten und fälle  $PR$  senkrecht darauf; der Durchschnitt mit der Senkrechten in  $D$  sei  $C$ . Da die Gerade  $PR$  die Richtung der Durchmesser hat, so liegt ihr Pol im Unendlichen auf der Tangente  $QP$ . Zieht man daher durch  $Q_1$  und  $D_1$  die Parallelen zur Tangente  $QP$ , so sind sie die Polaren von  $R$  und  $C$  und  $RR_1$  sowie  $CC_1$  sind konjugierte Punkte. Nun verhält sich



$$DC_1 : DD_1 = RQ : QQ_1 \text{ und, da } DC = RQ, \\ DC_1 \cdot DC : DD_1 = RQ^2 : QQ_1.$$

Die Kreise über den Punktpaaren  $CC_1$  konjugierter Punkte schneiden sich in zwei Punkten der Axe. Sollen diese Kreise sich in  $D_1$  schneiden, so muß

$$DC_1 \cdot DC = \frac{DD_1 \cdot RQ^2}{QQ_1} = DD_1^2$$

oder

$$RQ^2 = DD_1 \cdot QQ_1$$

sein. Bezeichnet man  $DD_1$  mit  $2p$ ,  $QQ_1$  mit  $2x$ ,  $PQ_1$  mit  $y$ , so hat man als Gleichung der Kurve

$$y^2 = 4p \cdot x,$$

die Gleichung der Parabel. Da in diesem Falle  $\sphericalangle CD_1C_1 = 90^\circ$ , so folgt für den Punkt  $D_1$  die Fundamenteigenschaft des Brennpunktes, daß je zwei konjugierte Strahlen desselben auf einander senkrecht sind.

481. Die Identität der Kurven II. Ordnung und II. Klasse mit den Kegelschnitten ist somit auf verschiedene Arten nachgewiesen. Zu einem anderen Identitätsbeweise gelangt man auf folgende Art.

Die Kurve  $K$  II. O. ist durch projektivische Büschel  $(S)$  und  $(S_1)$  erzeugt. Diese sind durch drei Paar homologe Strahlen bestimmt, also ist die Kurve selbst durch  $SS_1$  und die Schnittpunkte  $ABC$  dieser Strahlenpaare bestimmt:

*Jede Kurve  $K$  II. O. ist durch fünf ihrer Punkte bestimmt;  
Durch fünf beliebige Punkte läßt sich stets eine einzige Kurve II. O. legen.*

Sind  $ABCDE$  fünf beliebige Punkte der Kurve  $K$  II. Ord., so stelle man eine solche harmonische Verwandtschaft her, daß dem Fünfecke  $ABCDE$  ein Kreisfünfeck  $A_1B_1C_1D_1E_1$  verwandt ist (87). Dem um das letztere beschriebenen Kreise ist die Kurve  $K$  verwandt. Denn wegen Gleichheit der Peripheriewinkel auf demselben Bogen sind die Büschel, welche aus  $A_1$  und  $B_1$  die Punkte des Kreises projicieren, kongruent, also projektivisch; ihnen aber sind die Büschel verwandt, welche die Punkte der dem Kreise verwandten Kurve aus  $A$  und  $B$  projicieren. Da aber den homologen Strahlenpaaren  $A_1C_1$  und  $B_1C_1$ ,  $A_1D_1$  und  $B_1D_1$ ,  $A_1E_1$  und  $B_1E_1$  die homo-



logischen Strahlenpaare  $AC$  und  $BC$ ,  $AD$  und  $BD$ ,  $AE$  und  $BE$  verwandt sind, so fällt die dem Kreise verwandte Kurve mit der Kurve  $K$  zusammen:

*Jede Kurve II. Ord. ist einem Kreise harmonisch verwandt.*

482. Auch auf folgende Art läßt sich der letzte Satz erweisen.

Die Strahlenbüschel  $S(ABCDE\dots)$  und  $S'(ABCDE\dots)$  erzeugen die Kurve  $K$  II. Ord. Man schneide beide Büschel durch eine Gerade  $g$ , welche  $K$  nicht trifft, in den Punkten  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\dots$  und  $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}'\mathfrak{C}'\mathfrak{D}'\mathfrak{E}'\dots$ , so giebt es zwei Punkte, von denen die Segmente  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}'$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}'$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}'$ ,  $\dots$  unter gleichen Winkeln erscheinen. (S. 453.) Diese beiden Punkte seien  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{D}'$ ; der eine ist der Gegenpunkt des anderen bezüglich  $g$ . Man ziehe durch  $\mathfrak{D}'$  eine Gerade  $o$  und nehme  $\mathfrak{D}$  und  $o$  als Centrum und Axe einer harmonischen Verwandtschaft. Der Geraden  $g$  ist  $g_\infty$  verwandt. Den Punkten  $S$  und  $S'$  sind  $\mathfrak{S}$  und  $\mathfrak{S}'$  verwandt, den Strahlen  $S\mathfrak{A}$  und  $S'\mathfrak{A}'$  sind parallele Gerade durch  $\mathfrak{S}$  zu  $\mathfrak{D}\mathfrak{A}$  und durch  $\mathfrak{S}'$  zu  $\mathfrak{D}\mathfrak{A}'$  verwandt, so daß also  $\angle \mathfrak{A}\mathfrak{D}\mathfrak{A}'$  dem von den letzteren gebildeten Winkel gleich ist. Da aber  $\angle \mathfrak{A}\mathfrak{D}\mathfrak{A}' = \angle \mathfrak{B}\mathfrak{D}\mathfrak{B}' = \angle \mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{C}' = \dots$ , so sind auch die Winkel aller verwandten homologen Strahlen einander gleich und da sie über derselben Strecke  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}'$  gezeichnet sind, so liegen ihre Scheitel auf einem Kreise, der durch  $\mathfrak{S}$  und  $\mathfrak{S}'$  geht. Dieser Kreis und die Kurve  $K$  sind also harmonisch verwandt.

Im Obigen ist nachgewiesen, daß fünf Punkte eine Kurve II. O. eindeutig bestimmen. Zwei von ihnen sollen zusammenfallen, so daß also die Kurve ihre Verbindungslinie in ihnen berührt. Es seien also  $AABCD$  die fünf Punkte und  $a$  die Verbindungslinie  $AA$ ; dann bestimmen die Strahlenpaare  $AA$  und  $BA$ ,  $AC$  und  $BC$ ,  $AD$  und  $BD$  zwei projektivische Strahlenbüschel und diese erzeugen eine Kurve durch  $AABCD$ .

Fallen auch noch  $B$  und  $C$  zusammen, so muß die Kurve auch die Verbindungsgerade  $b$  in  $B$  berühren. Die Strahlenpaare  $AA$  und  $BA$ ,  $AB$  und  $BB$ ,  $AD$  und  $BD$  bestimmen wieder zwei projektivische Büschel und diese erzeugen eine Kurve II. O. Es folgt:

*Durch vier Punkte und die Tangente in einem oder durch*



*drei Punkte und die Tangenten in zweien ist eine Kurve II. Ord. eindeutig bestimmt.*

484. In gleicher Weise folgert man die Sätze:

*Eine Kurve II. Klasse ist bestimmt durch fünf Tangenten oder durch vier Tangenten und den Berührungspunkt auf einer oder durch drei Tangenten und die Berührungspunkte auf zweien.*

Sind  $abcde$  fünf Tangenten, so schneide man  $a$  und  $b$  durch  $cde$ , dann sind durch die Paare von Schnittpunkten  $ac$  und  $bc$ ,  $ad$  und  $bd$ ,  $ae$  und  $be$  zwei projektivische Punktreihen bestimmt, welche eine Kurve II. Kl. erzeugen.

Fällt  $e$  mit  $a$  zusammen, so werden diese projektivischen Punktreihen bestimmt durch die Punktpaare  $aa$  und  $ba$ ,  $ac$  und  $bc$ ,  $ad$  und  $be$ . Der Schnittpunkt  $aa$  ist in diesem Falle der gegebene Berührungspunkt.

Wenn  $e$  mit  $a$  und  $d$  mit  $b$  zusammenfällt, so kennt man also die Berührungspunkte auf  $a$  und  $b$  und die projektivischen Punktreihen sind bestimmt durch die Punktpaare  $aa$  und  $ba$ ,  $ab$  und  $bb$ ,  $ac$  und  $bc$ .

Um die Identität der Kurve II. Klasse mit einem Kegelschnitte nachzuweisen, stelle man eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem durch  $abcde$  gebildeten Fünfseite ein anderes  $abcde$  verwandt ist, dem sich ein Kreis einzeichnen läßt (90.). Der durch  $abcde$  bestimmten Kurve II. Kl. ist dieser Kreis harmonisch verwandt.

485. *Das gemeinschaftliche Poldreieck zweier Kegelschnitte.*

*Zwei Kegelschnitte haben stets ein gemeinschaftliches Poldreieck, von welchem entweder alle drei Ecken reell oder zwei imaginär sind.*

Eine beliebige Gerade  $g$  habe in Bezug auf die Kegelschnitte  $K_1$  und  $K_2$  die Pole  $G_1$  und  $G_2$ ; die Polaren eines Punktes  $P$  von  $g$  seien  $p_1$  und  $p_2$ . Wenn  $P$  die Gerade  $g$  durchläuft, so durchlaufen  $p_1$  und  $p_2$  um  $G_1$  und  $G_2$  zwei projektivische Strahlenbüschel (20. 453.) und erzeugen einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ , den Ort des dem Punkte  $P$  bezüglich beider Kegelschnitte konjugierten Punktes  $Q$ . Legt man durch einen festen Punkt  $P_0$  von  $g$  eine zweite Gerade  $g'$ , so ist der Ort der ihren Punkten konjugierten Punkte ein zweiter Kegel-



schnitt  $\mathfrak{K}'$ , der den ersten in dem konjugierten Punkte  $Q_0$  schneiden muß. Beide Kegelschnitte müssen deshalb entweder noch einen oder noch drei gemeinschaftliche Punkte haben, wie sich leicht ergibt, wenn man einen Punkt den einen Kegelschnitt durchlaufen läßt und die Teile seines Weges unterscheidet, die er im innern und äußeren Gebiete des anderen zurücklegt.

Ist nur noch ein reeller Schnittpunkt vorhanden, so mag er  $A$  heißen; sind aber drei reelle Schnittpunkte vorhanden, so mögen sie  $ABC$  heißen.

Jeder dieser Punkte hat die Eigenschaft, daß seine Polaren bezüglich  $K_1$  und  $K_2$  in eine Gerade zusammenfallen, weil sie sich sowohl auf  $g$  als auf  $g'$  schneiden müssen.

Nennt man  $a$  und  $b$  die Polaren von  $A$  und  $B$ , so muß der Schnittpunkt  $(ab)$  die Gerade  $AB$  als gemeinsame Polare haben. Da es aber außer  $ABC$  keinen Punkt giebt, welcher für beide Kegelschnitte dieselbe Polare hat, so muß  $(ab)$  mit  $C$  zusammenfallen und es ergibt sich, daß  $ABC$  ein Poldreieck ist, in welchem jede Seite die Polare ihrer Gegenecke ist.

486. Durch  $A$  lege man eine beliebige Gerade  $m$ ; ihre Pole  $M_1$  und  $M_2$  bezüglich  $K_1$  und  $K_2$  liegen auf der Polare  $a = BC$  und ordnet man die Polaren eines veränderlichen Punktes von  $m$  einander zu, so erhält man in  $M_1$  und  $M_2$  zwei projektivische Strahlenbüschel in perspektivischer Lage, denn der Punkt  $A$  von  $m$  hat  $a$  oder  $M_1M_2$  als gemeinsame Polare, Diese Strahlenbüschel erzeugen also eine Gerade  $m'$ , die auch durch  $A$  geht.

In gleicher Weise erhält man in  $B$  zwei zusammengehörige Gerade  $n$  und  $n'$  der Art, daß die Punkte der einen konjugiert sind zu denen der anderen; die Geraden  $m$  und  $m'$  schneiden deshalb  $n$  und  $n'$  in zwei Paaren konjugierter Punkte. Da aber die konjugierten Punkte zu vier harmonischen Punkten auf  $n$  harmonische Punkte von  $n'$  sind, so beschreiben  $m$  und  $m'$  bei ihrer Drehung um  $A$  zwei projektivische Strahlenbüschel und zwar haben diese involutorische Lage, denn dem Strahl  $m$  entspricht  $m'$  doppelt. Rechnet man nämlich  $m$  zum ersten Büschel und schneidet damit  $n$  in  $D$ , so geht  $m'$  durch den



konjugierten Punkt  $D'$  auf  $n'$ ; rechnet man aber  $m$  zum zweiten Büschel und schneidet damit  $n'$  in  $E$ , so muß der Schnittpunkt  $E'$  von  $m'$  und  $n$  zu  $E$  konjugiert sein.

Die Involution der Strahlenpaare  $(mm')$  hat in  $A$  zwei Doppelstrahlen,  $m_0m'_0$ . Jeder von ihnen schneidet irgend zwei zugeordnete Strahlen der Involution  $(nn')$  in  $B$  oder  $(oo')$  in  $C$  in zugeordneten Punkten einer Involution, die für beide Kegelschnitte konjugierte Punkte sind. Also, wenn man diese Geraden gemeinschaftliche Sekanten nennt:

*In jeder Ecke des gemeinschaftlichen Dreiecks giebt es zwei reelle oder imaginäre gemeinschaftliche Sekanten.*

487. Auf  $a$  nehme man einen beliebigen Punkt  $M$ ; seine Polaren  $m_1$  und  $m_2$  in Bezug auf  $K_1$  und  $K_2$  schneiden sich in  $A$ . Ordnet man die Pole einer veränderlichen Geraden durch  $M$  einander zu, so erhält man zwei projektivische Punktreihen in perspektivischer Lage. Der Schnittpunkt  $M'$  der Verbindungsgeraden homologer Punkte liegt auf  $a$ . Wenn  $M$  und  $M'$  sich auf  $a$  bewegen, so durchlaufen sie die Punktpaare einer Involution, deren Doppelpunkte die Eigenschaft haben, daß je zwei konjugierte Strahlen für den einen Kegelschnitt auch konjugiert für den andern sind. Zu den Punktpaaren der Involution auf  $a$  gehören auch  $B$  und  $C$ ; diese aber werden durch die Doppelpunkte harmonisch getrennt, also:

*Auf jeder Seite des gemeinschaftlichen Poldreiecks giebt es zwei reelle oder imaginäre Punkte, welche für beide Kegelschnitte dieselbe Involution konjugierter Strahlen haben und durch zwei Ecken des Poldreiecks harmonisch getrennt werden.*

Wegen weiterer projektivischer Untersuchungen muß auf die eingehenden Werke von Schroeter und Reye verwiesen werden.

Wie im Vorhergehenden ausführlich gezeigt, lassen sich zwei Kegelschnitte durch harmonische Verwandtschaft entweder in konzentrische Kegelschnitte mit gemeinschaftlichen Axen verwandeln, wenn sie sich in vier reellen oder vier imaginären Punkten schneiden, oder auch in zwei Kreise, wenn sie entweder zwei reelle und zwei imaginäre oder vier imaginäre Punkte gemein haben. Daraus aber ergeben sich in einfacher Weise die Grundeigenschaften der Büschel und



besonders auch durch Zurückführung auf einfachere Gebilde leichtere Vorstellungen über den Verlauf und die Zusammensetzung des Büschels aus den einzelnen Individuen.

In gleicher Weise lassen sich zwei Kegelschnitte durch harmonische Verwandtschaft in zwei confocale Kegelschnitte mit gemeinschaftlicher Hauptaxe oder in zwei biconfocale Kegelschnitte verwandeln, je nachdem sie zwei reelle und zwei imaginäre oder vier imaginäre Tangenten haben. Mit Hilfe dieser Zurückführung gelangt man zu den Eigenschaften der Kegelschnittschar.

---



## Sätze und Aufgaben.\*)

1. Wenn man aus drei festen Punkten  $ACE$  einer Geraden Parallelen zu drei festen Geraden  $ace$  zieht, so schneiden sie sich in drei Punkten, die in einer Geraden liegen.

Die Parallelen durch  $A$  und  $E$  zu  $e$  und  $a$  mögen sich in  $M$ , diejenigen durch  $C$  und  $E$  zu  $e$  und  $c$  in  $N$  schneiden; ist dann  $O$  der Schnittpunkt von  $MN$  mit der durch  $A$  zu  $c$  gezogenen Parallelen, so ist, wenn man  $G$  den Schnittpunkt von  $AC$  mit  $MN$  nennt,

$$GE : GN = GA : GO \quad \text{und} \quad GA : GM = GC : GN,$$

also

$$GN \cdot GA = GE \cdot GO \quad \text{und} \quad GN \cdot GA = GM \cdot GC,$$

daher

$$GE \cdot GO = GM \cdot GC \quad \text{oder} \quad GE : GM = GC : GO,$$

$$\text{d. h. } CO \parallel ME \parallel a.$$

2. Die Höhenpunkte der vier Dreiecke, welche von vier Geraden  $abcd$  gebildet werden, liegen in einer Geraden.

Die Höhen der vier Dreiecke sind vier Geraden  $a_1 b_1 c_1 d_1$  parallel; man schneide  $d$  mit  $abc$  und wende auf die drei Schnittpunkte den vorigen Satz an, indem man  $a_1 b_1 c_1$  als die festen Geraden nimmt.

3. Wenn  $A$  und  $B$  die Endpunkte einer Strecke sind, so soll mit  $AB$  nicht nur die Länge des von einem Punkte von  $A$  bis  $B$  zurückgelegten Weges, sondern auch die Richtung desselben bezeichnet werden, so daß  $AB$  und  $BA$  entgegengesetzte Strecken bezeichnen. Sind  $ABCD$  irgend vier Punkte einer Geraden, so nennt man das Verhältniß der Brüche  $\frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD}$  ein *Doppelverhältniß* und bezeichnet es mit

$$(ABCD) = \frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD}.$$

4. Auf einer Geraden sind drei Punkte  $ABC$  gegeben, man

---

\*) Die mit einem Sterne (\*) bezeichneten Aufgaben setzen Projektivität voraus.



soll einen vierten Punkt  $D$  konstruieren, so daß das Doppelverhältnis  $(ABCD)$  einen bestimmten Wert  $\mu$  hat.

Fig. 1. Zwei parallele Gerade durch  $A$  und  $B$  schneide man mit einer beliebigen Geraden durch  $C$  in  $E$  und  $F$ , schneide auf  $FB$  über  $B$  hinaus eine Strecke  $BG$  ab, so daß  $BG : FB = \mu$  ist, so trifft die Gerade  $EG$  die gegebene Gerade in dem gesuchten Punkte  $D$ .

Würde man  $BG$  nach entgegengesetzter Richtung abgeschnitten haben, so würde das Doppelverhältnis auch den entgegengesetzten Wert annehmen.

Aus ähnlichen Dreiecken folgt

$$\frac{AC}{BC} = \frac{AE}{BF}, \quad \frac{AD}{BD} = \frac{AE}{BG}$$

und hieraus durch Division

$$\frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD} = \frac{BG}{BF} = \mu.$$

5. Vier Strahlen durch einen Punkt schneiden jede Gerade in vier Punkten von demselben Doppelverhältnis.

Fig. 1. Man schneide die vier Strahlen  $E(ABCD)$  durch eine Gerade in  $A_1B_1C_1D_1$ , ziehe  $F_1G_1 \parallel FG$ , so ist

$$(A_1B_1C_1D_1) = B_1G_1 : B_1F_1 = BG : BF = \mu.$$

Den konstanten Wert des Doppelverhältnisses der vier Punkte, in welchen vier Strahlen irgend eine Gerade schneiden, nennt man das *Doppelverhältnis der vier Strahlen*.

5a. Wenn zwei Punktgruppen  $ABCD$  und  $AB_1C_1D_1$  von demselben Doppelverhältnisse  $\mu$  einen Punkt  $A$  gemein haben, so treffen sich die Verbindungsgeraden der übrigen Punktpaare  $BB_1$ ,  $CC_1$ ,  $DD_1$  in einem Punkte.

Es sei  $S$  der Schnittpunkt von  $BB_1$  und  $CC_1$ ; dann müssen die Strahlen  $S(ABCD)$  die Gerade  $AB_1$  im Doppelverhältnisse  $\mu$  teilen, also muß  $SD$  durch  $D_1$  gehen.

5b. Wenn zwei Strahlenbüschel  $abcd$  und  $ab_1c_1d_1$  von demselben Doppelverhältnisse  $\mu$  einen Strahl  $a$  gemein haben, so liegen die Schnittpunkte der übrigen Strahlenpaare  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$  in einer Geraden.

Es sei  $s$  die Verbindungsgerade der Schnittpunkte  $bb_1$  und  $cc_1$ ; die Gerade  $s$  muß von beiden Büscheln im Doppelverhältnisse  $\mu$  geschnitten werden. Da aber drei Paar Schnittpunkte zusammenfallen, so thut dies auch das vierte Paar.



\*5c. Sind  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  drei feste Punkte zweier Geraden  $g$  und  $g_1$ ,  $X$  und  $X_1$  solche veränderliche Punkte, daß

$$(ABCX) = (A_1B_1C_1X_1),$$

so durchlaufen  $X$  und  $X_1$  zwei projektivische Reihen.

Denn denkt man sich die Geraden so verschoben, daß  $A_1$  mit  $A$  zusammenfällt, so treffen sich  $BB_1$ ,  $CC_1$ ,  $XX_1$  in einem Punkte und die Punktreihen liegen perspektivisch.

\*5d. Sind  $abc$  und  $a_1b_1c_1$  drei Strahlen zweier Punkte  $P$  und  $P_1$ ,  $x$  und  $x_1$  solche veränderliche Strahlen, daß

$$(abcx) = (a_1b_1c_1x_1),$$

so durchlaufen  $x$  und  $x_1$  zwei projektivische Strahlenbüschel.

\*5e. In zwei projektivischen Gebilden haben irgend vier Elemente des einen dasselbe Doppelverhältnis, wie die entsprechenden des anderen.

\*5f. Wenn zwei projektivische Gebilde drei Elemente entsprechend gemein haben, so sind sie identisch. 5c. und 5d.

5g. Wenn die Ecken zweier Dreiecke  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  paarweise auf Geraden liegen, die sich in einem Punkte  $S$  schneiden, so schneiden sich ihre Seiten paarweise auf einer Geraden und umgekehrt.

Die Seitenpaare  $AB$  und  $A_1B_1$ ,  $BC$  und  $B_1C_1$ ,  $AC$  und  $A_1C_1$  mögen sich in  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  treffen und die Gerade  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  mag von  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  in  $\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{C}_1$  geschnitten werden.

Projiziert man  $S\mathfrak{B}_1BB_1$  aus  $\mathfrak{A}$  auf  $CC_1$  und

$S\mathfrak{A}_1AA_1$  aus  $\mathfrak{B}$  auf  $CC_1$ , so ist

$$(S\mathfrak{B}_1BB_1) = (S\mathfrak{C}_1CC_1) = (S\mathfrak{A}_1AA_1),$$

also treffen sich

$$\mathfrak{A}_1\mathfrak{C}_1, AC, A_1C_1$$

in einem Punkte und dieser muß  $\mathfrak{C}$  sein.

5h. Wenn von zwei vollständigen Vierecken fünf Paare von Seiten sich auf einer Geraden schneiden, so liegt auch der Schnittpunkt des sechsten Paares auf dieser Geraden.

Die Vierecke seien  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$ ; es mögen sich  $AB$  und  $A_1B_1$ ,  $BC$  und  $B_1C_1$ ,  $CD$  und  $C_1D_1$ ,  $AD$  und  $A_1D_1$ ,  $AC$  und  $A_1C_1$  auf einer Geraden  $g$  schneiden; man soll zeigen, daß  $BD$  und  $B_1D_1$  sich auch auf dieser Geraden schneiden.

Nach dem vorigen Satze treffen sich  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  in einem Punkte  $S$  wegen der Dreiecke  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$ ; ebenso folgt aber auch, daß sich wegen der Dreiecke  $ACD$  und  $A_1C_1D_1$  die



Geraden  $AA_1$ ,  $CC_1$ ,  $DD_1$  in  $S$  treffen müssen. Daher liegen die Vierecke perspektivisch; da dies auch die Dreiecke  $ABD$  und  $A_1B_1D_1$  thun, so müssen sich  $BD$  und  $B_1D_1$  auf derselben Geraden schneiden, wie  $AB$  und  $A_1B_1$ ,  $AD$  und  $A_1D_1$ .

6. In einer harmonischen Verwandtschaft haben vier Punkte oder vier Strahlen dasselbe Doppelverhältnis wie ihre verwandten Punkte und Strahlen.

7. Auf einer Geraden sind drei Punkte  $ABC$  gegeben, man soll eine harmonische Verwandtschaft herstellen, in welcher das Verhältnis der zu  $AC$  und  $BC$  verwandten Strecken  $\mathfrak{AC}$  und  $\mathfrak{BC}$  einen bestimmten Wert  $\mu$  hat.

Man konstruiere auf  $AB$  einen Punkt  $D$  so, daß

$$(ABCD) = \mu \text{ (Cf. 4)}$$

ist und nehme irgend eine Gerade durch  $D$  als Mittellinie der Verwandtschaft.

Der dem Punkte  $D$  verwandte Punkt  $\mathfrak{D}$  fällt ins Unendliche; da aber  $\mathfrak{ABC}\mathfrak{D}$  mit  $ABCD$  auf denselben Strahlen durch das Centrum  $O$  der Verwandtschaft liegen, so ist

$$\mu = (ABCD) = (\mathfrak{ABC}\mathfrak{D}) = \frac{\mathfrak{AC}}{\mathfrak{BC}} : \frac{\mathfrak{AD}}{\mathfrak{BD}} = \frac{\mathfrak{AC}}{\mathfrak{BC}} : \frac{\infty}{\infty} = \frac{\mathfrak{AC}}{\mathfrak{BC}}.$$

8. Ein Viereck  $ABCD$  durch harmonische Verwandtschaft in ein anderes  $\mathfrak{ABC}\mathfrak{D}$  zu verwandeln, welches einem gegebenen Vierecke  $A_1B_1C_1D_1$  ähnlich ist.

Die Diagonalen  $AC$  und  $BD$ ,  $A_1C_1$  und  $B_1C_1$  schneiden sich in  $E$  und  $E_1$ ; man konstruiere auf  $AC$  und  $BD$  die Punkte  $F$  und  $G$  so, daß

$$(ACEF) = A_1E_1 : C_1E_1 \text{ und } (BDEG) = B_1E_1 : D_1E_1$$

und nehme  $FG$  als Mittellinie der Verwandtschaft.

Um das Centrum zu erhalten, schneide man  $FG$  mit  $AB$  und  $AD$  in  $H$  und  $J$ , und beschreibe über  $HJ$  und  $FG$  Kreise deren Peripheriewinkel gleich  $B_1A_1D_1$  und  $B_1E_1C_1$  sind, so schneiden sich diese in zwei Punkten, von denen man jeden als Centrum wählen kann.

9. Einen Kegelschnitt in einen anderen durch harmonische Verwandtschaft zu verwandeln, so daß zwei gegebene Punkte  $P$  und  $Q$  in die Brennpunkte verwandelt werden.

Man schneide den gegebenen Kegelschnitt mit  $PQ$  in  $P_1Q_1$  und konstruiere das Punktpaar  $RS$ , welches  $PQ$  und  $P_1Q_1$  harmonisch teilt; durch  $P$  lege man zwei konjugierte Gerade, welche die durch  $R$  gehende Polare  $s$  von  $S$  in  $T$  und  $T_1$  schneiden, dann sind  $QT$  und  $QT_1$  auch konjugierte Strahlen, da  $PQ$  und  $s$  auch



konjugiert sind. Ersteres ist eine Folge des Satzes: Sind  $a$  und  $b$  sowie  $c$  und  $d$  konjugierte Strahlen, so sind auch die Geraden, welche die Schnittpunkte  $ac$  und  $bd$  sowie  $ad$  und  $bc$  verbinden, konjugiert.

Über den Punktpaaren der auf  $s$  erhaltenen Involution beschreibe man Kreise; diese treffen sich in zwei Punkten  $O$  und  $O_1$ . Wählt man einen von ihnen als Centrum und  $s$  als Mittellinie der Verwandtschaft, so sind in dieser dem Kegelschnitte und den Punkten  $P$  und  $Q$  ein anderer Kegelschnitt und seine Brennpunkte verwandt.

10. Einen Kegelschnitt und zwei Punkte durch harmonische Verwandtschaft in einen anderen Kegelschnitt, den Mittelpunkt und einen Brennpunkt zu verwandeln.

11. Einen Kegelschnitt und einen Punkt durch harmonische Verwandtschaft in einen Kreis und seinen Mittelpunkt zu verwandeln.

Ist  $P$  der gegebene Punkt,  $p$  seine Polare, so konstruiere man auf dieser zwei Paar konjugierter Punkte  $AA_1$ ,  $BB_1$ ; beschreibe über ihren Abständen Kreise, die sich in  $O$  und  $O_1$  schneiden, so ist jeder dieser beiden Punkte das Centrum und  $p$  die Mittellinie der Verwandtschaft.

12. Gegeben seien ein fester Punkt  $O$  und eine feste Gerade  $o$  als Centrum und Axe; man konstruiere auf einer beliebig durch  $O$  gezogenen Geraden, welche die Axe in  $A'$  schneidet, irgend zwei Punkte  $A$  und  $\mathfrak{A}$  so, daß das Doppelverhältnis  $(OA'A\mathfrak{A})$  einen festen Wert  $\mu$  hat.

Dadurch ist jedem Punkte  $A$  der Ebene ein anderer  $\mathfrak{A}$  und diesem wieder jener als verwandt zugeordnet; die so hergestellte Beziehung zwischen den Punkten der Ebene nennt man *centrische Collineation*.

In dieser ist jeder Punkt der Axe sich selbst verwandt.

Verbindet man die vier Punkte  $OA'A\mathfrak{A}$  mit irgend einem Punkte  $P$  der Axe und schneidet das Büschel  $P(OA'A\mathfrak{A})$  mit einer Geraden durch  $O$  in  $OB'B\mathfrak{B}$ , so sind auch  $B$  und  $\mathfrak{B}$  verwandte Punkte. Durchläuft  $A$  die Gerade  $PA$ , so muß  $\mathfrak{A}$  die Gerade  $P\mathfrak{A}$  durchlaufen. Man nennt daher die Geraden  $PA$  und  $P\mathfrak{A}$  verwandte Gerade und folgert also:

*Zwei verwandte Punkte liegen mit dem Centrum in einer Geraden.*

*Zwei verwandte Gerade schneiden sich auf der Axe.*

*Verwandte Punkte liegen stets auf verwandten Geraden und umgekehrt.*



Es giebt eine Gerade  $g$ , welcher die unendlich ferne Gerade  $g_\infty$  verwandt ist; man nennt sie die *Gegenaxe der Collineation*.

Ist  $C$  irgend ein Punkt derselben,  $\mathfrak{C}$  der verwandte Punkt,  $C'$  der Schnittpunkt von  $OC$  mit der Axe, so ist

$$(OC'C\mathfrak{C}) = \mu = \frac{OC}{C'C} : \frac{O\mathfrak{C}}{C'\mathfrak{C}} = \frac{OC}{C'C} : \frac{\infty}{\infty} = \frac{OC}{C'C}.$$

Demnach teilt die Gegenaxe  $g$  jede Strecke zwischen Centrum und Axe nach dem festen Verhältnisse  $\mu$  und ist zur Axe parallel.

Die centrische Collineation ist durch Centrum, Axe und Gegenaxe bestimmt.

13. In jeder centrischen Collineation ist einem harmonischen oder involutorischen Gebilde wieder ein solches verwandt; jedem Kegelschnitte ist wieder ein Kegelschnitt verwandt. Beide schneiden sich auf der Collineationsaxe.

14. Liegt das Collineationscentrum  $O$  auf einem Kegelschnitte, so berührt er den verwandten Kegelschnitt in  $O$ .

15. Liegt das Collineationszentrum  $O$  auf einem Kegelschnitte  $K$  und geht die Collineationsaxe  $o$  durch  $O$ , so muß  $K$  mit dem verwandten Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  in  $O$  drei zusammenfallende Punkte oder eine Berührung der zweiten Ordnung haben.

16. In einem Punkte  $O$  eines Kegelschnittes  $K$  den Krümmungskreis zu konstruieren.\*)

Es kommt darauf an, den Kegelschnitt  $K$  in centrische Kollineation zum Krümmungskreise des Punktes  $O$  zu setzen. Es sei  $M$  der Mittelpunkt desselben und  $g_\infty$  seine Polare. Um  $M$  drehe sich ein Durchmesser des Kreises, dann muß die verwandte Sehne des Kegelschnittes  $K$  sich um einen Punkt  $\mathfrak{M}$  drehen; jeder Durchmesser und also auch jede ihm verwandte Kegelschnittsehne spannt in  $O$  einen rechten Winkel. Daher bilden die Schenkel dieser Winkel in  $O$  eine cirkulare Involution mit dem Involutionzentrum  $\mathfrak{M}$ . Dieses ist somit bekannt und seine Polare  $g$  in Bezug auf  $K$  ist die Gegenaxe der Kollineation. Da diese aber der Kollineationsaxe parallel ist, so ist auch diese bekannt; sie trifft  $K$  in seinem Schnittpunkte mit dem Krümmungskreise.

Dadurch erhält man die folgende Konstruktion des Krümmungskreises eines Punktes  $O$ .

Man lege durch  $O$  zwei rechte Winkel, verbinde die Punkte, in denen die Schenkelpaare den Kegelschnitt treffen, konstruiere die Polare  $g$  des Schnittpunktes  $\mathfrak{M}$  dieser Verbindungslinie und

\*) Fiedler, darstellende Geometrie.



lege durch  $O$  zu  $g$  die Parallele, welche den Kegelschnitt noch in  $A$  schneiden mag, so ist derjenige Kreis durch  $A$ , welcher die in  $O$  gezogene Kegelschnitttangente in  $O$  berührt, der Krümmungskreis.

17. Einen Kegelschnitt zu konstruieren aus dem Krümmungskreise in einem Punkte  $O$  und zwei Punkten  $A$  und  $B$ .

Die Geraden  $AO$  und  $BO$  mögen den Kreis  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  schneiden, dann sind  $AB$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  verwandte Gerade und schneiden sich in einem Punkte  $C$  der Kollineationsaxe  $OC$ . Diese treffe den Kreis in  $D$ , so ist  $D$  auch ein Punkt des Kegelschnittes, von dem man also vier Punkte  $ABDO$  und die Tangente in  $O$  kennt.

18. Das Doppelverhältnis von vier Punkten  $ABCD$  bleibt ungeändert, wenn man sie in zwei Paare teilt und die Punkte eines jeden Paares vertauscht.

$$(ABCD) = (BADC) = (CDAB) = (DCBA).$$

Dies ergibt sich erstens augenblicklich, wenn man die Doppelverhältnisse bildet und vergleicht, dann aber auch auf folgendem geometrischen Wege:

Einen beliebigen Punkt  $P$  verbinde man mit den Punkten  $ABCD$ , schneide die Strahlen  $P(ABCD)$  mit einer durch  $A$  gezogenen Geraden in  $AEFG$  und  $PC$  mit  $DE$  in  $Q$ , dann ist

$$\begin{aligned} (ABCD) &= (AEFG), \text{ wegen des Büschels } P(ABCD) \\ (AEFG) &= (CQFP), \text{ wegen des Büschels } D(AEFG) \\ (CQFP) &= (CDAB), \text{ wegen des Büschels } E(CQFP), \end{aligned}$$

also auch

$$(ABCD) = (CDAB).$$

18a. Sind  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  drei solche Punktpaare einer Geraden  $g$ , daß

$$(AA_1BC) = (A_1AB_1C_1),$$

so giebt es einen Punkt  $Q$  von solcher Lage, daß

$$QA \cdot QA_1 = QB \cdot QB_1 = QC \cdot QC_1;$$

die Punktpaare sind also in Involution. Man suche einen solchen Punkt  $Q$ , daß

$$(AA_1BB_1CC_1Q) = (A_1AB_1BC_1C\infty),$$

dann folgt aus

$$(ABA_1Q) = (A_1B_1A\infty), \text{ daß}$$



$$\frac{AA_1}{BA_1} : \frac{AQ}{BQ} = \frac{A_1A}{A_1\infty} : \frac{B_1A}{B_1\infty}$$

oder

$$\frac{B_1A}{BA_1} = \frac{AQ}{BQ}.$$

Ebenso

$$\frac{A_1B}{AB_1} = \frac{A_1Q}{B_1Q}$$

und daher

$$AQ \cdot A_1Q = BQ \cdot B_1Q.$$

18b. Sind  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  drei Punktpaare in Involution, so ist

$$(AA_1BC) = (A_1AB_1C_1).$$

Ist  $Q$  der Centralpunkt der Involution, so ist

$$QA \cdot QA_1 = QB \cdot QB_1 = QC \cdot QC_1$$

und

$$QA : QB = QB_1 : QA_1,$$

also auch

$$AB_1 : A_1B = QA : QB$$

und

$$AB : A_1B_1 = QA : QB_1.$$

Hieraus

$$\frac{AB}{A_1B} \cdot \frac{AB_1}{A_1B_1} = \frac{QA^2}{QB \cdot QB_1}.$$

Ebenso

$$\frac{AC}{A_1C} \cdot \frac{AC_1}{A_1C_1} = \frac{QA^2}{QC \cdot QC_1},$$

also auch

$$\frac{AB}{A_1B} : \frac{AC}{A_1C} = \frac{A_1B_1}{AB_1} : \frac{A_1C_1}{AC_1}$$

oder

$$(AA_1BC) = (A_1AB_1C_1).$$

\*19. Die drei Seitenpaare eines vollständigen Vierecks werden von jeder Geraden in den Punktpaaren einer Involution geschnitten.

Die Seitenpaare  $AB$  und  $CD$ ,  $BC$  und  $AD$ ,  $AC$  und  $BD$  mögen von irgend einer Geraden  $g$  in  $M$  und  $M_1$ ,  $N$  und  $N_1$ ,  $O$  und  $O_1$  geschnitten werden, dann ist, wenn der Schnittpunkt  $(AC, BD)$  mit  $S$  bezeichnet wird

$$(AOSC) = (N_1OO_1M_1) = (MOO_1N)$$

sobald man  $AOSC$  aus  $D$  und  $B$  auf  $g$  projiziert. Da aber auch nach dem Satze in 18.

$$(M_1O_1ON_1) = (N_1OO_1M_1),$$

so ist auch

$$(MOO_1N) = (M_1O_1ON_1), \text{ d. h.}$$

die Punktpaare  $MM_1$ ,  $NN_1$ ,  $OO_1$  sind drei Punktpaare einer Involution; denn die Punktgruppen  $MOO_1N$  und  $M_1O_1ON_1$  haben dasselbe Doppelverhältnis, sind also projektivisch und jedem der Elemente  $O$  und  $O_1$  entsprechen die Elemente  $O_1$  und  $O$  doppelt. (Cf. auch 18b.)



20. Die drei Eckenpaare eines vollständigen Vierseits werden aus jedem Punkte durch die Strahlenpaare einer Involution projiziert.

21. Die drei Geraden, welche einen Punkt  $P$  von den drei Seitenpaaren eines vollständigen Vierecks harmonisch trennen, schneiden sich in einem Punkte.

Es mögen sich die Geraden, welche den Punkt  $P$  von zwei Seitenpaaren harmonisch trennen, in  $Q$  schneiden; die Gerade  $PQ$  trifft die Seitenpaare in den Punktpaaren einer Involution. Zwei dieser Punktpaare werden durch  $P$  und  $Q$  harmonisch geteilt, also muß dies auch beim dritten Paare der Fall sein; die Gerade, welche  $P$  von dem dritten Seitenpaare harmonisch trennt, muß durch  $Q$  gehen.

22. Die drei Punkte, welche eine Gerade  $p$  von den drei Eckenpaaren eines vollständigen Vierseits harmonisch trennen, liegen auf einer Geraden  $q$ .

23. Vier Punkte eines Kegelschnittes werden aus jedem anderen Punkte desselben durch ein Strahlenbüschel von konstantem Doppelverhältnisse projiziert.

I. Sind  $ABCD$  vier Punkte eines Kegelschnittes  $K$ ,  $E$  und  $F$  irgend zwei andere, so soll sein

$$E(ABCD) \overline{\wedge} F(ABCD).$$

Stellt man eine harmonische Verwandtschaft her, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  ein Kreis  $\mathfrak{K}$  und den sechs Punkten  $ABCDEF$  die Punkte  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}$  verwandt sind, so sind die Büschel

$$\mathfrak{E}(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}) \text{ und } \mathfrak{F}(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D})$$

kongruent.

II. Man wende 5e. auf die projektivische Erzeugung an.

24. Welches ist der Ort eines Punktes, dessen Verbindungsgeraden mit vier festen Punkten ein konstantes Doppelverhältnis haben?

25. Jede Gerade  $g$  wird von einem Kegelschnitte  $K$  und den Gegenseitenpaaren eines eingeschriebenen Vierecks in einer Involution geschnitten.

Es seien  $MM_1$ ,  $NN_1$  und  $OO_1$  die Schnittpunkte mit  $K$  und den Gegenseitenpaaren  $AB$ ,  $CD$  und  $AD$ ,  $BC$  dann ist

$$D(MM_1AC) \overline{\wedge} B(MM_1AC) \overline{\wedge} B(M_1MCA)$$

oder  $(MM_1ON_1) \overline{\wedge} (M_1MO_1N)$

26. Alle Kegelschnitte eines Büschels schneiden eine Gerade in den Punktpaaren einer Involution.



27. Die sechs Ecken zweier Poldreiecke liegen auf einem Kegelschnitte.

Sind  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  die beiden Poldreiecke, so ist der Pol von  $AB_1$  der Schnittpunkt  $D$  von  $BC$  mit  $A_1C_1$  und der Pol von  $AC_1$  der Schnittpunkt  $E$  von  $BC$  mit  $A_1B_1$ . Nennt man  $D_1$  und  $E_1$  die Schnittpunkte von  $BC$  mit  $AB_1$  und  $AC_1$ , so sind  $DD_1$  und  $EE_1$  je zwei konjugierte Punkte; da auch  $B$  und  $C$  konjugierte Punkte sind, so sind

$$BC, DD_1, EE_1$$

in Involution. — Durch  $BA A_1 B_1 C_1$  lege man den Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ ; er schneide  $BC$  noch in  $\mathfrak{C}$ , dann müssen auch

$$B\mathfrak{C}, DD_1, EE_1 \text{ wegen 25.}$$

in Involution sein und  $\mathfrak{C}$  muß mit  $C$  zusammenfallen.

28. Die sechs Seiten zweier Poldreiecke sind Tangenten eines Kegelschnittes.

29. Liegen die Ecken zweier Dreiecke auf einem Kegelschnitte, so berühren die sechs Seiten einen andern Kegelschnitt.

Die beiden Dreiecke seien  $ABC$  und  $DEF$ , sieht man

$$ABCDEF$$

als ein eingeschriebenes Sechseck an, so schneiden sich

$$AB \text{ und } DE, BC \text{ und } EF, CD \text{ und } FA \text{ in}$$

$$M, N, O$$

Es treffen sich also

$$AF, CD, MN \text{ in einem Punkte } O.$$

Diese drei Geraden sind die Hauptdiagonalen des Sechsecks

$$FNCAMD$$

also werden die sechs Seiten desselben von einem Kegelschnitte nach Brianchons Satze berührt; die sechs Seiten sind aber die Seiten der Dreiecke  $ABC$  und  $DEF$ .

30. Berühren die Seiten zweier Dreiecke einen Kegelschnitt, so liegen die sechs Ecken auf einem anderen Kegelschnitte.

31. Ist ein Dreieck einem Kegelschnitte  $K$  ein- und einem andern  $\mathfrak{K}$  umgeschrieben, so giebt es unendlich viele Dreiecke, welche dem ersten Kegelschnitte ein- und dem zweiten umgeschrieben sind.

32. Alle Kegelschnitte, welche ein gemeinschaftliches Poldreieck haben, schneiden jede Transversale, welche durch eine Ecke desselben geht, in einer Involution.

Denn diese Ecke und der Schnittpunkt der Gegenseite mit der Transversale trennen die Schnittpunkte jedes Kegelschnittes harmonisch.



33. Jede Transversale durch eine Ecke des gemeinschaftlichen Poldreiecks einer Kegelschnittschar mit vier reellen Tangenten, wird von den Kegelschnitten der Schar und den Gegenseitenpaaren des umgeschriebenen Vierseits in den Punktpaaren einer Involution geschnitten. 32.

34. Wenn zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  ihre gemeinschaftlichen Tangenten  $abcd$  in  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$  berühren, so hat ein Kegelschnitt  $\mathfrak{R}$ , der durch  $ABC$  geht und  $d$  in  $D_1$  berührt, zur zweiten gemeinschaftlichen Sehne mit  $K_1$  die gerade Linie, welche die Schnittpunkte von  $a$  mit  $BC$ ,  $b$  mit  $AC$ ,  $c$  mit  $AB$  verbindet. (Salmon-Fiedler. Anal. Geom. der Kegelschnitte. IV. Aufl. S. 410.)

Die Gerade, welche die Berührungspunkte zweier Gegenseiten eines umgeschriebenen Vierseits verbindet, geht durch einen Diagonalepunkt desselben, folglich auch die Gerade  $AB$ . Sie werde von  $K_1$  in  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1$  geschnitten; sind noch  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{D}$  ihre Schnittpunkte mit  $c$  und  $d$ , so sind

$$AB, \mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}\mathfrak{D}$$

drei Punktpaare in Involution.

Die Gerade  $AB$  wird aber von den Kegelschnitten  $K_1$  und  $\mathfrak{R}$  und den gemeinschaftlichen Sehnen derselben in einer Involution geschnitten; diese Schnittpunkte sind  $AB$  auf  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1$  auf  $K_1$ , also ist die Involution dieselbe mit der vorigen und da  $d$  die eine gemeinschaftliche Sehne ist, muß die andere durch den Schnittpunkt von  $c$  mit  $AB$  gehen.

35. *Der Feuerbach'sche Satz.* In jedem Dreiecke berühren sich ein Berührungskreis und derjenige Kreis, welcher durch die Mitten der drei Seiten geht. (Salmon-Fiedler. Anal. Geom. der Kegelschnitte.)

Den Ecken  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  eines Dreiecks liegen die Seiten  $abc$  gegenüber; diese werden in ihren Halbierungspunkten  $ABC$  von einer Ellipse  $K$  und in den Punkten  $A_1B_1C_1$  von einem Kreise  $K_1$  berührt. Die vierte gemeinschaftliche Tangente von  $K$  und  $K_1$  sei  $d$  und berühre  $K_1$  in  $D_1$ . Legt man nun durch die Mitten  $ABC$  einen Kegelschnitt  $\mathfrak{R}$ , welcher  $d$  in  $D_1$  also auch  $K_1$  in  $D_1$  berührt, so ist seine zweite gemeinschaftliche Sekante mit  $K_1$  diejenige Gerade, auf welcher die Schnittpunkte von  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  mit  $AB$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  mit  $BC$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{A}$  mit  $CA$  liegen. Diese Gerade liegt aber im Unendlichen, also geht der Kegelschnitt  $\mathfrak{R}$  durch die Kreispunkte der unendlich fernen Geraden, in denen diese von jedem Kreise geschnitten wird und ist daher selbst ein Kreis.



36. Zwei beliebige Vierecke  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$  lassen sich stets als entsprechende Figuren in einer centrischen Collineation betrachten.

Man verwandle zunächst durch harmonische Verwandtschaft oder centrische Collineation das Viereck  $ABCD$  in ein anderes  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ , welches dem Vierecke  $A_1B_1C_1D_1$  ähnlich ist. Ist  $S$  das Centrum der Verwandtschaft, so lege man zwischen die Geraden  $S\mathfrak{A}$  und  $S\mathfrak{B}$  eine Strecke  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1$  parallel zu  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  und gleich  $A_1B_1$  und konstruiere darüber zwischen den Geraden  $S(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D})$  ein Viereck, welches dem Vierecke  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  ähnlich ist, so ist es dem Vierecke  $A_1B_1C_1D_1$  kongruent. Also liegt  $ABCD$  mit einem dem Vierecke  $A_1B_1C_1D_1$  kongruenten Vierecke  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1$  perspektivisch.

Es bleibt zu zeigen, daß beide auch collinear-verwandt in einer centrischen Collineation sind.

Da  $ABCD$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}$  in centrischer Collineation sind, so liegen die Schnittpunkte

$M, \quad N, \quad O, \quad P$  von  
 $AB$  und  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ,  $BC$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$ ,  $CD$  und  $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ ,  $DA$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{A}$   
 in einer Geraden  $g$ .

Es schneiden nun

$AB, BC, CD, DA$  die Seiten  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_1\mathfrak{A}_1$   
 in  $M_1, N_1, O_1, P_1$ ,

so ist wegen paralleler Geraden

$$AM : AM_1 = A\mathfrak{A} : A\mathfrak{A}_1 = AP : AP_1, \text{ also } M_1P_1 \parallel MP \text{ und}$$

$$BM : BM_1 = B\mathfrak{B} : B\mathfrak{B}_1 = BN : BN_1, \text{ also } M_1N_1 \parallel MN$$

Daher folgt, daß  $M_1N_1O_1P_1$  in einer zu  $g$  parallelen Geraden  $g_1$  liegen.

$S$  und  $g_1$  sind Centrum und Axe der centrischen Collineation, in welcher  $ABCD$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1$  sich entsprechen.

37. In der durch die Vierecke  $ABCD$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1$  (Cf. 36) hergestellten centrischen Collineation entspricht jedem Punkte  $X$  ein anderer Punkt  $Y_1$ .

Denkt man sich alle Punkte  $Y_1$  der Ebene starr mit dem Vierecke  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1\mathfrak{D}_1$  verbunden und dieses in die Lage  $A_1B_1C_1D_1$  gebracht, so gelangen die Punkte  $Y_1$  in die Lage  $X_1$ , stehen aber in einer bestimmten Beziehung zu den Punkten  $X$ . Diese Beziehung nennt man *Collinearität*. Dieselbe ist dadurch ausgezeichnet, daß vier Punkten von einem bestimmten Doppelverhältnisse vier Punkte von demselben Doppelverhältnisse entsprechen. Es folgt:



*Die collineare Beziehung ist durch zwei Vierecke als entsprechende bestimmt.*

Man hat also die Ebene als doppelt zu betrachten und rechnet alle Punkte  $X$  zu einem Systeme  $\Sigma$ , alle Punkte  $X_1$  zu einem andern  $\Sigma_1$ .

*Die Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  sind in collinearer Beziehung, die Ebene ist collinear auf sich selbst bezogen.*

38. In zwei collinearen Systemen sind die Geraden, welche zwei Paare entsprechender Punkte verbinden, entsprechende Gerade und die Punkte, in denen sich zwei Paare entsprechender Geraden schneiden, entsprechende Punkte. 12.

39. In einer durch zwei entsprechende Vierecke  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$  bestimmten collinearen Beziehung zu einer Geraden  $g$  die entsprechende Gerade  $g_1$  zu finden.

Es mögen sich  $AB$  und  $CD$  in  $E$ ,  $A_1B_1$  und  $C_1D_1$  in  $E_1$  schneiden; die beiden ersten Geraden  $AB$  und  $CD$  werden von  $g$  in  $P$  und  $Q$  geschnitten. Man bestimme die Punkte  $P_1$  und  $Q_1$  so, daß

$$(ABEP) \frown (A_1B_1E_1P_1) \text{ und } (CDEQ) \frown (C_1D_1E_1Q_1)$$

ist, dann ist  $P_1Q_1$  die gesuchte Gerade  $g_1$ .

40. In zwei collinearen Systemen  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  zu einem Punkte  $R$  den entsprechenden Punkt  $R_1$  zu konstruieren.

Die collineare Beziehung sei bestimmt durch die einander entsprechenden Vierecke  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$ ; man verbinde  $A$  und  $B$  mit  $R$  durch die Strahlen  $p$  und  $q$  und konstruiere in  $A_1$  und  $B_1$  die Strahlen  $p_1$  und  $q_1$  so, daß

$$(AB, AC, AD, p) \frown (A_1B_1, A_1C_1, A_1D_1, p_1) \text{ und} \\ (BA, BC, BD, q) \frown (B_1A_1, B_1C_1, B_1D_1, q_1) \text{ ist,}$$

dann ist der Schnittpunkt von  $p_1$  und  $q_1$  der gesuchte Punkt.

41. Wenn in einer centrischen Collineation mit dem Centrum  $O$  und der Axe  $o$  die Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  verwandt sind und man diese Systeme irgendwie gegeneinander verschiebt, so sind dieselben in allgemeiner collinearer Beziehung zu einander.

Jeder Geraden  $a$ , welche zur Axe  $o$  parallel ist, entspricht in der centrischen Collineation, eine Gerade  $a_1$ , die auch zu  $o$  parallel ist, denn jeder Punkt von  $o$ , also auch der unendlich ferne entspricht sich selbst und zwei entsprechende Gerade schneiden sich auf der Axe.

Dreht sich eine Gerade um  $O$  und schneidet  $a$  in  $BCDE..$ ,



$a_1$  in  $B_1 C_1 D_1 E_1 \dots$ , so ist wegen der Parallelität von  $a$  und  $a_1$

$$BC : CD : DE = B_1 C_1 : C_1 D_1 : D_1 E_1.$$

Die Punktreihen auf je zwei zur Axe parallelen entsprechenden Geraden sind also projektivisch-ähnlich.

Wenn  $a$  und  $a_1$  die von  $O$  auf  $o$  gefällte Senkrechte  $OO_1$  in  $A$  und  $A_1$  schneiden, dann ist

$$\frac{OA}{O_1 A} = \mu \cdot \frac{OA_1}{O_1 A_1}.$$

Soll nun  $OA = OA_1$  werden, so muß

$$O_1 A_1 = \mu \cdot O_1 A$$

sein. Bezeichnet man  $OA = OA_1$  mit  $x$ , so ist

$$O_1 A_1 = OO_1 + x, \quad O_1 A = OO_1 - x, \text{ also}$$

$$OO_1 + x = \mu (OO_1 - x)$$

$$x = \frac{\mu - 1}{\mu + 1} \cdot OO_1.$$

Daraus folgt: *Es gibt in jeder centrischen Collineation zwei zur Axe parallele entsprechende Gerade in gleichem Abstände vom Centrum. Auf diesen sind die durch entsprechende Punkte gebildeten Punktreihen projektivisch gleich.*

Bringt man die centrischen Systeme in allgemein collineare Lage, so ergibt sich sofort:

*In zwei collinearen Systemen gibt es zwei Paare paralleler entsprechender Geraden, auf denen die Punktreihen entsprechender Punkte projektivisch gleich sind.*

42. In zwei collinearen Systemen  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  die entsprechend gleichen Punktreihen zu konstruieren.\*)

In der centrischen Lage entspricht der Geraden  $g_\infty$  eine andere  $g$ , welche Gegenaxe genannt wurde; nach der Verschiebung habe  $g$  in den Systemen  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  die Lagen  $r$  und  $q_1$  angenommen. Da  $g$  zur Axe parallel war, so müssen die unendlich fernen Punkte  $R^\infty$  und  $Q_1^\infty$  dieser Geraden einander entsprechen und auf je zwei zu ihnen parallelen entsprechenden Geraden müssen die entsprechenden Punktreihen projektivisch ähnlich sein.

Es gibt zwei entsprechende zu  $r$  und  $q_1$  normale Gerade der collinearen Systeme.

Um sie zu finden, denke man sich auf einer zu  $r$  normalen Geraden den unendlich fernen Punkt  $\mathfrak{R}^\infty$ , so entspricht ihm im

\*) Schroeter, Theorie der Oberflächen II. O. S. 364.



Systeme  $\Sigma_1$  der Punkt  $\mathfrak{Q}_1$ ; dem zu  $q_1$  senkrechten Strahle  $e_1$  des Punktes  $\mathfrak{Q}_1$  entspricht ein durch  $\mathfrak{R}^\infty$  gehender, also zu  $r$  normaler, Strahl  $e$ .

Dem Schnittpunkte  $\mathfrak{Q}_1 = (q_1 e_1)$  entspricht in  $\Sigma$  der Schnittpunkt  $(g_\infty e) = \mathfrak{R}^\infty$  und dem Punkte  $(g_\infty e_1) = \mathfrak{Q}_1^\infty$  von  $\Sigma_1$  entspricht in  $\Sigma$  der Punkt  $(re) = \mathfrak{R}$ .

Zieht man nun in  $\Sigma$  zwei zu  $e$  parallele Gerade  $xx'$  in gleichem Abstände von  $e$ , so sind  $g_\infty exx'$  harmonische Strahlen, also sind die entsprechenden  $q_1 e_1 x_1 x_1'$  in  $\Sigma_1$ , welche durch  $\mathfrak{Q}_1$  gehen, auch harmonisch und da  $\angle (q_1 e_1) = 90^\circ$  ist, so halbieren die Strahlen  $q_1$  und  $e_1$  die von  $x_1$  und  $x_1'$  gebildeten Winkel. — Sind ferner  $y_1 y_1'$  zwei Strahlen in gleichem Abstände von  $e_1$  und zwar demselben, wie  $x$  und  $x'$  von  $e$ , so entsprechen ihnen in  $\Sigma$  zwei gegen  $e$  und  $r$  gleich geneigte Strahlen  $yy'$  durch  $\mathfrak{R}$ .

Die Geraden  $xx'yy'$  und  $x_1 x_1' y_1 y_1'$  schneiden sich in den Ecken zweier entsprechenden Rechtecke der Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$ . Diejenigen entsprechenden Seiten derselben, welche gleich groß sind, sind die gesuchten Geraden.

43. Wenn zwei entsprechende projektivisch gleiche Gerade der collinearen Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  aufeinander fallen, so liegen dieselben perspektivisch.

44. Jedem Kegelschnitte eines von zwei collinearen Systemen entspricht im anderen auch ein Kegelschnitt.

45. Zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  können stets als entsprechend in zwei collinearen Systemen betrachtet werden.

Auf  $K$  seien  $ABCDE$  fünf beliebige Punkte; den drei ersten werden als entsprechend auf  $K_1$  drei Punkte  $A_1 B_1 C_1$  zugewiesen. Auf letzterem sei  $P_1$  ein beliebiger Punkt; man bestimme dann einen Strahl  $p_1$  so, daß

$$(EA, EB, EC, ED) \bar{\wedge} (P_1 A_1, P_1 B_1, P_1 C_1, p_1)$$

ist. Dieser Strahl  $p_1$  schneide  $K$  in  $D_1$ . Ordnet man  $D$  und  $D_1$  einander zu, so ist durch die Beziehung von

$$ABCD \text{ und } A_1 B_1 C_1 D_1$$

aufeinander eine collineare Beziehung hergestellt, in welcher  $K$  und  $K_1$  einander entsprechen müssen.

46. Wenn bei zwei centrisch collinearen Systemen die Collineationsaxe ins Unendliche rückt, so werden je zwei entsprechende Gerade parallel und je zwei entsprechende Dreiecke ähnlich. Die Systeme heißen dann *ähnlich*.

47. Zwei collineare Systeme heißen *affin*, wenn die unend-



lich ferne Gerade sich selbst entspricht (ohne daß ihre Punkte entsprechende sind).

*Zwei affine Systeme sind daher bestimmt durch drei Paare entsprechender Geraden.*

Sind  $abc$  und  $a_1b_1c_1$  die entsprechenden Geraden,  $ABC$  die den Seiten  $abc$  gegenüberliegenden Ecken des Dreiseits  $abc$  und ebenso  $A_1B_1C_1$  diejenigen des Dreiseits  $a_1b_1c_1$ , so sind  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  Paare entsprechender Punkte.

Wird nun  $g_\infty$  von  $abc$  und  $a_1b_1c_1$  in  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1$  geschnitten, so sind auch  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1$  entsprechende Punkte und durch das Entsprechen von  $ABC\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  und  $A_1B_1C_1\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{C}_1$  ist die collineare Beziehung bestimmt. 37.

48. *In affinen Systemen sind entsprechende Punktreihen ähnlich.*

Auf den Geraden  $g$  und  $g_1$  seien  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$  entsprechende Punkte,  $D^\infty$  und  $D_1^\infty$  ihre einander entsprechenden unendlich fernen Punkte; also

$$(ABCD^\infty) \overline{\wedge} (A_1B_1C_1D_1^\infty) \text{ oder } \frac{AC}{BC} : \frac{AD^\infty}{BD^\infty} = \frac{A_1C_1}{B_1C_1} : \frac{A_1D_1^\infty}{B_1D_1^\infty} \text{ und daraus}$$

$$AC : BC = A_1C_1 : B_1C_1 \text{ oder } AC : A_1C_1 = BC : B_1C_1.$$

49. *In affinen Systemen stehen je zwei entsprechende Figuren in konstantem Verhältnisse.*

Es seien  $ABCD$  und  $A_1B_1C_1D_1$ ,  $EFGH$  und  $E_1F_1G_1H_1$  zwei Paare entsprechender Parallelogramme. Die Durchschnitte von

$AB$  mit  $EH$  und  $FG$  sowie von  $CD$  mit  $EH$  und  $FG$  seien  
 $J$  und  $K$  sowie  $M$  und  $L$

Die Punkte  $JKLM$  und die entsprechenden Durchschnittspunkte  $J_1K_1L_1M_1$  der Seiten der Parallelogramme  $A_1B_1C_1D_1$  und  $E_1F_1G_1H_1$  bilden die Ecken entsprechender Parallelogramme. Es verhält sich nun

$$ABCD : JKLM = AB : JK \text{ und}$$

$$A_1B_1C_1D_1 : J_1K_1L_1M_1 = A_1B_1 : J_1K_1$$

weil die Parallelogramme zwischen parallelen Geraden liegen. Da aber nach dem vorigen Satze

$$AB : JK = A_1B_1 : J_1K_1, \text{ so muß auch}$$

$$ABCD : A_1B_1C_1D_1 = JKLM : J_1K_1L_1M_1 \text{ und ebenso}$$

$$EFGH : E_1F_1G_1H_1 = JKLM : J_1K_1L_1M_1$$



sich verhalten, woraus sich ergibt

$$ABCD : EFGH = A_1 B_1 C_1 D_1 : E_1 F_1 G_1 H_1.$$

50. In affinen Systemen kann einer Ellipse nur eine Ellipse, einer Parabel nur eine Parabel, einer Hyperbel nur eine Hyperbel verwandt sein.

51. In affinen Ellipsen und Hyperbeln entsprechen einander die Mittelpunkte, als Pole der sich selbst entsprechenden unendlich fernen Geraden, und daher auch die Durchmesser.

52. Zwei affine Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  sind durch drei Paare entsprechender Punkte gegeben; man soll zu einer beliebigen Geraden die entsprechende Gerade und zu einem beliebigen Punkte den entsprechenden Punkt konstruieren.

Die gegebenen Paare entsprechender Punkte seien  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ .

Um zur Geraden  $g$  von  $\Sigma$  die entsprechende Gerade  $g_1$  von  $\Sigma_1$  zu konstruieren, schneide man  $AB$  und  $AC$  mit  $g$  in  $D$  und  $E$  und konstruiere auf  $A_1B_1$  und  $A_1C_1$  die entsprechenden Punkte  $D_1$  und  $E_1$  so, daß

$$AD : BD = A_1D_1 : B_1D_1 \text{ und } AE : CE = A_1E_1 : C_1E_1.$$

dann ist  $D_1E_1$  die verlangte Gerade  $g_1$ .

Soll nun zum Punkte  $P$  der entsprechende Punkt  $P_1$  gefunden werden, so schneide man  $AB$  und  $AC$  mit  $PC$  und  $PB$  in  $\mathfrak{C}$  und  $\mathfrak{B}$ , konstruiere zu diesen Punkten die entsprechenden Punkte  $\mathfrak{C}_1$  und  $\mathfrak{B}_1$ , so schneiden sich  $C_1\mathfrak{C}_1$  und  $B_1\mathfrak{B}_1$  in  $P_1$ .

53. Ein Kegelschnittbüschel, von welchem zwei Kegelschnitte gegeben sind, enthalte einen Kreis; man soll ihn konstruieren.

Eine Gerade  $g$  wird von den Kegelschnitten des Büschels in einer Involution geschnitten; es sei  $Q$  der Centralpunkt und  $q^2$  die Potenz der Involution. Beschreibt man um  $Q$  mit  $q$  einen Kreis, so wird dieser von dem gesuchten entweder rechtwinklig oder unter dem Durchmesser geschnitten. Wiederholt man diese Konstruktion dreimal, so ist die Aufgabe auf eine einfache Kreiskonstruktion zurückgeführt.

54. Einen Kegelschnitt durch harmonische Verwandtschaft in sich selbst zu verwandeln, so daß zwei konjugierte Durchmesser in die beiden Axen verwandelt werden.

Die konjugierten Durchmesser seien  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ , die beiden Axen  $AA_1$  und  $BB_1$ .



Man gelangt zur gewünschten Verwandtschaft, wenn man den zu einer der vier Sehnen

$$A\mathfrak{U}, A\mathfrak{U}_1, B\mathfrak{U}, B\mathfrak{U}_1$$

konjugierten Durchmesser als Axe und seinen unendlich entfernten Pol als Centrum nimmt.

55. Ein Kegelschnittbüschel durch harmonische Verwandtschaft in ein anderes zu verwandeln, welches einen Kreis und einen Kegelschnitt des ersten Büschels enthält.\*)

Wenn ein Kegelschnittbüschel einen Kreis enthalten soll, so sind die Axen aller seiner Kegelschnitte zwei festen Richtungen parallel, nämlich den Hauptaxen der beiden im Büschel vorkommenden Parabeln. Der Mittelpunktskegelschnitt hat also zwei im Unendlichen in normalen Richtungen liegende Punkte und ist daher eine gleichseitige Hyperbel.

Es seien nun  $KK'K'' \dots$  Kegelschnitte des gegebenen Büschels und  $M$  der Mittelpunktskegelschnitt desselben. Falls in dem Büschel, was hier angenommen werden soll, eine Ellipse vorkommt, so enthält es unendlich viele Ellipsen und die Involution, in welcher die unendlich ferne Gerade von den Kegelschnitten des Büschels geschnitten wird, hat zwei Doppelpunkte. Da diese Involution mit der Polarinvolution in Bezug auf  $M$  identisch ist, so hat  $M$  auf  $g_\infty$  zwei reelle Punkte und ist eine Hyperbel. (401. 414.) In jedem Kegelschnitte des Büschels giebt es ein Paar konjugierter Durchmesser, welches diesen Asymptoten parallel ist.

Der Mittelpunkt von  $K$  sei  $O$ ; die beiden zu den Asymptoten von  $M$  parallelen konjugierten Durchmesser von  $K$  seien  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ ; die Axen von  $K$  seien  $AA_1$  und  $BB_1$ .

Man verwandle nun nach 54. durch harmonische Verwandtschaft  $K$  in sich selbst,  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  in  $AA_1$  und  $BB_1$ ,  $K'K'' \dots$  in die Kegelschnitte  $\mathfrak{K}'\mathfrak{K}'' \dots$ . Weil  $g_\infty$  sich selbst verwandt ist, (denn das Centrum der Verwandtschaft liegt im Unendlichen), so ist jedem Kegelschnittsmittelpunkte des Büschels ( $KK' \dots$ ) ein Kegelschnittsmittelpunkt im Büschel ( $K\mathfrak{K}' \dots$ ), also dem Mittelpunktskegelschnitt  $M$  des ersten Büschels der Mittelpunktskegelschnitt  $\mathfrak{M}$  des zweiten verwandt. Den Asymptoten von  $M$  sind diejenigen von  $\mathfrak{M}$  verwandt und da die ersteren zu  $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$  parallel sind, so müssen die letzteren den verwandten Axen  $AA_1$  und  $BB_1$  parallel, also rechtwinklig sein, folglich muß  $\mathfrak{M}$  eine gleichseitige Hyperbel sein und das Büschel ( $K\mathfrak{K}' \dots$ ) enthält einen Kreis.

\*) Kortum. Über geometrische Aufgaben III. und IV. Grades.



56. Ein Kegelschnitt  $K$  ist durch fünf Punkte  $ABCDE$  gegeben, man soll seine Schnittpunkte mit einem gezeichnet vorliegenden Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , allein mit Zirkel und Lineal, konstruieren.

Man stelle eine solche Verwandtschaft her (55), daß  $K$  sich selbst verwandt ist und das dem Büschel  $(K\mathfrak{K} \dots)$  verwandte Büschel einen Kreis  $O$  enthält. Diesen Kreis konstruiere man (53), und suche zu seinen Schnittpunkten mit  $\mathfrak{K}$  die verwandten Punkte, so sind es die Schnittpunkte von  $K$  und  $\mathfrak{K}$ .

57. Zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  sind durch hinreichende Bestimmungsstücke gegeben, außerdem giebt es einen gezeichnet vorliegenden Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ . Man soll die Schnittpunkte von  $K$  und  $K_1$  mit Hilfe von Zirkel und Lineal und mit Benutzung von  $\mathfrak{K}$  konstruieren.

Man stelle eine collineare Beziehung her, in welcher dem Kegelschnitte  $K$  der gezeichnet vorliegende Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  und dem Kegelschnitte  $K_1$  ein anderer  $K_1'$  entspricht; die den Schnittpunkten von  $\mathfrak{K}$  und  $K_1'$  collinear entsprechenden Punkte sind die gesuchten Schnittpunkte von  $K$  und  $K_1$ .

58. Die gemeinschaftlichen Sekanten zweier gezeichnet vorliegenden Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$  mit Benutzung von Zirkel und Lineal, zu konstruieren.

$K$  und  $K_1$  sollen keine gemeinschaftlichen Punkte haben; sie besitzen deshalb ein reelles gemeinschaftliches Poldreieck  $ABC$  und dieses kann man mit Hilfe von 57. konstruieren.

Es seien  $g$  und  $g_1$  zwei beliebige Gerade; ihre Polarkegelschnitte  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$  gehen durch  $ABC$  und treffen sich noch in einem vierten Punkte  $D$ , der dem Schnittpunkte  $(gg_1)$  in Bezug auf  $K$  und  $K_1$  konjugiert ist.

Man konstruiere nach 57. die Schnittpunkte von  $\mathfrak{K}$  und  $\mathfrak{K}_1$ . Von diesen Schnittpunkten liegt der eine, etwa  $A$ , außerhalb beider Kegelschnitte. Man konstruiere nun irgend zwei bezüglich beider Kegelschnitte konjugierte Punkte  $B_1$  und  $C_1$ , so sind die Doppelstrahlen der durch die Strahlenpaare  $AB$ ,  $AC$  und  $AB_1$ ,  $AC_1$  bestimmten Involution die gesuchten gemeinschaftlichen Sekanten.

59. Die gemeinschaftlichen Tangenten zweier gezeichnet vorliegenden Kegelschnitte zu konstruieren.

60. Zwei Kegelschnitte  $K$  und  $K_1$ , die keinen reellen Schnittpunkt haben sollen, sind durch die Punktgruppen  $ABCDE$  und



$A_1 B_1 C_1 D_1 E_1$  bestimmt; man soll ihre gemeinschaftlichen Sekanten nur mit Hilfe von Zirkel und Lineal und eines gezeichnet vorliegenden Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$  konstruieren.

Man konstruiere wie in 58. das gemeinschaftliche Poldreieck und mittelst desselben die gemeinschaftlichen Sekanten.

\*61. Die sich selbst entsprechenden Punkte zweier collinearen Systeme  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$  zu konstruieren.

Im Punkte  $A$  sei ein Strahlenbüschel; ihm entspricht im Punkte  $A_1$  ein projektivisches, welches mit jenem einen Kegelschnitt  $K$  erzeugt. Zählt man diesen zu  $\Sigma$ , so entspricht ihm in  $\Sigma_1$  ein Kegelschnitt  $K_1$ , der durch  $A_1$  gehen muß und daher im Allgemeinen mit  $K$  noch drei Schnittpunkte hat. Jeder von ihnen entspricht sich selbst.

\*62. Durch die Scheitel  $P$  und  $P_1$  zweier projektivischen Strahlenbüschel  $P (abcd \dots)$  und  $P_1 (a_1 b_1 c_1 d_1 \dots)$  lege man einen Kegelschnitt  $K$ ; diesen schneiden die projektivischen Büschel in den *krumm-projektivischen Punktreihen*  $ABCD$  und  $A_1 B_1 C_1 D_1 \dots$ .

Die Büschel  $A (A_1 B_1 C_1 D_1 \dots)$  und  $A_1 (ABCD \dots)$  sind projektivisch und in perspektivischer Lage; sie erzeugen daher eine Gerade  $p$ . In dem Sechsecke  $AB_1 CA_1 BC_1$  liegen die Schnittpunkte

$$(AB_1, A_1 B), (B_1 C, BC_1), (CA_1, AC_1)$$

in einer Geraden, die mit  $p$  zusammenfällt. Daher erzeugen die perspektivischen Büschel  $B (A_1 B_1 C_1 \dots)$  und  $B (ABC \dots)$  dieselbe Gerade  $p$ . Diese hängt somit allein von der Lage der beiden Punktreihen ab. Sie heißt die *Richtungslinie* derselben; wenn sie den Kegelschnitt  $K$  in reellen Punkten  $M$  und  $N$  trifft, so entsprechen diese sich in den krumm-projektivischen Punktreihen selbst und heißen die *Doppelpunkte* derselben.

Es sei  $S$  der Schnittpunkt von  $AB_1$  und  $BA_1$ , er liegt auf  $p$ . Dann muß die Verbindungslinie der Schnittpunkte  $(AA_1, BB_1)$  und  $(AB, A_1 B_1)$  durch den Pol  $P$  von  $p$  in Bezug auf  $K$  gehen.

63. Die Verbindungslinien entsprechender Punkte zweier krumm-projektivischen Punktreihen auf einem Kegelschnitte  $K$  hüllen einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  ein, welcher den ersten doppelt berührt.

Die projektivischen Punktreihen auf  $K$  seien

$$ABC \dots \text{ und } A_1 B_1 C_1 \dots$$

Man verbinde irgend einen Punkt  $Q$  mit  $ABC \dots$  und schneide den Kegelschnitt  $K$  mit den Verbindungslinien in  $A_2 B_2 C_2 \dots$ , so ist

$$(A_2 B_2 C_2 \dots) \overline{\wedge} (ABC \dots) \overline{\wedge} (A_1 B_1 C_1 \dots)$$



Sind  $M_{12}$  und  $N_{12}$  die Doppelpunkte der krumm-projektivischen Punktreihen  $A_1B_1C_1 \dots$  und  $A_2B_2C_2 \dots$ , so sind  $QM_{12}$  und  $QN_{12}$  die einzigen Geraden durch  $Q$ , welche entsprechende Punkte der beiden Punktreihen verbinden. Daher ist der Ort der Verbindungslinien ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ .

Liegt  $Q$  auf der Richtungslinie  $p$  und treffen die Tangenten durch  $Q$  an  $\mathfrak{K}$  den Kegelschnitt  $K$  in den Punktpaaren  $EE_1$  und  $FF_1$ , so muß der Schnittpunkt  $\mathfrak{Q}$  von  $EF_1$  und  $E_1F$  auf  $p$  liegen und die Geraden  $EF$  und  $E_1F_1$  müssen sich im Pole  $P$  von  $p$  bezüglich  $K$  schneiden.

Da aber die Tangenten  $QE$  und  $QF$  durch  $p$  und  $QP$  harmonisch getrennt sind, so muß der Pol von  $p$  in Bezug auf  $\mathfrak{K}$  auf  $QP$  liegen und da dies für jeden Punkt  $Q$  von  $p$  gilt, mit  $P$  zusammenfallen. Somit ist  $P\mathfrak{Q}$  die Polare von  $Q$  bezüglich beider Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$ .

Wenn aber ein Paar von Pol und Polare,  $P$  und  $p$ , in Bezug auf zwei Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$  die Eigenschaft hat, daß die Polaren eines jeden Punktes von  $p$  bezüglich beider Kegelschnitte zusammenfallen, so sagt man, *die Kegelschnitte sind in doppelter Berührung*. Diese ist *reell*, wenn die Gerade  $p$  den Kegelschnitt  $K$  trifft, sonst *imaginär*.

\*64. Sind zwei Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$  in doppelter Berührung, so schneidet eine veränderliche Tangente des einen den anderen in den Punktpaaren zweier krumm-projektivischen Punktreihen.

\*65. An die Träger  $g$  und  $g_1$  zweier projektivischen Punktreihen  $ABCD \dots$  und  $A_1B_1C_1D_1 \dots$  lege man einen Kegelschnitt  $K$  und an ihn von  $ABCD \dots$  und  $A_1B_1C_1D_1 \dots$  die Tangenten  $abcd \dots$  und  $a_1b_1c_1d_1 \dots$ , so bilden diese auf  $K$  zwei *krumm-projektivische Strahlenbüschel*.

\*66. Die Schnittpunkte entsprechender Strahlen zweier krumm-projektivischen Strahlenbüschel auf einem Kegelschnitte  $K$  liegen auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , welcher den ersten doppelt berührt.

\*67. Zieht man von einem veränderlichen Punkte eines von zwei sich doppelt berührenden Kegelschnitten Tangenten an den anderen, so bilden sie die Strahlenpaare zweier krumm-projektivischen Strahlenbüschel.

\*68. In einen Kegelschnitt  $K$  ein Dreieck zu zeichnen, dessen Seiten durch drei feste Punkte  $UVW$  gehen.

Eine Gerade  $g$  durch  $U$  schneide  $K$  in  $A$  und  $B$ , die Gerade  $VB$  treffe  $K$  in  $C$  und  $CW$  treffe  $K$  in  $A_1$ , dann durchlaufen



$A$  und  $A_1$  bei der Drehung von  $g$  um  $U$  zwei krumm-projektivische Punktreihen. Sind  $M$  und  $M'$  die Doppelpunkte derselben, so schneide man  $K$  mit  $UM$  in  $N$ , mit  $VN$  in  $O$ , mit  $WO$  in  $M$  und  $MNO$  ist ein Dreieck von der verlangten Beschaffenheit.

\*69. In einen Kegelschnitt  $K$  ein  $n$ -Eck zu zeichnen, dessen Seiten der Reihe nach durch  $n$  feste Punkte gehen.

\*70. Um einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  ein Dreieck zu zeichnen, dessen Ecken der Reihe nach auf drei festen Geraden liegen.

\*71. Um einen Kegelschnitt ein  $n$ -Eck zu zeichnen, dessen Ecken der Reihe nach auf  $n$  festen Geraden liegen.

\*72. Gegeben sind zwei Dreiecke  $ABC$  und  $A_1B_1C_1$ ; man soll um das erste ein Dreieck zeichnen, welches dem zweiten eingeschrieben ist.

Eine beliebige Gerade  $g$  durch  $A$  schneide  $B_1C_1$  in  $A'$ ,  $BA'$  schneide  $A_1C_1$  in  $B'$ ,  $B'C$  schneide  $A_1B_1$  in  $C'$  und endlich schneide  $C'A$  die Seite  $B_1C_1$  in  $A_1'$ , dann durchlaufen bei der Drehung von  $g$  um  $A$  die Punkte  $A'$  und  $A_1'$  zwei projektivische Punktreihen auf  $B_1C_1$ . Ist  $M$  ein reeller Doppelpunkt derselben und schneidet man  $A_1C_1$  mit  $BM$  in  $N$ ,  $A_1B_1$  mit  $CN$  in  $O$ , so muß  $MO$  durch  $A$  gehen.

\*73. Gegeben sind zwei  $n$ -Ecke; man soll ein  $n$ -Eck zeichnen, welches dem ersten um- und dem zweiten eingeschrieben ist.

\*74. An einer Bande eines rechteckigen Billards steht ein Ball; man soll ihn so stoßen, daß er an allen übrigen Banden abprallt und in seine Anfangsstellung zurückkehrt.

\*75. Ein  $n$ -Eck zu zeichnen, daß einem anderen  $n$ -Ecke gleichzeitig ein- und umgeschrieben ist.

Das gegebene  $n$ -Eck sei  $A_1A_2A_3 \dots A_{n-1}A_n$ . Man projiciere die Punkte von  $A_2A_3$  aus  $A_1$  auf  $A_3A_4$ , diese aus  $A_2$  auf  $A_4A_5$ , diese aus  $A_3$  auf  $A_5A_6$ , ..., diejenigen von  $A_{n-1}A_n$  aus  $A_{n-2}$  auf  $A_nA_1$ , letztere aus  $A_{n-1}$  auf  $A_1A_2$  und diese endlich aus  $A_n$  auf  $A_2A_3$ , so erhält man auf  $A_2A_3$  zwei projektivische Punktreihen, deren Doppelpunkte die Aufgabe lösen.

\*76. Die vorige Aufgabe läßt beim Vierecke keine Lösung zu. \*)

Es sei  $ABCD$  das gegebene Viereck. Man projiziere die Punkte von  $BC$  aus  $A$  auf  $CD$ , die Projectionen aus  $B$  auf  $AD$ , deren Projectionen aus  $C$  auf  $AB$  und diese endlich aus  $D$  auf  $BC$ ; man erhält dann auf  $BC$  zwei projektivische Punktreihen. Schneiden sich  $AD$  und  $BC$  in  $E$ , so entsprechen

den Punkten  $BCE$  die Punkte  $EBC$ .

---

\*) Pfaff. Neuere Geometrie. II. Teil. Seite 48 und 50.



Durchläuft also ein Punkt der ersten Reihe in der durch  $BCE$  bestimmten Richtung die Gerade  $BC$ , so bewegt sich der entsprechende Punkt in der Richtung  $EBC$ . Der zweite Punkt kann also nie den ersten treffen.

\*77. Die Aufgabe 75. läßt beim Fünfecke unendlich viele Lösungen zu.

Um dieses zu beweisen, projiziere man stets zwei solche Seiten aufeinander, die durch eine andere Seite getrennt sind, also aus den Ecken  $A, C, E, B, D$  die Seite  $BC$  auf  $DE$ ,  $DE$  auf  $AB$ ,  $AB$  auf  $CD$ ,  $CD$  auf  $AE$ ,  $AE$  auf  $BC$ , so erhält man auf  $BC$  zwei projektivische Punktreihen. In diesen entsprechen sich  $B, C$  und der Schnittpunkt  $F$  von  $BC$  und  $DE$  selbst, also sind die Punktreihen identisch und jeder Punkt entspricht sich selbst. Es löst also jeder Punkt von  $BC$  die Aufgabe.

\*78. Einem Vierecke ein Rechteck einzuschreiben, dessen eine Seite durch einen gegebenen Punkt geht.

\*79. Man soll durch einen Punkt  $P$  zwei solche Gerade ziehen, daß sie auf zwei gegebenen Geraden  $g$  und  $g_1$  die Strecken  $s$  und  $s_1$  abschneiden.

\*80. Auf einer festen Geraden eine solche Strecke zu bestimmen, daß sie aus zwei festen Punkten unter bestimmten Winkeln gesehen wird.

\*81. Durch einen Punkt eine solche Gerade zu legen, daß sie ein gegebenes Dreieck nach einem bestimmten Verhältnisse teilt.

\*82. In zwei projektivischen Strahlenbüscheln die Schenkel der entsprechenden rechten Winkel zu konstruieren.

83. *Salmon'sche Erzeugungsart des Kegelschnittes.*

Wenn man in den Scheiteln  $A$  und  $A_1$  der Hauptaxe eines Kegelschnittes  $K$  die Tangenten  $a$  und  $a_1$  zieht, diese mit einer dritten Tangente  $b$  in  $B$  und  $B_1$  schneidet, ferner  $B$  mit den Brennpunkten  $F$  und  $F_1$  durch die Geraden  $x$  und  $x_1$  und ebenso  $B_1$  mit denselben durch  $y$  und  $y_1$  verbindet, so ist

$$1. \sphericalangle(ax) = \sphericalangle(bx_1), \quad 2. \sphericalangle(xy) = \sphericalangle(x_1y_1) = 90^\circ,$$

also stehen die Doppelstrahlen  $mn$  der Involution  $ab, xx_1$  auf einander senkrecht.

Man polarisiere die Figur in Bezug auf einen beliebigen Kreis mit dem Mittelpunkte  $\mathfrak{O}$  und bezeichne die polaren Stücke mit deutschen Buchstaben.

Die Polarfigur von  $K$  ist ein Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ ;  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}\mathfrak{X}\mathfrak{X}_1\mathfrak{Y}\mathfrak{Y}_1\mathfrak{M}\mathfrak{N}$  seien die Pole von  $aa_1bxx_1yy_1mn$ , dann bestimmen  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{X}\mathfrak{X}_1$ ,



auch eine Involution, deren Doppelpunkte  $\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{N}$  sind. — Da  $m$  und  $n$  auf einander senkrecht stehen, so müssen dies auch  $\mathfrak{D}\mathfrak{M}$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{N}$  thun; daher halbieren diese Geraden die Winkel  $\mathfrak{A}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{K}\mathfrak{D}\mathfrak{K}_1$  und es ist

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D} : \mathfrak{B}\mathfrak{D} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{N} : \mathfrak{B}\mathfrak{N}.$$

Aus den Eigenschaften der Involution folgt:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{M}^2 : \mathfrak{B}\mathfrak{M}^2 = \mathfrak{A}\mathfrak{K} . \mathfrak{A}\mathfrak{K}_1 : \mathfrak{B}\mathfrak{K} . \mathfrak{B}\mathfrak{K}_1$$

also auch 
$$\mathfrak{A}\mathfrak{D}^2 : \mathfrak{B}\mathfrak{D}^2 = \mathfrak{A}\mathfrak{K} . \mathfrak{A}\mathfrak{K}_1 : \mathfrak{B}\mathfrak{K} . \mathfrak{B}\mathfrak{K}_1.$$

Sind  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$  die Polaren von  $F$  und  $F_1$ , ferner  $\mathfrak{A}\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{D}$  senkrecht auf  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{A}\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{B}\mathfrak{D}_1$  senkrecht auf  $\mathfrak{f}_1$ , so ist auch

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D}^2 : \mathfrak{B}\mathfrak{D}^2 = \mathfrak{A}\mathfrak{P} . \mathfrak{A}\mathfrak{P}_1 : \mathfrak{B}\mathfrak{D} . \mathfrak{B}\mathfrak{D}_1 \text{ oder}$$

$$\frac{\mathfrak{A}\mathfrak{D}^2}{\mathfrak{A}\mathfrak{P} . \mathfrak{A}\mathfrak{P}_1} = \frac{\mathfrak{B}\mathfrak{D}^2}{\mathfrak{B}\mathfrak{D} . \mathfrak{B}\mathfrak{D}_1}$$

Bewegt sich nun die Tangente  $b$  auf  $K$ , so durchläuft ihr Pol den Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  so, daß der Quotient  $\mathfrak{B}\mathfrak{D}^2 : \mathfrak{B}\mathfrak{D} . \mathfrak{B}\mathfrak{D}_1$  konstant bleibt. Daraus folgt:

*Der Ort eines Punktes, für welchen das Quadrat seines Abstandes von einem festen Punkte zum Produkte seiner Entfernungen von zwei festen Geraden in einem konstanten Verhältnisse steht, ist ein Kegelschnitt.*

Da die senkrechten Strahlen  $xy$  in  $F$  sowie  $x_1y_1$  in  $F_1$  konjugierte Strahlen in Bezug auf  $K$  sind, so müssen die senkrechten Geraden  $\mathfrak{D}\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{Y}$ , sowie  $\mathfrak{D}\mathfrak{X}_1$  und  $\mathfrak{D}\mathfrak{Y}_1$  die Geraden  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$  in konjugierten Punktpaaren bezüglich des Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$  schneiden.

Es gilt nun auch die Umkehrung:

*Sind  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$  zwei solche Gerade, deren Polarinvolutionen (konjugierter Punkte) bezüglich eines Kegelschnittes  $\mathfrak{K}$  von einem Punkte  $O$  durch eine circulare Involution projiziert werden, so steht das Quadrat des Abstandes eines Kegelschnittpunktes von  $O$  zum Produkte seiner Abstände von  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$  in einem konstanten Verhältnisse.*

84. Gegeben ein Punkt  $O$  und zwei Gerade  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$ ; man soll einen Punkt  $P$  konstruieren, so daß das Quadrat seines Abstandes von  $O$  zum Produkte seiner Entfernungen von  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$  in einem bestimmten Verhältnisse  $\mu$  steht.

Sind  $PQ$  und  $PQ_1$  die Abstände des Punktes  $P$  von  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$ , also  $PO^2 : PQ . PQ_1 = \mu$ , so zerlege man  $\mu$  in  $\mu_1 . \mu_2$  und konstruiere  $P$  als Durchschnitt der Örter, für welche  $PO : PQ = \mu_1$  und  $PO : PQ_1 = \mu_2$  ist. Diese Örter sind zwei Kegelschnitte mit dem gemeinschaftlichen Brennpunkte  $P$  und den Leitlinien  $\mathfrak{f}$  und  $\mathfrak{f}_1$ .



85. Verbindet man die Punktpaare  $AA_1, BB_1, CC_1, \dots$  einer Punktinvolution auf der Geraden  $g$  mit zwei festen Punkten  $P$  und  $P'$  durch die Strahlenpaare

$$aa_1, bb_1, cc_1, \dots \text{ und } a'a'_1, b'b'_1, c'c'_1, \dots$$

so liegen die Schnittpunkte

$$\mathfrak{A} \text{ und } \mathfrak{A}_1, \mathfrak{B} \text{ und } \mathfrak{B}_1, \mathfrak{C} \text{ und } \mathfrak{C}_1, \dots \text{ von} \\ aa'_1 \text{ und } a'a_1, bb'_1 \text{ und } b'b_1, cc'_1 \text{ und } c'c_1, \dots$$

auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ .

Ist  $Q_0$  der Schnittpunkt von  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$  und  $P_0$  derjenige von  $g$  mit  $PP'$ , so sind  $PP'$  durch  $Q_0P_0$  harmonisch getrennt und die Geraden  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}\mathfrak{C}_1, \dots$  müssen durch  $Q_0$  gehen.

Aus den Eigenschaften der vollständigen Vierseite

$$AA_1\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1PP' \text{ und } BB_1\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1PP'$$

folgt, daß die Punktpaare  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}\mathfrak{B}_1, PP'$  durch  $Q_0$  und  $g$  harmonisch getrennt sind. Es liegen also  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1PP'$  auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , in Bezug auf welchen  $Q_0$  und  $g$  Pol und Polare sind. Daher liegen  $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_1, \dots$  auch auf diesem Kegelschnitte.

86. Gegeben sind zwei Strahleninvolutionen mit den Scheiteln  $S$  und  $S_1$ ; man soll eine solche Gerade suchen, welche von beiden in derselben Punktinvolution geschnitten wird.

I. In einer harmonischen Verwandtschaft, in welcher  $SS_1$  die Mittellinie ist, sind den Involutionen zwei andere verwandt, deren Scheitel  $\mathfrak{S}$  und  $\mathfrak{S}_1$  im Unendlichen liegen. Es seien  $\mathfrak{s}$  und  $\mathfrak{s}_1$  diejenigen Strahlen, welche dem gemeinsamen Strahle  $\mathfrak{S}\mathfrak{S}_1 = g_\infty$  involutorisch zugeordnet sind. Von jedem der beiden Büschel wird jede Gerade in einer Involution geschnitten, deren Centralpunkt auf  $\mathfrak{s}$  resp.  $\mathfrak{s}_1$  liegt. Durch den Schnittpunkt  $\mathfrak{A}$  von  $\mathfrak{s}$  und  $\mathfrak{s}_1$  seien  $\alpha$  und  $\alpha_1$  diejenigen Geraden, welche auf  $\mathfrak{s}$  bezüglich  $\mathfrak{s}_1$  senkrecht stehen. Die Involutionen auf ihnen mögen die Potenzen  $P_\alpha$  und  $P_{\alpha_1}$  haben; bilden  $\mathfrak{s}$  und  $\mathfrak{s}_1$  den Winkel  $\sigma$  und bestimmt man einen Winkel aus der Gleichung

$$\frac{\sin x}{\sin (\sigma - x)} = \sqrt{\frac{P_\alpha}{P_{\alpha_1}}}$$

so ist die Gerade durch  $\mathfrak{A}$ , welche gegen  $\mathfrak{s}$  unter dem Winkel  $x$  geneigt ist, eine solche, daß die Involutionen, in denen sie von den Strahleninvolutionen  $\mathfrak{S}$  und  $\mathfrak{S}_1$  geschnitten wird, zusammenfallen. Die harmonisch verwandte Gerade ist die gesuchte.



II. Dem gemeinsamen Strahle  $s_0 = SS_1$  entsprechen  $s'$  und  $s_1'$  in den Involutionen; man suche in beiden diejenigen Strahlenpaare  $aa'$  und  $a_1a_1'$ , so daß

$$s_0s'a'a' \text{ und } s_0s_1'a_1a_1'$$

harmonisch sind, dann sind die Geraden, welche die Schnittpunkte

$$(s's_1'), (aa_1), (a'a_1') \text{ oder } (s's_1'), (aa_1'), (a_1a')$$

verbinden, die gesuchten.

87. Auf einem Kegelschnitte  $K$  seien  $AA_1$  zwei feste Punkte, außerdem sei  $P$  ein beliebiger dritter fester Punkt, der nicht auf  $K$  liegt. Um  $P$  drehe sich eine veränderliche Gerade  $p$ , welche  $K$  in  $QQ_1$  schneidet, dann durchlaufen die Schnittpunkte  $\Omega\Omega_1$  von  $AQ$  und  $A_1Q_1$ ,  $AQ_1$  und  $A_1Q$  einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$ .

I. Wenn  $p$  die Gerade  $AA_1$  in  $Q_0$  schneidet, so ist  $\Omega\Omega_1$  die Polare von  $Q_0$  in Bezug auf  $K$ , also schneiden sich bei der Drehung von  $p$  um  $P$  die Geraden  $\Omega\Omega_1$  im Pole  $\mathfrak{P}$  von  $AA_1$  für  $K$ .

Es sei  $p'$  eine andere Lage von  $p$  und sind  $Q'Q_1'$  ihre Schnittpunkte mit  $K$ ,  $\Omega'\Omega_1'$  die Schnittpunkte von  $AQ'$  und  $A_1Q_1'$ ,  $A_1Q'$  und  $AQ_1'$ . In dem Sechsecke

$$A\Omega\Omega_1A_1\Omega_1'\Omega'$$

seien  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{N}$ ,  $\mathfrak{P}$  die Schnittpunkte von  $A\Omega$  und  $A_1\Omega_1'$ ,  $A_1\Omega_1$  und  $A\Omega'$ ,  $\Omega\Omega_1$  und  $\Omega'\Omega_1'$ .

Da man  $A\Omega$  mit  $AQ$ ,  $A_1\Omega_1'$  mit  $A_1Q'$ ,  $A_1\Omega_1$  mit  $A_1Q$ ,  $A\Omega'$  mit  $AQ'$  verwechseln kann,  $AQ$  und  $A_1Q'$  sowie  $A_1Q$  und  $AQ'$  sich auf der Polare des Schnittpunktes von  $AA_1$  und  $QQ'$  schneiden, auf dieser Polare aber auch der Pol  $\mathfrak{P}$  von  $AA_1$  liegt, so ist  $A\Omega\Omega_1A_1\Omega_1'\Omega'$  ein Pascalsches Sechseck. Seine sechs Ecken liegen auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ .

Es mag  $\Omega\Omega_1$  die Gerade  $AA_1$  in  $\Omega_0$  schneiden, dann ist  $QQ_1$  die Polare von  $\Omega_0$  in Bezug auf  $\mathfrak{K}$  und deshalb  $P$  der Pol von  $AA_1$  für  $\mathfrak{K}$ .

Wenn  $p'$  in die Lage  $p''$  gelangt,  $\Omega'\Omega_1'$  in die Lage  $\Omega''\Omega_1''$  kommen, so liegen auch die sechs Punkte

$$A\Omega\Omega_1A_1\Omega_1''\Omega''$$

auf einem Kegelschnitte, in Bezug auf welchen auch  $P$  und  $AA_1$  Pol und Polare sind; deshalb fällt dieser Kegelschnitt mit  $\mathfrak{K}$  zusammen und alle Punkte  $\Omega\Omega_1$  liegen auf demselben.

87a. Mit Hilfe der Aufgabe 86. hat man folgenden Beweis



für 87, falls  $P$  innerhalb des Kegelschnittes liegt, die Involutionen also keine Doppelstrahlen haben.

Man schneide die beiden Involutionen in  $A$  und  $A_1$  durch diejenige Gerade  $g$ , welche von beiden in derselben Punktinvolution geschnitten wird, suche diejenigen beiden Punkte  $O$  und  $O'$ , welchen alle Segmente zwischen den Punktpaaren der Involution auf  $g$  unter rechten Winkeln erscheinen, so sind in einer harmonischen Verwandtschaft mit den Centrum  $O$  und der Mittellinie  $g$  den Involutionen  $(A)$  und  $(A_1)$  zwei cirkulare Involutionen verwandt und der Kurve der Schnittpunkte  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  ist ein Kreis verwandt, also ist diese Kurve ein Kegelschnitt.

87b. Wenn die Involutionen Doppelstrahlen haben, so ergibt sich der Beweis auf folgende einfache Art.

Da in diesem Falle  $P$  außerhalb des Kegelschnittes  $K$  liegt, so lassen sich von  $P$  zwei Tangenten  $PM$  und  $PN$  an  $K$  ziehen und  $A(MNQQ_1)$  sowie  $A_1(MNQQ_1)$  und deshalb auch  $A(MN\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1)$  sowie  $A_1(MN\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1)$  sind je vier harmonische Strahlen, also liegen  $AA_1MN\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$ , für welchen, wie sich unmittelbar aus der Konstruktion ergibt,  $P$  und  $AA_1$  Pol und Polare sind. Ändern sich  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1$  in  $\mathfrak{D}'\mathfrak{D}'_1$ , so liegen auch  $AA_1MN\mathfrak{D}'\mathfrak{D}'_1$  auf einem Kegelschnitt  $\mathfrak{K}'$ , für welchen  $P$  und  $AA_1$  Pol und Polare sind, der also mit  $\mathfrak{K}$  zusammenfällt.

\*87c. Mit Zuhilfenahme projektivischer Beziehungen ergibt sich folgender Beweis:

Aus der involutorischen Eigenschaft folgt

$$A(Q \dots Q_1 \dots) \frown A(Q_1 \dots Q \dots) \frown A_1(Q_1 \dots Q \dots),$$

also liegen  $\mathfrak{D}\mathfrak{D}_1 \dots$  mit  $AA_1$  auf einem Kegelschnitte.

88. Alle durch  $P$  und  $\mathfrak{P}$  gezogenen Sehnen eines der beiden Kegelschnitte  $K$  und  $\mathfrak{K}$  werden durch den anderen harmonisch geteilt.

89. Ist  $M(aa_1bb_1cc_1 \dots)$  eine Involution und fällt man aus einem Punkte  $P$  auf  $a$  die Senkrechte  $\alpha$  und bringt sie in  $A$  mit  $a_1$  zum Durchschnitte, so durchläuft  $A$  einen Kegelschnitt, wenn  $a$  das involutorische Büschel durchläuft.

Die Fußpunkte der Senkrechten aus  $P$  auf  $a$  und  $a_1$ ,  $b$  und  $b_1$ ,  $\dots$  seien  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\dots$  und liegen auf einem Kreise mit dem Durchmesser  $MP$ ; diese Senkrechten selbst bilden eine Involution und daher treffen sich die Geraden  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}\mathfrak{B}_1$ ,  $\dots$  in einem Punkte  $\mathfrak{P}$  und folglich ist nach 87. der Ort des Punktes  $A$  ein Kegelschnitt.



90. *Das Normalenproblem.*

Ist  $M(aa_1bb_1cc_1 \dots)$  die Involution konjugierter Durchmesser eines Kegelschnittes  $K$ , fällt man aus einem beliebigen Punkte  $P$  die Senkrechten auf  $abc \dots$  und bringt sie mit  $a_1b_1c_1 \dots$  in  $ABC \dots$  zum Durchschnitte, so liegen diese Punkte auf einer gleichseitigen Hyberbel  $\mathfrak{R}$ , welche  $K$  in solchen Punkten schneidet, daß ihre Verbindungslinien mit  $P$  die Normalen von  $P$  sind.

Sei  $Q$  einer der Schnittpunkte von  $K$  und  $\mathfrak{R}$ ,  $q_1$  der durch ihn gehende und  $q$  der konjugierte Durchmesser, so muß der letztere parallel zu der Tangente  $t$  durch  $Q$  sein, und da  $PQ$  auf  $q$  senkrecht steht, so muß es auch auf  $t$  senkrecht stehen und somit ist  $PQ$  eine Normale von  $K$ . Da  $K$  und  $\mathfrak{R}$  im Allgemeinen vier Schnittpunkte haben, so lassen sich durch einen Punkt im Allgemeinen vier Normalen an einen Kegelschnitt legen.

Die Senkrechte auf eine der Axen trifft die andere im Unendlichen; somit hat  $\mathfrak{R}$  zwei im Unendlichen in senkrechten Richtungen liegende Punkte und ist eine gleichseitige Hyperbel, deren Asymptoten mit den Axen von  $K$  parallel sind. Also folgt:

*Von einem Punkte  $P$  lassen sich an einen Kegelschnitt im Allgemeinen vier Normalen ziehen, deren Fußpunkte auf einer gleichseitigen Hyperbel  $\mathfrak{R}$  liegen, welche die Axen von  $K$  zu Asymptotenrichtungen hat.*

Diese gleichseitige Hyperbel geht durch  $P$  und den Mittelpunkt  $M$  des Kegelschnittes. Fällt man die Senkrechte aus  $P$  auf den zu  $PM$  konjugierten Durchmesser, welcher der Polare  $p$  von  $P$  parallel ist, so ist sie, wie sich aus der Entstehung der gleichseitigen Hyperbel ergibt, die Tangente derselben in  $P$  und ebenso findet man als Tangente in  $M$  den konjugierten Durchmesser zu dem auf  $MP$  in  $M$  senkrechten Durchmesser.

91. Die gleichseitige Hyperbel  $\mathfrak{R}$  geht durch den Mittelpunkt  $M$  von  $K$  und durch seine unendlich fernen Axenpunkte  $A_\infty$  und  $B_\infty$ , also durch ein Poldreieck von  $K$ . Sind  $RS$  zwei Punkte von  $\mathfrak{R}$  und konjugiert in Bezug auf  $K$ , ist  $T$  der Pol von  $RS$ , so sind  $RST$  die Ecken eines Poldreiecks und liegen mit  $MA_\infty B_\infty$  auf einem Kegelschnitte, also auf  $\mathfrak{R}$  (193). Es giebt daher unendlich viele Poldreiecke von  $K$ , welche der gleichseitigen Hyperbel  $\mathfrak{R}$  eingeschrieben sind.

Die sechs Seiten der beiden Poldreiecke  $MA_\infty B_\infty$  und  $RST$  berühren einen Kegelschnitt  $\mathfrak{P}$ , der natürlich eine Parabel ist, weil er die unendlich ferne Gerade  $A_\infty B_\infty$  zur Tangente hat. (196.)



Da aber die Polaren der Punkte von  $\mathfrak{K}$  in Bezug auf  $K$  einen Kegelschnitt umhüllen, dieser aber mit  $\mathfrak{P}$  sechs gemeinschaftliche Tangenten hat, so muß er mit der Parabel  $\mathfrak{P}$  zusammenfallen:

*Die gleichseitige Hyperbel  $\mathfrak{K}$  und die Parabel  $\mathfrak{P}$  sind Polarfiguren in Bezug auf den Kegelschnitt  $K$ .*

Ist  $Q$  einer der Schnittpunkte von  $K$  und  $\mathfrak{K}$ , so muß die Tangente  $t$  in ihm die Parabel  $\mathfrak{P}$  berühren und da  $PQ$  auf  $t$  senkrecht steht, so hat man eine zweite Lösung des Normalenproblems mittelst der Parabel  $\mathfrak{P}$ . Die Berührungspunkte der gemeinschaftlichen Tangenten des Kegelschnittes  $K$  und der Parabel  $\mathfrak{P}$  sind die Fußpunkte der Normalen aus  $P$ .

92. Die Polarinvolution konjugierter Strahlen in  $P$  bezüglich  $K$  hat zwei zu einander normale Strahlen  $n$  und  $n_1$ , welche die Polare von  $P$  in  $N$  und  $N_1$  schneiden mögen, so daß also  $N_1$  der Pol von  $n$  und  $N$  derjenige von  $n_1$  ist. Zieht man durch  $M$  die zu  $n$  und  $n_1$  parallelen Durchmesser  $d$  und  $d_1$ , konstruiert die zu ihnen konjugierten Durchmesser  $d'$  und  $d'_1$ , so sind die Schnittpunkte  $(nd'_1)$  und  $(n_1d')$  Punkte der gleichseitigen Hyperbel. Die Polare des ersteren muß durch  $N_1$  und den Pol von  $d'_1$  gehen, der auf  $d_1$  im Unendlichen liegt, also der Schnittpunkt von  $n_1$  und  $d_1$  ist. Deshalb ist  $n_1$  die Polare des Punktes  $(nd'_1)$  und  $n$  diejenige des Punktes  $(n_1d')$ , d. h. die Punkte  $(nd'_1)$  und  $(n_1d')$  fallen mit den Punkten  $N$  und  $N_1$ , in denen die zu einander normalen konjugierten Strahlen des Punktes  $P$  die Polare von  $P$  treffen, zusammen:

*Die gleichseitige Hyperbel  $\mathfrak{K}$  schneidet die Polare des Punktes  $P$  in ihren Schnittpunkten mit den konjugierten Normalstrahlen des Punktes  $P$ .*

Das Poldreieck  $NN_1P$  bezüglich des Kegelschnittes  $K$  ist der gleichseitigen Hyperbel  $\mathfrak{K}$  eingeschrieben, also der Parabel  $\mathfrak{P}$  umgeschrieben:

*Die Parabel  $\mathfrak{P}$  berührt die konjugierten Normalstrahlen des Punktes  $P$ .*

Man kennt also von der Parabel  $\mathfrak{P}$  zwei Paar senkrechter Tangenten, nämlich die Axen von  $K$  im Punkte  $M$  und die konjugierten Normalstrahlen in  $P$ . Daher ist  $MP$  die Leitlinie der Parabel. (214.)

Im Punkte  $P$  ist die Senkrechte auf die Polare  $p$  dieses Punktes die Tangente der gleichseitigen Hyperbel, ihr Pol  $P'$  also der Berührungspunkt von  $p$  mit der Parabel. Ist  $F$  der Brennpunkt der Parabel und fällt man  $P'Q'$  senkrecht auf die Leitlinie



$MP$ , so ist  $P'Q' = P'F$ . Die Tangente  $p$  ist aber die Mittelsenkrechte von  $Q'F$  (210b.), also kann man den Brennpunkt  $F$  finden:

*Die Parabel  $\mathfrak{P}$  hat die Gerade  $PM$  zur Leitlinie; fällt man aus dem Berührungspunkte  $P'$  der Parabel mit der Polare  $p$  die Senkrechte  $P'Q'$  auf die Leitlinie, so ist der Spiegelpunkt von  $Q'$  in Bezug auf  $p$  der Brennpunkt.*

93. Wie ändert sich die Konstruktion, wenn der Kegelschnitt  $K$  selbst Parabel wird?

94. Von einem Punkte  $P$  an einen gezeichnet vorliegenden Kegelschnitt die Normalen mit Cirkel und Lineal zu konstruieren.

95. *Das zweite Keplersche Gesetz.*

a. Ein Punkt bewege sich auf einem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  in Folge der Wirkung einer beschleunigenden Kraft  $\varphi$ , deren Richtung beständig durch den einen Brennpunkt  $B$  geht. Wie ändert sich dieselbe für die verschiedenen Entfernungen des bewegten Punktes vom Brennpunkte?

Zu einer bestimmten Zeit befinde sich der Punkt in  $C$  (Figur 125. auf Seite 207); in  $C$  konstruiere man den Krümmungskreis, dessen Mittelpunkt  $K$  und dessen Radius  $CK = r$  sei. In dem betrachteten Moment  $\tau$  fällt die Bahn des bewegten Punktes für eine sehr kleine Strecke  $\sigma$  mit einem Bogen des Krümmungskreises zusammen. Hat der Punkt in  $C$  die Geschwindigkeit  $v$  und bezeichnet man den Winkel  $BCK$  mit  $\omega$ , so ist die Normalkomponente der Beschleunigung  $\varphi \cdot \cos \omega = \frac{v^2}{r}$ . Der Radius Vektor  $BC$  beschreibt, wie bei jeder Centralbewegung in gleichen Zeiten gleiche Flächen; nennt man den Inhalt der von ihm in der Zeiteinheit durchlaufenen Fläche  $\frac{1}{2} \gamma$ , so legt er in der Zeit  $\tau$  die Fläche  $\frac{1}{2} \gamma \cdot \tau$  zurück. Diese ist aber ein Dreieck, dessen Grundlinie der Kreisbogen  $\sigma$  und dessen Spitze  $B$  ist. Von letzterer falle man  $p$  senkrecht auf die Verlängerung von  $\sigma$ , also auf die Tangente in  $C$ , so ist

$$\gamma \cdot \tau = p \cdot \sigma.$$

Die Geschwindigkeit in  $C$  ist  $v = \frac{\sigma}{\tau} = \frac{\gamma}{p}$ , also erhält man für die Normalkomponente der Beschleunigung

$$\varphi \cdot \cos \omega = \frac{v^2}{r} = \frac{\gamma^2}{p^2 \cdot r}.$$

Nach 343. ist, wenn man  $BC = \varrho$  setzt,

$$p = \varrho \cdot \cos \omega, \cos \omega = \frac{b}{b_1}, r = \frac{b_1^3}{a \cdot b},$$

daher 
$$\varphi = \frac{\gamma^2}{p^2 \cdot r \cdot \cos \omega} = \frac{\gamma^2}{\varrho^2 \cdot r \cdot \cos^3 \omega} = \frac{\gamma^2 \cdot a^2}{b} \cdot \frac{1}{\varrho^2}.$$



Demnach ist die beschleunigende Kraft in jedem Augenblicke dem reciproken Quadrate der Entfernung proportional.

b. Ein Punkt bewegt sich auf einer Geraden  $g = O_1 N_1$  mit der konstanten Geschwindigkeit  $v$ . In einem bestimmten Moment befindet er sich (Fig. 125) in  $C$  und wird von einer beschleunigenden Kraft  $\varphi$ , deren Richtung stets durch einen festen Punkt  $B$  geht und welche dem reciproken Quadrate der Entfernung proportional ist, angezogen. Welches ist seine Bahn?

Die Normale in  $C$  bilde mit der Richtung  $g$  den Winkel  $\omega$ ; dann ist die Normalcomponente von  $\varphi$  gleich  $\varphi \cdot \cos \omega$ . Man bestimme eine Strecke  $r$  aus der Gleichung  $\frac{v^2}{r} = \varphi \cdot \cos \omega$  und schneide diese gleich  $CK$  auf der Normale ab, so kann man einen Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  konstruieren, welcher  $g$  in  $C$  berührt,  $B$  zum Brennpunkte und  $K$  zum Mittelpunkte des Krümmungskreises hat.

Um die Axe dieses Kegelschnittes zu konstruieren, fälle man (Siehe 343. die Newtonsche Konstruktion)  $KE \perp CB$  und  $EO \perp CK$ , so ist  $O$  ein Punkt der Hauptaxe. Den zweiten Brennpunkt  $B_1$  erhält man aus der Bedingung, daß die Normale den Winkel  $BCB_1$ , welchen die beiden Brennpunktsstrahlen bilden, halbiert. Dadurch aber ist der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  bestimmt. Wenn sich nun auf diesem ein Punkt bewegt in Folge der Wirkung einer Kraft  $\varphi_1$ , deren Richtung stets durch  $B$  geht, so ist die Beschleunigung dieses Punktes dem reciproken Quadrate der Entfernung  $BC = \varrho$  proportional. Hat dieser Punkt in  $C$  dieselbe Gröfse und Richtung der Geschwindigkeit  $v$ , so ist die normale Beschleunigungskomponente  $\varphi_1 \cdot \cos \omega = \frac{v^2}{r}$ , also auch  $\varphi_1 = \varphi$ . Mithin muß die Bewegung auf dem Kegelschnitte  $\mathfrak{K}$  identisch mit derjenigen sein, welche die Kraft  $\varphi$  hervorruft.

Es erübrigt noch zu bestimmen, unter welchen Bedingungen der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  Ellipse, Parabel oder Hyperbel wird. Da bei einer Ellipse beide Brennpunkte auf derselben Seite einer Tangente, bei einer Hyperbel auf entgegengesetzten Seiten liegen, so ist  $\mathfrak{K}$  Ellipse, wenn  $B_1$  auf derselben Seite von  $g$  liegt wie  $B$ , Parabel, wenn  $B_1$  ins Unendliche fällt und endlich Hyperbel, wenn  $B_1$  und  $B$  auf entgegengesetzten Seiten von  $g$  liegen. Um diese Bedingungen durch die Konstanten der Bewegung auszudrücken, denke man sich in Fig. 125. durch  $B$  die Parallele zu  $CB_1$  gelegt, welche die Normale  $CK$  in  $J$  schneiden mag, so ist für die



Ellipse:  $CO < CJ$ .

Parabel:  $CO = CJ$ .

Hyperbel:  $CO > CJ$ .

Da  $\sphericalangle BJC = JCB_1 = JCB$ , so ist  $\triangle BCJ$  gleichschenkelig und  $CJ = 2\rho \cdot \cos \omega$ .

Aus 343. folgt:

$$CO = n = r \cdot \cos^2 \omega = \frac{v^2 \cdot \cos^2 \omega}{\varphi \cdot \cos \omega} = \frac{v^2 \cdot \cos \omega}{\varphi}.$$

Bezeichnet man mit  $\mu$  einen konstanten Faktor, so ist

$$\varphi = \mu \cdot \frac{1}{\rho^2};$$

daher

$$CO = n = \frac{v^2 \cdot \rho^2 \cdot \cos \omega}{\mu}$$

und

$$\begin{aligned} CO - CJ &= \frac{v^2 \cdot \rho^2 \cdot \cos \omega}{\mu} - 2\rho \cdot \cos \omega \\ &= \frac{\rho^2 \cdot \cos \omega}{\mu} \left( v^2 - \frac{2\mu}{\rho} \right). \end{aligned}$$

Da  $\frac{\rho^2 \cdot \cos \omega}{\mu}$  positiv ist und der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  Ellipse, Parabel oder Hyperbel ist, jenachdem  $CO - CJ$  negativ, Null oder positiv, so hat man als Endbedingung: Der Kegelschnitt  $\mathfrak{K}$  ist Ellipse, Parabel, Hyperbel, jenachdem  $v^2 \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} \frac{2\mu}{\rho}$  ist.

#### 96. Das Kreisnetz.

Sind  $O_1 O_2 O_3$  drei Kreise, die nicht demselben Büschel angehören, so liegt ihr Potenzcentrum  $P$  entweder außerhalb oder innerhalb aller drei Kreise. Im ersten Falle haben die Kreise einen reellen, im anderen einen imaginären Orthogonalkreis; es seien  $P_r$  und  $P_i$  diese Kreise; den letzteren kann man durch denjenigen Kreis  $P_d$  ersetzen, der die Kreise  $O_1 O_2 O_3$  unter dem Durchmesser schneidet.

Es giebt unendlich viele Kreise, welche den Kreis  $P_r$  rechtwinklig schneiden; ihre Gesamtheit heißt *Kreisnetz* oder *Kreisbündel*. Alle Kreise desselben, deren Mittelpunkte auf einer Geraden  $g$  liegen, bilden ein *Kreisbüschel*, denn sie schneiden den Kreis  $P_r$  und die Gerade  $g$  rechtwinklig (33.). Im Netze giebt es also unendlich viele *Kreisbüschel*; je zwei müssen einen Kreis gemeinschaftlich haben, dessen Mittelpunkt der Schnittpunkt der Centralen der beiden Büschel ist.

Haben die Kreise keinen reellen Orthogonalkreis, so werden sie von einem Kreise  $P_d$  unter dem Durchmesser geschnitten. Es




giebt unendlich viele Kreise, welche  $P_d$  unter dem Durchmesser schneiden. Sind  $O_m O_n$  irgend zwei solche Kreise, so muß ihre gemeinschaftliche Sehne durch  $P_d$  gehen. Ist  $P'_d$  ein zweiter Punkt derselben, so läßt sich auch um ihn ein Kreis  $P'_d$  ziehen, der von  $O_m$  und  $O_n$  unter dem Durchmesser geschnitten wird; alle Kreise des Büschels ( $O_m O_n$ ) schneiden aber  $P_d$  und  $P'_d$  unter dem Durchmesser (47a.). In der Gesamtheit der Kreise, welche  $P_d$  unter dem Durchmesser schneiden, kommen unendlich viele Büschel vor; je zwei derselben haben einen Kreis gemeinschaftlich, dessen Mittelpunkt wieder der Schnittpunkt der Centralen der Büschel ist. Somit hat die Gesamtheit aller Kreise, welche einen Kreis unter dem Durchmesser schneiden, analoge Eigenschaften, wie die Gesamtheit der Kreise, welche zu einem anderen orthogonal sind; auch sie bilden ein Netz.

Hat man umgekehrt eine Gesamtheit von unendlich vielen Kreisen ( $\Sigma$ ) in der Lage, daß je zwei derselben ein Büschel bestimmen, dessen Kreise jener Gesamtheit angehören, so läßt sich zeigen, daß alle Kreise der letzteren einen Kreis entweder rechtwinklig oder unter dem Durchmesser schneiden.

Sind  $O_1 O_2 O_3$  drei beliebige jener Kreise und ist  $P_r$  ihr reeller Orthogonalkreis, so gehören alle Kreise des durch  $P_r$  bestimmten Kreisnetzes ( $N$ ) zu jener Gesamtheit ( $\Sigma$ ); es fragt sich nur, ob in der letzteren nicht Kreise enthalten sind, die im Netze ( $N$ ) nicht vorkommen. Ist  $O_x$  ein beliebiger Kreis von ( $\Sigma$ ), so gehört er unendlich vielen Büscheln an; irgend eines derselben hat mit jedem der Büschel ( $O_1 O_2$ ), ( $O_2 O_3$ ), ( $O_3 O_1$ ) einen Kreis gemein; es seien dies die Kreise  $O_{12}$ ,  $O_{23}$ ,  $O_{31}$ . Da der Kreis  $P_r$  diese drei Kreise senkrecht trifft, so muß er auch  $O_x$  orthogonal schneiden und  $O_x$  gehört somit dem Netze an.

Schneiden irgend drei Kreise von ( $\Sigma$ ) einen Kreis  $P_d$  unter dem Durchmesser, so thun dies alle und bilden somit ein Netz. Also:

*Die Gesamtheit aller Kreise von der Lage, daß je zwei derselben ein Büschel bestimmen, dessen Kreise jener Gesamtheit angehören, und daß irgend zwei solche Büschel einen Kreis gemeinschaftlich haben, bildet ein Kreisnetz.*





## Berichtigungen.

---

Seite 5, Zeile 22 und 23 von oben:  $E$  statt  $M$ ,  $F$  statt  $N$ .

„ 27, „ 1 von oben:  $P$  statt  $M$ .

„ 46, „ 16 „ „  $\alpha'$  statt  $\alpha$ .

„ 26, „ 19 „ „ Polarsystems statt Polarsystem.

„ 190, „ 7 „ unten:  $X$  statt  $Y$ .

„ 190, „ 3 „ „ Zieht man nämlich in  $B$  und  $B_1$  die Senkrechten zu  $BD$  und  $B_1D_1$ , so sind dieselben (248) die Polaren von  $D$  und  $D_1$  in Bezug auf den Kegelschnitt und den Kreis, letzteres, weil  $EE_1BD$  harmonisch sind. Die Geraden, welche den Schnittpunkt jener Polaren mit  $F$  und  $F_1$  verbinden, sind also gleichzeitig Tangenten an Kreis und Kegelschnitt (249 b.).

---



**Klempt, Diedr. Aug.**, Realschullehrer in Rostock, Lehrbuch zur Einführung in die moderne Algebra. Mit einigen Hundert Beispielen. [XII u. 260 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4.—

**Königsberger, Leo**, zur Geschichte der Theorie der elliptischen Transcendenten in den Jahren 1826—1829. [104 S.] gr. 8. geh. n. *M* 3.—

**Lagrange's** mathematische Elementarvorlesungen. Deutsche Separatausgabe von Dr. H. NIEDERMÜLLER, Oberlehrer am Nicolai-gymnasium zu Leipzig. [IV u. 116 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2.40.

**Milinowski, A.**, Oberlehrer am Gymnasium zu Weissenburg i. E., die Geometrie für Gymnasien und Realschulen. I. Theil: Planimetrie. Mit Holzschnitten im Text und 4 Figurentafeln. [VII u. 123 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2.—

————— II. Theil: Stereometrie. I. Heft: Lehrbuch. Mit Holzschnitten. [VI u. 46 S.] gr. 8. geh. n. *M* —.80.  
II. Heft: Übungsbuch. Mit 4 Figurentafeln. [IV u. 58 S.] gr. 8. geh. n. *M* 1.—

**Neumann, Dr. F.**, Professor der Physik und Mineralogie an der Universität zu Königsberg, Vorlesungen über die Theorie des Magnetismus, namentlich über die Theorie der magnetischen Induktion. [VIII u. 116 S.] gr. 8. geh. n. *M* 3.60.

**Neumann, Dr. C.**, Professor in Leipzig, über die nach Kreis-, Kugel- und Cylinderfunctionen fortschreitenden Entwicklungen, unter durchgängiger Anwendung des Du Bois-Reymond'schen Mittelwerthsatzes. [VIII u. 140 S.] gr. 4. geh. n. *M* 7.20.

**Reusch, E.**, Professor d. Physik in Tübingen, die stereographische Projection. Mit acht auf Stein gravirten Tafeln. [V u. 32 S.] Lex.-8. geh. n. *M* 2.40.

**Saalschütz, Prof. Dr. Louis**, der belastete Stab unter Einwirkung einer seitlichen Kraft. Auf Grundlage des strengen Ausdrucks für den Krümmungsradius. Mit Holzschn. im Text u. 3 lithograph. Tafeln. [XXXI u. 247 S.] gr. 8. geh. n. *M* 9.—

**Salmon, George**, analytische Geometrie des Raumes. Deutsch bearbeitet von Dr. WILHELM FIEDLER, Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich. II. Theil: Analytische Geometrie der Curven im Raume, der Strahlensysteme und der algebraischen Flächen. Dritte verb. Aufl. Mit Holzschn. im Text. [LXXII u. 686 S. u. Nachträge 8 S.] gr. 8. geh. n. *M* 16.—

————— analytische Geometrie der Kegelschnitte mit besonderer Berücksichtigung der neueren Methoden. Frei bearbeitet von Dr. W. FIEDLER, Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich. Vierte verbesserte Auflage. [XXIV u. 701 S. mit eingedruckten Holzschnitten.] gr. 8. 1878. geh. n. *M* 14.40.



**Schell, Dr. Wilhelm**, Professor am Polytechnikum zu Karlsruhe, Theorie der Bewegung und der Kräfte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik. Mit besonderer Rücksicht auf das wissenschaftliche Bedürfniss technischer Hochschulen bearbeitet. Zweite umgearbeitete Auflage. Zwei Bände. Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. gr. 8. 1879. 1880. geh. n. *M* 20. —

Einzeln, jeder Band à n. *M* 10. —

- I. Band. 1. Geometrie der Streckensysteme und Geometrie der Massen. 2. Geometrie der Bewegungszustände (Kinematik). [XVI u. 580 S.] 1879.  
II. — 3. Theorie der Kräfte und ihrer Aequivalenz (Dynamik im weiteren Sinne einschl. Statik). 4. Theorie der durch Kräfte erzeugten Bewegung (Kinetik oder Dynamik im engeren Sinne). Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. [XII u. 618 S.] 1880.

**Schottky, Dr. F.**, Privatdocent an der Universität Breslau, Abriss einer Theorie der Abel'schen Funktionen von drei Variablen. [162 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4. —

**Schröter, Dr. Heinrich**, Professor der Mathematik a. d. Universität zu Breslau, Theorie der Oberflächen zweiter Ordnung und der Raumkurven dritter Ordnung als Erzeugnisse projektivischer Gebilde. Nach JACOB STEINER'S Principien auf synthetischem Wege abgeleitet. [XV u. 720 S. mit vielen Figuren im Text.] gr. 8. geh. n. *M* 16. —

**Tait, P. G.**, Prof. der Physik a. d. Universität in Edinburg, elementares Handbuch der Quaternionen. Autoris. Uebersetzung von Dr. G. v. SCHERFF. [XVI u. 332 S.] gr. 8. geh. n. *M* 10. —

---



















Milinowski, Alfons,

Elementar-synthetische Geometrie der Kegelschnitte

Leipzig 1882

Math.p. 358 I

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11651477-7